

月度考试

- 1、（A3/A4 型题）男，40 岁。1 周来左后牙咬物不适，冷水引起疼痛。近 2 日来夜间痛剧烈，影响睡眠，并引起半侧头、面部痛。初步检查：左侧上下第一、第二磨牙均有邻面和咬合面龋洞，牙间龈乳头充血、探痛。根据患者疼痛的性质，患牙最可能的疾病是
- A. 牙龈乳头炎
 - B. 急性牙髓炎
 - C. 急性根尖周炎
 - D. 三叉神经痛
 - E. 急性上颌窦炎
- 2、（A3/A4 型题）男，40 岁。1 周来左后牙咬物不适，冷水引起疼痛。近 2 日来夜间痛剧烈，影响睡眠，并引起半侧头、面部痛。初步检查：左侧上下第一、第二磨牙均有邻面和咬合面龋洞，牙间龈乳头充血、探痛。为确定患牙，必须进行的一项检查是
- A. 探诊
 - B. 叩诊
 - C. 麻醉测验
 - D. 温度测验
 - E. X 线片检查
- 3、（A3/A4 型题）男，40 岁。1 周来左后牙咬物不适，冷水引起疼痛。近 2 日来夜间痛剧烈，影响睡眠，并引起半侧头、面部痛。初步检查：左侧上下第一、第二磨牙均有邻面和咬合面龋洞，牙间龈乳头充血、探痛。当日有效的处理是
- A. 开髓开放
 - B. 开髓拔髓
 - C. 直接盖髓
 - D. 间接盖髓
 - E. 龋洞充填
- 4、（A3/A4 型题）女，40 岁。上前牙牙冠变色 10 年。左上尖牙牙冠呈棕褐色，切端重度磨损，叩痛(±)，不松动为明确诊断进一步重要的检查是
- A. 扪诊
 - B. 咬诊
 - C. 牙周检查
 - D. 牙髓活力测试
 - E. 咬合关系检查
- 5、（A3/A4 型题）女，40 岁。上前牙牙冠变色 10 年。左上尖牙牙冠呈棕褐色，切端重度磨损，叩痛(±)，不松动 X 线片检查见左上尖牙根管内充填物距根尖 2.5mm，根尖周有约 0.5mm×1mm X 线透射区，边缘整齐。根管充填的质量描述
- A. 恰填
 - B. 欠填
 - C. 超填
 - D. 不满意
 - E. 充填不致密
- 6、（A3/A4 型题）女，40 岁。上前牙牙冠变色 10 年。左上尖牙牙冠呈棕褐色，切端重度磨损，叩痛(±)，不松动左上尖牙的诊断最可能是
- A. 重度磨损
 - B. 牙髓坏死
 - C. 慢性牙髓炎
 - D. 慢性根尖周囊肿
 - E. 慢性根尖周肉芽肿

7、(A3/A4 型题)女,40 岁。上前牙牙冠变色 10 年。左上尖牙牙冠呈棕褐色,切端重度磨损,叩痛(±),不松动与左上尖牙牙髓感染有关的因素最可能是

- A.外伤
- B.磨损
- C.楔状缺损
- D.隐裂
- E.牙周疾病

8、(A3/A4 型题)女,40 岁。上前牙牙冠变色 10 年。左上尖牙牙冠呈棕褐色,切端重度磨损,叩痛(±),不松动确定与左上尖牙疾病有关因素的检查还应包括

- A.扪诊
- B.咬诊
- C.光纤透照检查
- D.咬合关系检查
- E.牙周检查

9、(A3/A4 型题)女,40 岁。上前牙牙冠变色 10 年。左上尖牙牙冠呈棕褐色,切端重度磨损,叩痛(±),不松动该患者的治疗设计不包括

- A.取出左上尖牙根管充填物
- B.调整咬合
- C.根管治疗
- D.冠修复
- E.根尖切除

10、(A3/A4 型题)女,28 岁,近 4 个月来全口牙龈逐渐肿大,刷牙时牙龈易出血,偶有牙龈自动出血史。若患者妊娠 6 个月,诊断为妊娠期龈炎,临床上最可能表现为

- A.牙龈疼痛、恶臭
- B.牙齿松动
- C.牙龈为纤维性增大
- D.牙龈色鲜红、光亮
- E.牙龈坏死

11、(A3/A4 型题)女,28 岁,近 4 个月来全口牙龈逐渐肿大,刷牙时牙龈易出血,偶有牙龈自动出血史。若患者未妊娠,怀疑为白血病在口腔的表现,确认的方法为

- A.活检
- B.脱落细胞涂片
- C.白细胞吞噬功能
- D.白细胞趋化功能
- E.查血象

12、(A3/A4 型题)女,28 岁,近 4 个月来全口牙龈逐渐肿大,刷牙时牙龈易出血,偶有牙龈自动出血史。若诊断为白血病,在口腔还会表现为

- A.牙龈苍白、松软脆弱
- B.牙龈色鲜红、光亮,质软
- C.牙龈呈波动感
- D.牙龈表面有伪膜
- E.牙龈表面有疱疹

13、(A3/A4 型题)女,28 岁,牙龈刷牙出血 2 年。检查:全口牙石(+),牙龈缘轻度红,探诊出血,探诊深度 2mm,未见牙龈退缩。最可能的诊断是

- A.边缘性龈炎
- B.妊娠期龈炎
- C.坏死性龈炎
- D.慢性牙周炎

E.侵袭性牙周炎

14、(A3/A4 型题)女, 28 岁, 牙龈刷牙出血 2 年。检查: 全口牙石(+), 牙龈缘轻度红, 探诊出血, 探诊深度 2mm, 未见牙龈退缩。此时对该患者的治疗方法应为

- A.洁治术
- B.刮治术
- C.根面平整
- D.口服替硝唑
- E.袋壁搔刮

15、(A3/A4 型题)女, 28 岁, 牙龈刷牙出血 2 年。检查: 全口牙石(+), 牙龈缘轻度红, 探诊出血, 探诊深度 2mm, 未见牙龈退缩。如果 5 个月后, 该患者再来就诊时, 牙龈出血明显, 牙龈呈鲜红色, 松软光亮, 轻探易出血。此时应考虑到的最可能的诊断是

- A.边缘性龈炎
- B.妊娠期龈炎
- C.坏死性龈炎
- D.慢性牙周炎
- E.侵袭性牙周炎

16、(B1 型题)不可复性牙髓炎剧烈疼痛时应急处理

- A.直接盖髓术
- B.间接盖髓术
- C.牙髓切断术
- D.牙髓开放
- E.安抚治疗

17、(B1 型题)深龋引起的可复性牙髓炎, 牙髓活力测试正常, X 线显示根尖周组织正常的恒牙

- A.直接盖髓术
- B.间接盖髓术
- C.牙髓切断术
- D.牙髓开放
- E.安抚治疗

18、(B1 型题)根尖孔未形成, 因外伤露髓的年轻恒牙

- A.直接盖髓术
- B.间接盖髓术
- C.牙髓切断术
- D.牙髓开放
- E.安抚治疗

19、(B1 型题)深龋备洞极敏感

- A.直接盖髓术
- B.间接盖髓术
- C.牙髓切断术
- D.牙髓开放
- E.安抚治疗

20、(B1 型题)上颌中切牙(年轻恒牙)冠 2/3 横折 4 小时, 牙髓暴露。治疗方案是

- A.干髓术
- B.Ca(OH)₂ 活髓切断术
- C.FC 切髓术
- D.根管治疗术
- E.根尖诱导成形术

21、（B1 型题）为控制牙髓感染和炎症，利用药物使牙髓组织成为非感染性无害物质，根尖部牙髓仍可保持活力的治疗方法是

- A.干髓术
- B.Ca(OH)₂ 活髓切断术
- C.FC 切髓术
- D.根管治疗术
- E.根尖诱导成形术

22、（B1 型题）牙体折裂

- A.窝洞的点线角太锐
- B.洞的边缘制备于深窝沟处
- C.银汞合金修复体厚度不够
- D.悬突
- E.垫底材料选择不当下列情况的出现可能是由于

23、（B1 型题）龋齿一次性充填后的激发痛

- A.窝洞的点线角太锐
- B.洞的边缘制备于深窝沟处
- C.银汞合金修复体厚度不够
- D.悬突
- E.垫底材料选择不当下列情况的出现可能是由于

24、（B1 型题）充填物折断

- A.窝洞的点线角太锐
- B.洞的边缘制备于深窝沟处
- C.银汞合金修复体厚度不够
- D.悬突
- E.垫底材料选择不当下列情况的出现可能是由于

25、（B1 型题）用于拔髓的器械是

- A.G 钻
- B.镍钛根管锉
- C.拔髓针
- D.光滑髓针
- E.侧压充填器

26、（B1 型题）用于成形根管的器械是

- A.G 钻
- B.镍钛根管锉
- C.拔髓针
- D.光滑髓针
- E.侧压充填器

27、（B1 型题）用于根管充填的器械是

- A.G 钻
- B.镍钛根管锉
- C.拔髓针
- D.光滑髓针
- E.侧压充填器

28、（B1 型题）妊娠性龈炎表现是

- A.龈乳头坏死
- B.呈反波浪状
- C.龈乳头扁圆形肥大、有蒂
- D.呈桑葚状

E.增生牙龈覆盖全部牙冠

29、(B1型题)牙龈纤维瘤增生表现是

- A.龈乳头坏死
- B.呈反波浪状
- C.龈乳头扁圆形肥大、有蒂
- D.呈桑葚状
- E.增生牙龈覆盖全部牙冠

30、(B1型题)Ⅰ度根分叉病变应选择的手术

- A.牙龈切除术
- B.翻瓣术
- C.分根术
- D.冠延长术
- E.断根术

31、(B1型题)牙周检查治疗后牙龈仍增生肥大应选择的手术

- A.牙龈切除术
- B.翻瓣术
- C.分根术
- D.冠延长术
- E.断根术

32、(B1型题)牙折达龈下,影响修复,应选择的手术本单元试卷到此结束参考答案

- A.牙龈切除术
- B.翻瓣术
- C.分根术
- D.冠延长术
- E.断根术

33、(A1型题)牙骨质龋属于

- A.慢性龋
- B.浅龋
- C.中龋
- D.深龋
- E.隐匿龋

34、(A1型题)牙发育早期,由牙乳头局部增生并向成釉器突起所导致的成釉器形态分化异常的牙齿疾病是

- A.畸形舌侧窝
- B.牙内陷
- C.畸形中央尖
- D.牙中牙
- E.畸形根面沟

35、(A1型题)确定残髓炎的可靠方法是

- A.电活力测验
- B.化学测验
- C.温度测验
- D.探查根管深部
- E.探查牙周袋

36、(A1型题)根尖狭窄部一般距牙齿根尖的距离为

- A.0 mm
- B.0.1~0.2 mm
- C.0.3~0.4 mm

- D.0.5~2.0 mm
- E.2.0~3.0 mm

- 37、(A1 型题)有效检查早期邻面龋的方法是
- A.视诊
 - B.叩诊
 - C.探诊
 - D.透照
 - E.咬合翼片
- 38、(A1 型题)对外伤未露髓患牙的牙髓活力进行测试的时间应在
- A.即刻
 - B.2 周后
 - C.4 周后
 - D.6~8 周后
 - E.3 个月后
- 39、(A1 型题)慢性闭锁性牙髓炎的临床表现不包括
- A.曾有不定时自发隐痛
 - B.热测引起迟缓痛
 - C.洞内探及穿髓孔
 - D.叩诊多有不适感
 - E.有过自发痛病史
- 40、(A1 型题)防治恒牙早萌的重要环节是
- A.配戴阻萌器
 - B.控制乳牙根尖周围炎症
 - C.若对颌牙缺失,应防止早萌牙过长
 - D.局部涂氟,预防龋齿
 - E.固定松动的早萌恒牙
- 41、(A1 型题)有关盖髓剂应具备的性质,不正确的是
- A.能促进牙髓组织再修复能力
 - B.有较好的组织相容性
 - C.对牙髓组织无毒性、无渗透性
 - D.有杀菌或抑菌作用
 - E.有消炎作用,药效持久稳定
- 42、(A1 型题)蔗糖致龋的必要条件是
- A.菌斑存在
 - B.多次食用
 - C.黏附牙面
 - D.加工精细
 - E.溶解于水
- 43、(A1 型题)怀疑左下第一磨牙有可复性牙髓炎,进行牙髓活力测验时,应先检查的牙是
- A.左下第一磨牙
 - B.左下第二磨牙
 - C.右下第一磨牙
 - D.右下第二磨牙
 - E.左下第一前磨牙
- 44、(A1 型题)根尖诱导成形术进行永久充填的指征不包括
- A.瘘管闭合
 - B.患牙无明显松动和疼痛
 - C.牙根继续发育

- D.根尖有明显硬组织形成
- E.根尖透射区缩小

45、(A1型题)四环素牙的发病机制中,下列错误的是

- A.四环素能与牙组织形成稳固的复合物
- B.着色与四环素族药物本身的颜色无关
- C.四环素牙可在紫外线下变色
- D.四环素可通胎盘引起乳牙着色
- E.四环素牙着色主要在牙本质

46、(A1型题)菌斑的形成过程中,形成细菌聚集的基础是

- A.葡糖醛酸
- B.蔗糖
- C.葡聚糖
- D.果糖
- E.葡糖基转移酶

47、(A1型题)髓腔一侧形成较多的第三期牙本质的龋病为

- A.急性龋
- B.平滑面龋
- C.静止性龋
- D.浅龋
- E.慢性龋

48、(A1型题)关于牙震荡治疗的顺序说法不正确的是

- A.受伤后 1、3、6、12 个月应进行定期复查
- B.牙冠不变色,牙髓活力测试正常需行根管治疗
- C.牙髓坏死的情况时,可以进行根管治疗术
- D.年轻恒牙牙髓活力可在受伤后 1 年内才丧失
- E.患牙在必要时应该降低咬合减轻负担

49、(A1型题)关于完全脱位牙的叙述正确的是

- A.在 1 小时内进行再植,90%可避免发生牙根吸收
- B.脱位在 2 小时以后再就诊,牙周膜有可能重建
- C.年轻完全脱位的恒牙,若拖延就诊时间,也可以获得较好预后
- D.根尖发育完全的脱位牙,及时复位 3~4 周后再进行根管治疗术
- E.被污染的完全脱位牙,可以进行干藏

50、(A1型题)创伤性牙隐裂治疗上应首先

- A.开髓失活
- B.全冠修复
- C.备洞充填
- D.调整咬合
- E.拔除患牙

51、(A1型题)引起牙髓活力电测验假阴性的原因不包括

- A.测试前使用过麻醉剂
- B.根尖尚未形成的牙齿
- C.刚受过外伤的牙齿
- D.干髓治疗的牙齿
- E.根管内过度钙化的牙齿

52、(A1型题)慢性根尖周炎主要的病变类型为

- A.致密性骨炎
- B.根尖周肉芽肿

- C.根尖脓肿
 - D.根尖囊肿
 - E.有瘘型根尖脓肿
- 53、（A1 型题）细胞性牙骨质的沉积以补偿牙冠的磨耗发生于
- A.牙颈部
 - B.牙冠 1/3
 - C.牙根中 1/3
 - D.牙根尖 1/3
 - E.牙髓腔
- 54、（A1 型题）常见的手用不锈钢根管切削器械为
- A.Protaper
 - B.R 型锉
 - C.K 型锉
 - D.机用根管锉
 - E.根管冲洗针
- 55、（A1 型题）K 型根管器械的横截面是
- A.圆形
 - B.三角形
 - C.水滴形
 - D.椭圆形
 - E.不规则形
- 56、（A1 型题）10 号标准化扩孔钻和锉的尖端直径和刃部末端直径为
- A.0.01 mm 和 0.40 mm
 - B.0.10 mm 和 0.42 mm
 - C.0.15 mm 和 0.32 mm
 - D.0.15 mm 和 0.47 mm
 - E.0.10 mm 和 0.32 mm
- 57、（A1 型题）自酸蚀粘接系统最主要的临床应用特点是
- A.免酸蚀
 - B.免冲洗
 - C.二步法操作
 - D.分瓶包装
 - E.需保持界面湿润
- 58、（A1 型题）黏结剂对牙本质的固位作用不包括
- A.微机械嵌合
 - B.化合键
 - C.分子间引力
 - D.氢键
 - E.压缩结合
- 59、（A1 型题）氟牙症色素位置较浅，轻中度着色病变在釉质外层的
- A.1/4~1/3 处
 - B.1/2~2/3 处
 - C.1/3~1/2 处
 - D.2/3~3/4 处
 - E.1/4~3/4 处
- 60、（A1 型题）牙本质自酸蚀粘接的方式是
- A.固位洞形
 - B.化学结合

- C.粘接剂吸附
- D.微机械锁合
- E.混合层形成

- 61、（A1 型题）临床诊断牙本质敏感症的可靠方法是
- A.用冰棒在正常牙面进行牙髓活力冷测验
 - B.牙髓活力热测验
 - C.牙髓电活力测验
 - D.探针划探裸露的牙本质
 - E.拍摄平行投照根尖片
- 62、（A1 型题）牙面获得性膜形成后，最初附着于牙面的细菌主要是
- A.黏性放线菌
 - B.变异链球菌
 - C.唾液链球菌
 - D.血链球菌
 - E.轻链球菌
- 63、（A1 型题）根尖诱导成形术复查时间为治疗后
- A.1 周
 - B.2 周
 - C.1 个月
 - D.1.5~2 个月
 - E.3~6 个月
- 64、（A1 型题）下列发育异常的牙是由两个正常的牙胚融合而成的是
- A.融合牙
 - B.双生牙
 - C.结合牙
 - D.多生牙
 - E.牙中牙
- 65、（A1 型题）当细菌侵入牙本质，牙本质的厚度为多少时，牙髓内可找到细菌
- A.2 mm
 - B.1.1 mm
 - C.0.3 mm
 - D.0.2 mm
 - E.0.1 mm
- 66、（A1 型题）塑化液导入根管后，不需观察，覆盖根管口的材料是
- A.氧化锌丁香油粘固剂
 - B.磷酸锌粘固剂
 - C.氢氧化钙糊剂
 - D.碘仿糊剂
 - E.无特殊要求
- 67、（A1 型题）随着龋病的发生，牙菌斑中细菌比例可以不断发生变化，下列叙述正确的是
- A.变异链球菌不断增加
 - B.血链球菌不断增加
 - C.放线菌不断减少
 - D.乳杆菌不断增加
 - E.酵母菌不断减少
- 68、（A1 型题）菌斑成熟的关键成分是
- A.葡糖醛酸
 - B.蔗糖

- C.葡聚糖
- D.果糖
- E.葡糖基转移酶

- 69、(A1型题)有关牙内陷治疗方法说法中,正确的是
- A.早期应按深龋处理
 - B.预后不佳者应予拔除
 - C.必要时可拔除患牙再修复
 - D.牙髓、牙周同时发病者行根管治疗术同时行牙周病手术治疗
 - E.以上说法均正确
- 70、(A1型题)关于牙震荡的临床表现的说话,下列错误的是
- A.患牙微酸痛感
 - B.患牙可对于冷刺激一过性敏感
 - C.牙冠完整,通常不伴有牙体组织的缺损
 - D.大幅松动,患牙有移位
 - E.叩痛(±)~(+)
- 71、(A1型题)X线片根尖周透射区包括多个未治疗牙时确诊病源牙的主要依据是患牙
- A.有无龋洞
 - B.是否有牙周疾病
 - C.牙髓有无活力
 - D.有无窦道
 - E.有无叩痛
- 72、(A1型题)X线片根尖周透射区包括多个未治疗牙时确诊病源牙的主要依据是患牙
- A.有无龋洞
 - B.是否有牙周疾病
 - C.牙髓有无活力
 - D.有无窦道
 - E.有无叩痛
- 73、(A1型题)若器械分离时所有方法均不能去除根管内的器械,则最后可使用保留牙齿的方案是
- A.拔除
 - B.根尖手术
 - C.根管冲洗
 - D.开放根管
 - E.全冠修复术
- 74、(A1型题)以下哪项不是手动不锈钢器械从尖端到柄的距离规格
- A.16 mm
 - B.21 mm
 - C.25 mm
 - D.28 mm
 - E.31 mm
- 75、(A1型题)牙齿叩诊检查主要反映
- A.牙体组织的敏感性
 - B.牙髓的病变程度
 - C.牙周组织和根尖周膜的水肿状态
 - D.牙龈的肿胀情况
 - E.牙根的完整性
- 76、(A1型题)必须用X线检查才能明确诊断的疾病是
- A.慢性根尖周炎
 - B.深龋

- C.牙本质过敏症
- D.中龋
- E.牙隐裂

- 77、(A1型题)对釉质发育不全的处理如下,除外
- A.口服氟片
 - B.贴面修复
 - C.充填缺损
 - D.桩冠修复
 - E.全冠修复
- 78、(A1型题)急性牙髓炎急诊时,正确有效的处置措施是
- A.口服镇痛药
 - B.局麻止痛
 - C.开髓开放
 - D.摘除牙髓封药
 - E.开髓封失活剂
- 79、(A1型题)牙隐裂的常见临床表现之一是
- A.多见于上前牙
 - B.隐裂明显可见
 - C.温度测验正常
 - D.裂与窝沟重叠
 - E.裂不越过边嵴
- 80、(A1型题)牙髓活力温度测验中热刺激的温度范围是
- A.低于 45℃
 - B.45~50℃
 - C.50~55℃
 - D.55~60℃
 - E.高于 60℃
- 81、(A1型题)对嵌入性脱位的年轻恒牙,下列处理中不正确的是
- A.对症处理
 - B.观察
 - C.任其自然萌出
 - D.强行拉出复位
 - E.拍 X 线片定期复查
- 82、(A1型题)侵袭性牙周炎龈下非附着菌斑内,主要优势菌是
- A.梭形菌
 - B.螺旋体
 - C.中间普氏菌
 - D.黏性放线菌
 - E.伴放线聚集杆菌
- 83、(A1型题)牙周疾病的局部促进因素中除外
- A.充填体悬突
 - B.食物嵌塞
 - C.创伤性力
 - D.光敏树脂充填体
 - E.未恢复接触的冠修复体
- 84、(A1型题)关于急性坏死性溃疡性龈炎的特点,以下描述正确的是
- A.很少发生在成年人

- B.发病急，以龈乳头和龈缘的坏死为特征性损害
 - C.病变常见于上后牙区
 - D.一般不伴有疼痛
 - E.早期出现牙齿的明显松动
- 85、（A1 型题）牙周组织破坏程度与局部刺激物的量不成比例的是
- A.慢性牙周炎
 - B.增生性龈炎
 - C.边缘性龈炎
 - D.牙周脓肿
 - E.侵袭性牙周炎
- 86、（A1 型题）急性坏死性溃疡性龈炎，龈沟内数量增加的厌氧菌是
- A.梭形芽孢杆菌与螺旋体
 - B.梭形杆菌与螺杆菌
 - C.梭形杆菌与螺旋体
 - D.具核梭形杆菌与螺杆菌
 - E.梭形芽孢杆菌与螺杆菌
- 87、（A1 型题）若不及时治疗，有可能发展成走马牙疳的龈炎是
- A.急性龈乳头炎
 - B.疱疹性龈口炎
 - C.急性坏死性溃疡性龈口炎
 - D.慢性边缘性龈炎
 - E.白血病
- 88、（A1 型题）慢性牙周炎的临床特点为
- A.发病年龄小
 - B.病程进展缓慢
 - C.菌斑牙石少
 - D.牙龈无炎症表现
 - E.早期表现为牙齿松动
- 89、（A1 型题）关于慢性牙周炎哪一项不正确
- A.可有牙龈的炎症表现
 - B.不发生于青少年与儿童
 - C.有牙槽骨吸收
 - D.探诊可发现有附着丧失
 - E.晚期牙齿出现松动
- 90、（A1 型题）患病率只有百万分之一到百万分之四，同时伴有牙周病损和皮损的疾病是
- A.Down 综合征
 - B.伴 1 型糖尿病的牙周炎
 - C.掌跖角化-牙周破坏综合征
 - D.牙龈纤维瘤病
 - E.侵袭性牙周炎
- 91、（A1 型题）Papillon-Lefevre 综合征一般不涉及
- A.手掌
 - B.足底
 - C.膝盖
 - D.躯干
 - E.牙周组织
- 92、（A1 型题）根分叉病变的主要病因是

- A. 咬合创伤
- B. 根柱过长
- C. 龋病
- D. 磨牙症
- E. 菌斑

93、（A1 型题）牙周脓肿的临床特点中不包括

- A. 有牙周炎病史
- B. 有深牙周袋
- C. 牙龈呈椭圆形隆起，波动感
- D. 伴明显的牙齿松动
- E. 脓肿局限于龈乳头及龈缘

94、（A1 型题）发生于种植体周软组织的炎症性损害称为

- A. 种植体周围炎
- B. 种植体炎
- C. 种植体周黏膜炎
- D. 种植体周龈炎
- E. 种植体周膜炎

95、（A1 型题）关于种植体周围炎的治疗不正确的是

- A. 2% 氯己定局部冲洗或含漱
- B. 联合应用抗生素
- C. 翻瓣手术
- D. 手用传统金属洁治器彻底清洁
- E. 引导性骨再生术

96、（A1 型题）下列对龈袋的描述中错误的是

- A. 牙龈肿胀增生
- B. 龈沟可达 3 mm 或更深
- C. 上皮附着在水平釉牙骨质界
- D. 出现结缔组织附着水平降低
- E. 龈袋可能溢脓

97、（A1 型题）用有刻度的牙周探针探测牙周袋的注意点，不包括

- A. 支点应稳
- B. 探测力量应掌握恰当
- C. 探测角度要垂直
- D. 探测位置和角度要恰当
- E. 按顺序探测

98、（A1 型题）对牙周兼性厌氧菌及微需氧菌感染无效的是

- A. 四环素
- B. 二甲胺四环素
- C. 螺旋霉素
- D. 洗必泰
- E. 甲硝唑

99、（A1 型题）牙周基础治疗后，牙龈肥大增生仍未消退，适用的手术治疗方法为

- A. 翻瓣术
- B. 牙龈切除术
- C. 袋壁刮治术
- D. 植骨术
- E. 引导性牙周组织再生术

- 100、(A1 型题) 龈下刮治操作中, 刮治器入袋时工作面与根面的交角应为
- A.0°
 - B.30°
 - C.45°
 - D.80°
 - E.90°
- 101、(A1 型题) 超声洁牙操作中错误的是
- A.开动电源后先调节功率旋钮
 - B.对厚而硬的牙石用大功率
 - C.细小牙石及烟斑用小功率
 - D.将工作头停留在一点上振动
 - E.工作头以短垂直水平动作洁治牙石
- 102、(A1 型题) 种植体周围炎的治疗措施是
- A.彻底去除菌斑
 - B.控制感染
 - C.消除种植体骨袋
 - D.制止骨丧失
 - E.以上均是
- 103、(A1 型题) 融合牙临床表现不正确的是
- A.冠根完全融合
 - B.冠部融合, 根部分离
 - C.冠部分离, 根部融合
 - D.乳牙列融合多发生在双侧
 - E.乳牙列融合牙比恒牙列多
- 104、(A1 型题) 以涂药方法治疗龋病主要适用于
- A.龋蚀面广泛的浅龋
 - B.乳磨牙面龋
 - C.乳磨牙颊面龋
 - D.深龋
 - E.乳前牙唇面龋
- 105、(A1 型题) 几个月第一颗乳牙仍未萌出称为乳牙萌出过迟
- A.6 个月
 - B.8 个月
 - C.10 个月
 - D.12 个月
 - E.14 个月
- 106、(A1 型题) 氢氧化钙覆盖窝洞底, 使脱矿牙本质再矿化需要多长时间
- A.1 周
 - B.2 周
 - C.4 周
 - D.8 周
 - E.10~12 周
- 107、(A1 型题) 了解近 3 年某城市居民的拔牙原因最宜采用
- A.历史常规资料分析
 - B.病例对照研究
 - C.群组研究
 - D.流行病学实验研究
 - E.横断面调查

- 108、（A1 型题）恒牙一般在牙根形成多少时萌出
- A.1/2
 - B.2/3
 - C.4/5
 - D.3/4
 - E.完全
- 109、（A1 型题）治疗年轻恒牙的操作中不妥当的是
- A.考虑年轻恒牙的形态、组织结构和生理特点
 - B.宜用金刚砂车针高速切削，减少牙质发生裂纹
 - C.用龋蚀显示液
 - D.挖匙去除深部软化牙本质，避免不必要的露髓
 - E.选用对牙髓无刺激的材料垫底
- 110、（A1 型题）乳牙龋多见的好发牙面，以下正确的是
- A.上颌乳切牙近中面
 - B.上颌第二乳磨牙近中面
 - C.下颌第二乳磨牙远中面
 - D.下颌乳尖牙舌面
 - E.下颌第一乳磨牙近中面
- 111、（A1 型题）乳牙早萌的临床表现不正确的是
- A.多见于下颌中切牙及上颌切牙
 - B.诞生牙多数是正常牙，少数是多生牙
 - C.牙根尚未发育或发育很少
 - D.无牙槽骨支持
 - E.松动
- 112、（A1 型题）乳牙早萌的治疗措施不正确的是
- A.极度松动的早萌乳牙应及时拔除
 - B.若引起创伤性溃疡，拔除早萌乳牙
 - C.改变喂养方式
 - D.溃疡处涂以甲紫
 - E.溃疡可待其自愈
- 113、（A1 型题）活髓切断术不适用于
- A.前牙深龋
 - B.后牙深龋
 - C.部分冠髓牙髓炎
 - D.牙髓坏死
 - E.前牙外伤性冠折露髓
- 114、（A1 型题）下列哪一项不是恒磨牙早萌的特点
- A.先行的乳磨牙根尖周病变
 - B.先行的乳磨牙过早脱落
 - C.乳磨牙根尖周病变造成恒磨牙牙胚周围牙槽骨破坏
 - D.恒牙发育过快
 - E.松动
- 115、（A1 型题）乳牙根尖周病不适宜的处理是
- A.牙髓摘除术
 - B.根管治存术
 - C.活髓切断术
 - D.切开排脓
 - E.抗菌药物的全身治疗

116、（A1 型题）口腔单纯疱疹病毒感染常用的辅助诊断方法不包括

- A. 基因诊断
- B. 涂片查找包涵体
- C. 电镜检查受损细胞
- D. 免疫学检查
- E. 组织活检

117、（A1 型题）口腔白斑病的病理改变不包括

- A. 过度角化或过度不全角化
- B. 颗粒层明显，棘细胞层松解
- C. 上皮钉突增大
- D. 结缔组织中有炎细胞浸润
- E. 可伴有上皮异常增生

118、（A1 型题）疱疹性龈口炎多见于

- A. 6 个月~2 岁婴幼儿
- B. 学龄前儿童
- C. 青少年
- D. 中年人
- E. 老年人

119、（A1 型题）下列药物中不常用于单纯疱疹病毒感染

- A. 阿昔洛韦
- B. 利巴韦林
- C. 聚肌胞
- D. 泼尼松
- E. 胸腺素

120、（A1 型题）口腔白斑病的临床类型不包括

- A. 皱纹纸状
- B. 颗粒状
- C. 斑纹状
- D. 溃疡状
- E. 疣状

121、（A1 型题）以下关于新生儿鹅口疮描述不正确的是

- A. 多在出生后 2~8 日内发生
- B. 散在的色白如雪的柔软小斑点，如针头大小
- C. 白色斑片遍布整个舌背
- D. 白色斑片甚至可分布于软腭及咽部
- E. 斑片附着十分紧密，不可擦掉

122、（A1 型题）以下与口腔扁平苔藓发病原因无关的是

- A. 精神创伤
- B. 内分泌因素
- C. 微循环障碍
- D. 病毒感染
- E. 真菌感染

123、（A1 型题）以下关于慢性唇炎的临床表现，描述不正确的是

- A. 常累及上、下唇部，唇部可见针头大小结节
- B. 唇红可见黄白色或褐色脱屑、脱皮
- C. 有局部干胀、发痒、刺痛或灼痛感
- D. 唇红糜烂剥脱
- E. 有炎性渗出物，形成黄色痂皮，或出血后凝结为血痂

- 124、（A1 型题）激素类口腔制剂不能用于哪种口腔黏膜病的治疗
- A.复发性口腔溃疡
 - B.扁平苔藓
 - C.多形性红斑
 - D.类天疱疮
 - E.口腔念珠菌病
- 125、（A1 型题）以下关于复发性阿弗他溃疡治疗最合理的
- A.寻找与发病有关的全身及局部因素加以治疗
 - B.口腔黏膜局部消炎止痛药物治疗
 - C.口眼肾上腺皮质激素
 - D.使用免疫增强药物
 - E.腐蚀性药物局部烧灼
- 126、（A1 型题）口腔念珠菌病病损区涂片检查可见
- A.假菌丝和芽生孢子
 - B.梭状杆菌和螺旋体
 - C.包涵体
 - D.大量细菌及白细胞
 - E.分枝杆菌
- 127、（A1 型题）腺周口疮与癌性溃疡的区别不包括
- A.好发年龄不同
 - B.好发部位不同
 - C.溃疡大小不同
 - D.是否具有自限性
 - E.全身情况不同
- 128、（A2 型题）男性患者，23 岁，因牙齿折断前来就诊。查：牙体折断线累计牙冠与根部，斜行折裂多见，均与口腔相通，牙髓往往暴露，断片动度大，触痛明显。则可以诊断为以下哪种牙折
- A.冠折
 - B.冠折露髓
 - C.根折
 - D.牙冠斜折
 - E.冠根联合折
- 129、（A2 型题）患者，男。45 岁，教师。因进食时牙酸疼。检查 44 牙龈萎缩、无龋、牙颈部楔状缺损、口腔环境良好。每日刷牙 2 次，造成楔状缺损的原因中，不必考虑
- A.刷牙方法不正确
 - B.牙刷毛太硬
 - C.刷牙用力过大
 - D.喜进甜食
 - E.牙膏中磨擦剂粗糙
- 130、（A2 型题）患者，男，30 岁，右面部放射性疼痛 3 天。鉴别是否为牙源性疼痛具有价值的检查手段是
- A.拍摄曲面体层片
 - B.叩诊和牙髓电活力检查
 - C.选择性麻醉
 - D.问诊和探诊
 - E.牙齿松动度检查
- 131、（A2 型题）男，17 岁。半年前上前牙外伤冠折露髓未治，现因唇侧牙龈肿包就诊。医师应做的最重要的检查是

- A.叩诊
- B.松动度
- C.X线片
- D.温度测试
- E.牙周袋探诊

132、(A2型题)男,25岁。自述牙齿从小就有花斑,而且同村居民也有类似表现。检查见全口牙釉面均可见不同程度的散在黄褐色及白垩状斑,探牙面光滑而硬,无实质性缺损。该患者的牙病应诊断为

- A.猛性龋
- B.氟牙症
- C.静止龋
- D.四环素牙
- E.釉质发育不全

133、(A2型题)女,28岁。右上后牙遇热水痛3天,咬物不用此侧咀嚼3个月。检查见黑色充填物边缘继发龋达牙本质深层,探诊不敏感,叩痛(+).热测迟缓痛,并持续数十秒。该患牙诊断应是

- A.深龋
- B.继发龋
- C.慢性牙髓炎
- D.可复性牙髓炎
- E.牙本质过敏症

134、(A2型题)女,45岁。主诉左下后牙食物嵌塞痛。检查:左下第二磨牙温度测验,患牙感觉疼痛且持续一段时间。温度测验的记录应为

- A.敏感
- B.疼痛
- C.(+)
- D.(++)
- E.阳性

135、(A2型题)男,46岁。左上后牙咬物不适数月,冷刺激敏感、无自发痛。检查发现左上第一磨牙牙尖高陡,见裂纹越过斜嵴达远中边缘,叩痛(-),冷测正常,冰棒置于颊面一过性敏感。治疗方法不包括

- A.暂不处理,定期复查
- B.调整咬合
- C.根管治疗
- D.全冠修复
- E.粘接裂纹

136、(A2型题)患者,女,14岁。畸形中央尖折断,颊侧瘻管,叩(+),X线示根尖孔呈喇叭口状。治疗方案应选择

- A.根尖诱导成形术,每隔3~6个月复查1次,至X线观察到根尖有明显硬组织形成后,改做根管充填
- B.根尖诱导成形术,每隔12个月复查1次,至X线观察到根尖有明显硬组织形成后,改做根管充填
- C.盖髓术,每隔3~6个月复查1次,直至钙桥形成
- D.盖髓术,不需复查
- E.直接行根管治疗术,每隔半年复查1次,连续观察3年

137、(A2型题)患者,女,25岁。因牙面斑点要求进行前牙美观治疗,自诉从牙齿萌出后,牙面即有黄色斑块检查:全口牙均可见不同程度散在黄褐色及白垩状斑。该患牙最可能诊断为

- A.釉质发育不全症
- B.氟牙症
- C.四环素牙
- D.浅龋

E.遗传性乳光牙本质

138、(A2型题)患者,男,56岁,来院看牙。自述在化工厂工作。口腔卫生良好,几乎没有牙垢,自称每天刷3次牙齿,每次4分钟。因工厂停工,患者没有上班。爱吃甜食,爱喝碳酸饮料。口腔局部检查无异常,无充填物,除了6和6有牙尖半圆形缺损外。缺损表面光滑,牙本质已露出,但无冷热刺激痛和叩痛,牙体颜色无异常咬合基本正常,双侧组牙平衡合。牙龈轻度萎缩。X线片无异常患者和缺损的主要原因是

- A.龋坏
- B.酸蚀
- C.刷牙损伤
- D.自然磨耗
- E.外伤

139、(A2型题)男,19岁。牙龈增生数年。有癫痫病史。检查见全口牙牙龈增生,覆盖牙面1/3左右,牙龈质地坚韧,仅龈缘处略红。考虑该病最可能的诊断为

- A.牙龈纤维瘤病
- B.药物性牙龈增生
- C.边缘性龈炎
- D.坏死性龈炎
- E.侵袭性牙周炎

140、(A2型题)患者,男,31岁。左下后牙自发性肿痛,吸吮时易出血。自诉5天前曾用牙签剔牙。口腔检查:牙间乳头红肿,有明显探触痛,易出血。牙体无龋坏和非龋性疾病。叩诊(+),无松动,未探及牙周袋。可能的诊断是

- A.急性牙髓炎
- B.慢性牙髓炎急性发作
- C.急性根尖炎
- D.急性牙龈乳头炎
- E.三叉神经痛

141、(A2型题)男,45岁,刷牙时牙龈出血10年,检查见牙石(++),菌斑最多,牙龈红肿明显,探诊出血,袋深普遍4~6mm,附着丧失普遍2~4mm,X线片示牙槽骨有水平吸收。最可能的诊断是

- A.坏死性龈炎
- B.边缘性龈炎
- C.增生性龈炎
- D.慢性牙周炎
- E.侵袭性牙周炎

142、(A2型题)女,19岁。上前牙松动一年。检查:下前牙舌侧龈上牙石(+),其余牙未见龈上牙石,但有菌斑存在,上中切牙探诊深度7mm,松动Ⅰ度,探诊后出血;下颌第一磨牙近中探诊深度6mm,其他牙探诊深度仅3~4mm。该患者最可能的诊断是

- A.青春期龈炎
- B.广泛性侵袭性牙周炎
- C.边缘性龈炎
- D.局限性侵袭性牙周炎
- E.白血病时的牙周病损

143、(A2型题)男,30岁。下前牙牙龈处有瘻管口,通向根尖区,探诊深度5mm,牙齿松动Ⅰ度,X线片显示有典型的烧瓶形病变,根尖区阴影与牙槽骨吸收相连。最可能的诊断是

- A.慢性牙周炎
- B.根尖周炎
- C.牙周脓肿
- D.根折
- E.牙周牙髓联合病变

144、(A2型题)患者,女,45岁。右下后牙颊侧牙龈肿胀、疼痛3天。检查:右下第一、二磨牙间颊侧牙龈呈卵圆形膨隆,有波动感,右下第一磨牙松动Ⅰ度,诊断为急性牙周脓肿。若与牙槽脓肿鉴别诊断,不必要的一项检查是

- A.牙髓活力
- B.牙周袋的存在
- C.X线片
- D.是否有龈下牙石
- E.叩痛程度

145、(A2型题)患者,女,7岁,下颌第一恒磨牙做过窝沟封闭,但半年后做口腔检查时发现封闭剂脱落,少有的可能原因是

- A.儿童唾液丰富,隔湿困难
- B.牙面有牙石
- C.局部清洁不彻底
- D.光固化时间不足
- E.恒磨牙半萌出而致窝沟难以干燥

146、(A2型题)患者,女,8岁,因右下后牙食物嵌塞引起疼痛而就诊,检查发现:探(+)松(-)。叩诊检查不正确的是

- A.垂直叩
- B.侧面叩
- C.先叩患牙,再叩正常邻牙
- D.叩时用力要轻
- E.患儿对疼痛诉说不清时,观察患儿眼神及表情

147、(A2型题)患者,男,3岁,左上颌乳中切牙因外伤致牙齿嵌入牙槽窝,最恰当的处理是

- A.若牙冠偏向唇侧,拔除乳牙
- B.拉出嵌入的乳牙复位
- C.复位后固定
- D.拔出后再植
- E.不处理

148、(A2型题)患者,男,36岁,口腔多处溃疡1周,疼痛不能进食。检查:双颊、舌和口底可见小米粒大小的溃疡十余个,散在分布,周围黏膜充血发红。患者以往曾有多次类似发作病史。该患者最可能的诊断为

- A.疱疹性咽峡炎
- B.疱疹性龈口炎
- C.白塞病
- D.带状疱疹
- E.疱疹样口疮

149、(A2型题)患者,女,71岁,无烟酒嗜好,口腔内未进行义齿修复,舌腹区域出现大面积白色损害,边界清楚,表面粗糙,但触之柔软,无明显疼痛,最可能的诊断是

- A.疣状白斑
- B.颗粒状白斑
- C.非均质性白斑
- D.斑块状白斑
- E.皱纸状白斑

150、(A2型题)患者,男,8岁,活泼好动,身体健康,左颊黏膜颊脂垫处可见不规则溃疡,溃疡面较深,而疼痛不明显,最可能的诊断是

- A.结核性溃疡
- B.褥疮性溃疡
- C.阿弗他溃疡
- D.白塞病

E.自伤性溃疡

答案

1、正确答案：B

答案解析：题干中“近2日来，夜间痛剧烈，影响睡眠，并引起半侧头、面部痛”，提示患者疼痛的性质为“自发性痛、夜间痛、放散性痛”，均是急性牙髓炎疼痛的特点，因此患牙最可能的诊断是急性牙髓炎，正确答案是B。初步检查见左侧上下第一第二磨牙均有邻面和咬合面龋洞，温度测验则是确定急性牙髓炎患牙必须进行的一项检查。因此正确答案是D。由于患牙诊断为急性牙髓炎，当日有效的处理必然是开髓拔髓。因此正确答案是B。

2、正确答案：D

答案解析：

3、正确答案：B

答案解析：

4、正确答案：D

答案解析：题干中信息提示患牙牙冠呈棕褐色，切端重度磨损，叩痛（±），因此可能存在牙髓和根尖周疾病，首选应确定牙髓活力。故答案是D。根据提示：X线片检查见管内充填物距根尖部2.5mm，根管充填的质量描述应为“欠填”。因此正确答案是B。X线片检查见左上3根尖周有约0.5mm×1mm X线透射区，边缘整齐，最可能的诊断应是慢性根尖周肉芽肿。因此正确答案是E。根据题干中的检查：“左上3牙冠棕褐变色，切端重度磨损”，考虑与其牙髓感染有关的因素最可能是磨损，而非其他。因此正确答案是B。根据上题答案与其牙髓感染有关的因素最可能是磨损，则确定与左上3疾病有关因素的检查还应该包括咬合关系检查。因此正确答案是D。该患者的治疗设计应包括对左上3取根管充填物、调整咬合、根管治疗和冠修复，非根尖切除术的适应证。因此答案是E，其余均为干扰选项。

5、正确答案：B

答案解析：

6、正确答案：E

答案解析：

7、正确答案：B

答案解析：

8、正确答案：D

答案解析：

9、正确答案：E

答案解析：

10、正确答案：D

答案解析：妊娠性龈炎发生于个别牙或全口牙龈，以前牙区为重，龈缘和牙间乳头呈鲜红色或暗红色，松软光亮，触之易出血。白血病牙龈病损时，常由于病变白细胞大量浸润致牙龈苍白、脆弱。血象检查发现白细胞数目或形态异常可予以初步诊断。

11、正确答案：E

答案解析：

12、正确答案：A

答案解析：

13、正确答案：A

答案解析：患者牙龈出血，检查口腔卫生状况差，牙龈缘红，探诊出血，无附着丧失和牙槽骨吸收表现，诊断为边缘性龈炎。边缘性龈炎主要的治疗是龈上洁治术，治疗后可恢复正常，5个月后再出现的症状和表现比原来的重，有促进因素存在，符合妊娠期龈炎的表现。

14、正确答案：A
答案解析：

15、正确答案：B
答案解析：

16、正确答案：D
答案解析：

17、正确答案：B
答案解析：

18、正确答案：A
答案解析：

19、正确答案：E
答案解析：

20、正确答案：E
答案解析：

21、正确答案：C
答案解析：

22、正确答案：A
答案解析：

23、正确答案：E
答案解析：

24、正确答案：C
答案解析：

25、正确答案：C
答案解析：

26、正确答案：B
答案解析：

27、正确答案：E
答案解析：

28、正确答案：C
答案解析：

29、正确答案：E
答案解析：

30、正确答案：B
答案解析：

31、正确答案：A
答案解析：

32、正确答案：D

答案解析：

33、正确答案：B

答案解析：根据病变侵入深度分类，牙骨质龋为浅龋。

34、正确答案：C

答案解析：畸形中央尖是成釉器形态分化异常所致，表现为牙尖异常突起，发生在牙发育的早期阶段。而畸形舌侧窝、畸形根面沟、牙中牙均是牙内陷的各种表现，其发病机制主要是成釉器过度卷叠。故正确答案是C。

35、正确答案：D

答案解析：残髓炎的诊断要点是：①有牙髓治疗史；②具有牙髓炎疼痛的特点；③探查根管深部有探痛。因此正确答案应该是D。

36、正确答案：D

答案解析：根据离体牙测量资料，根尖狭窄部距牙齿根尖距离为0.5~2.0mm。这个距离是口腔医生测量工作长度时的参考数据。

37、正确答案：E

答案解析：早期邻面龋有效的检查方法是拍摄咬合翼片，可明确显示邻面龋脱矿的透射区。透照法需要特殊的器械，临床不作常规应用。

38、正确答案：D

答案解析：牙冠外伤6~8周后，外伤牙的牙髓状态才能最终确定。

39、正确答案：C

答案解析：慢性闭锁性牙髓炎未露髓，不会探及到穿髓孔，因此C为正确答案。

40、正确答案：B

答案解析：

41、正确答案：C

答案解析：盖髓剂的物理性能要求①有促进牙髓组织的修复再生能力。②对牙髓组织无毒性和无刺激性。③有较强的杀菌或抑菌作用。④有较强的渗透作用。⑤有消炎作用。⑥药效稳定，持久。⑦便于操作。故正确选项为C。

42、正确答案：A

答案解析：

43、正确答案：C

答案解析：牙髓活力测验对照牙常常选择同颌对侧同名牙。所以正确选项是C。

44、正确答案：B

答案解析：当X线片显示根尖周病变愈合、牙根继续发育并形成，或根管内探查根尖端有钙化物沉积时可进行常规根管治疗。

45、正确答案：B

答案解析：四环素牙可因药物种类，药量和用药年龄的不同而呈现出不同的颜色和深度。四环素牙对光敏感，可在紫外线或阳光下变色。四环素可通过胎盘引起乳牙着色。四环素在牙本质的沉积比在牙釉质中高4倍。四环素分子有螯合性质，可与牙组织形成稳固的四环素正磷酸盐复合物。

46、正确答案：E

答案解析：菌斑的基质由细菌利用蔗糖合成葡聚糖而成，而一些细菌表面结合的葡糖基转移酶（GTF）对葡聚糖有很强的亲和力，从而形成细菌集聚的基础。

47、正确答案：E

答案解析：慢性龋由于病程缓慢，有充足的时间刺激牙髓牙本质复合体在髓腔一侧形成较多的第三期牙本质，可以起到保护牙髓的作用。

48、正确答案：B

答案解析：牙震荡的治疗原则：①1~2周内应使患牙休息，必要时降低咬合以减轻患牙的咬合力负担；②受伤后1、3、6、12个月应进行定期复查。观察1年后，若牙冠不变色，牙髓活力测试正常，可不进行处理；若有牙髓坏死迹象时，应进一步作根管治疗术。必须记住，在年轻恒牙，其活力可在受伤1年后才丧失。

49、正确答案：D

答案解析：完全脱位牙在0.5小时内进行再植，90%患牙的可避免发生牙根吸收。如牙齿已落地污染，不能即刻复位，可将患牙置于患者的舌下或口腔前庭处，也可放在盛有牛奶、生理盐水或自来水的杯子内，切忌干藏。根尖发育完成的脱位牙，若就诊迅速或复位及时，应在术后3~4周再做根管治疗术。如果脱位在2小时以后再就诊者，牙髓和牙周膜内细胞已坏死，不可能期望牙周膜重建。年轻恒牙完全脱位，若就诊迅速或自行复位及时者，牙髓常能继续生存，不要贸然拔髓，一般疗效是良好的。

50、正确答案：D

答案解析：对因治疗：调磨创伤性咬合力，调磨过陡的牙尖；均衡全口咬合力的负担；诊治其他部位的牙齿疾病，修复缺失牙等。

51、正确答案：D

答案解析：引起假阳性反应的原因：①探头或电极接触了大面积的金属修复体或牙龈，使电流流向了牙周组织。②未充分隔湿或干燥受试牙，以至电流泄漏至牙周组织。③液化性坏死的牙髓有可能传导电流至根尖周，当电流调节到最大刻度时，患者可能有轻微反应。④患者过度紧张和焦虑，以致在探头刚接触牙面或被问知感受时即示意有反应。引起假阴性反应的原因：①患者事前用过镇痛剂、麻醉剂或酒精饮料等，使之不能正常的感知电刺激。②探头或电极未能有效的接触釉质，以致妨碍了电流到达牙髓。③根尖尚未发育完全的新萌出牙，其牙髓通常对电刺激无反应。④根管内过度钙化的牙，其牙髓对电流刺激通常无反应，常见于一些老年患牙。⑤刚受过外伤的患牙可能对电刺激无反应。

52、正确答案：B

答案解析：根尖周组织发生慢性炎症性变化，病损中分化出的破骨细胞将邻近牙槽骨和牙骨质吸收破坏，骨质破坏的区域由炎症肉芽组织取代。肉芽组织中含有大量慢性炎症细胞和成纤维细胞，慢性炎症细胞可消灭侵入根尖周组织的细菌和毒素，成纤维细胞则可增殖形成纤维组织，并以纤维被膜的方式包绕病变区域，限制炎症扩散到深部组织。这种以炎症性肉芽组织形成为主要病理变化的慢性根尖周炎即为根尖周肉芽肿，它是慢性根尖周炎的主要病变类型。

53、正确答案：D

答案解析：

54、正确答案：C

答案解析：手用不锈钢根管切削器械器械：主要是K型和H型器械以及它们的改良产品。

55、正确答案：B

答案解析：K型根管器械（1915年由Kerr公司制造而命名）：是使用最广泛的根管切削器械，是由截面为方形或三角形的不锈钢丝控制而成。

56、正确答案：B

答案解析：尖端直径为号数除以100，末端直径为尖端直径+0.32 mm。

57、正确答案：B

答案解析：与酸蚀-冲洗技术相比，自酸蚀粘接技术酸蚀与预处理作用同时进行，免去冲洗步骤。

58、正确答案：E

答案解析：黏结剂与牙本质之间借助于微机械嵌合，化学键、分子间引力，氢键等结合。

59、正确答案：A

答案解析：氟牙症色素位置较浅，而且又属于外源性染色---为锰或铁的化合物，轻中度着色病变在釉质外层的 1/4~1/3 处，色素在釉质外层最深，向内层逐渐变浅或不染色。

60、正确答案：E

答案解析：自酸蚀粘接系统是通过使牙本质表面脱矿、改性，保留玷污层并渗透进入脱矿牙本质中的胶原纤维网内形成混合层而实现粘接的，故答案选 E。

61、正确答案：D

答案解析：牙本质敏感症的发病机制是外界刺激通过暴露的牙本质小管刺激牙髓牙本质复合体中的神经末梢，使患牙表现为对机械刺激和冷、酸、甜刺激的接触性敏感。在临床检查时，用探针划探牙面，可准确找到牙本质裸露部位上的敏感点或敏感区，从而提供可靠的诊断依据。故正确答案为 D。

62、正确答案：D

答案解析：

63、正确答案：E

答案解析：根尖诱导成形术针对于不能保存活髓的年轻恒牙，根管内导入氢氧化钙可以诱导根尖发育成形，每 3~6 个月复查一次。当 X 线片显示根尖延长或钙化组织沉积并将根端闭合后，可进行常规根管充填。

64、正确答案：A

答案解析：融合牙是由两个正常牙胚的牙釉质或牙本质融合在一起而成的。

65、正确答案：D

答案解析：

66、正确答案：B

答案解析：如果患牙塑化后需观察或需分次治疗，则可先暂封窝洞，2 周后复诊再行垫底和充填；如果患牙塑化后不需观察，则用于棉球擦干髓腔，用磷酸锌水门汀垫底，永充材料充填窝洞。

67、正确答案：D

答案解析：龋活跃者口腔中的乳杆菌数量很大，随着龋病严重程度加重，乳杆菌数量亦随之增加。

68、正确答案：C

答案解析：菌斑成熟的关键成分是葡聚糖在细菌与牙面，细菌与细菌之间起桥梁作用，促进细菌对牙面获得膜的黏附和细菌间的集聚。

69、正确答案：E

答案解析：对牙内陷的治疗，应视其牙髓是否遭受感染而定。①早期应按深龋处理，将空腔内软化组织去净并形成洞形，按间接盖髓术处理。②若已出现牙髓和牙周疾病，则根据牙髓状态、牙根发育情况和牙周组织受累情况，选择进一步处理的方法。凡导致牙髓、牙周同时发病者，应在行根管治疗术的同时行牙周病手术治疗。③若牙齿外形也有异常，必要时可拔除患牙再修复。若裂沟已达根尖部，由于相互交通造成牙周组织广泛破坏，则预后不佳，应予拔除。

70、正确答案：D

答案解析：牙震荡临床表现有：患牙轻微酸痛感，可有对于冷刺激一过性敏感症状；牙冠完整，通常不伴牙体组织的缺损；轻微松动或不松动，无移位；垂直向或水平向叩痛（±）~（+）。

71、正确答案：C

答案解析：根尖周透射区代表根尖周的慢性炎症性疾病，通常患牙的牙髓活力已经丧失。只有牙髓坏死，炎性物质波及根尖周，才出现根尖周的病变。

72、正确答案：C

答案解析：根尖周透射区代表根尖周的慢性炎症性疾病，通常患牙的牙髓活力已经丧失。只有牙髓坏死，炎性物质波及根尖周，才出现根尖周的病变。

73、正确答案：B

答案解析：对于器械分离，可以使用从旁路进行根管充填的方法（使用与不规则根管），或者使用其他显微根管内窥镜去除分离器械，若以上方法均不能取出，则可以使用根尖手术进行根尖部的清理。

74、正确答案：A

答案解析：器械的长度：从尖端到柄的距离可分别为 21、25、28、31 mm，但工作端长度均为 16 mm。

75、正确答案：C

答案解析：牙齿叩诊主要通过金属器械施加于牙齿上的敲击力来反映牙周膜的状态。正常牙周韧带将牙根悬吊于牙槽骨内，作用于牙冠上的力量通过牙根伸入，牙周膜中的神经纤维感知。当牙周膜处于炎症水肿状态时，对压力的感受更加敏感。故正确答案为 C。

76、正确答案：A

答案解析：本题考核的知识点是慢性根尖周炎的诊断。慢性根尖周炎时，根尖周骨质被吸收破坏，因此 X 线检查才能明确诊断。

77、正确答案：A

答案解析：牙齿釉质发育不全是指病损发生在牙齿釉质发育时期，牙齿萌出后才显示，是牙齿釉质发育不全遗留的一种后遗症。牙齿萌出后口服氟片已无任何作用。

78、正确答案：D

答案解析：急性牙髓炎以剧烈疼痛为临床特征，A、B、E 均不能达到有效止痛的目的。此题的难点在于 C 和 D 的选择，摘除炎症牙髓可有效消除疼痛。以往在急诊处置时常采用开髓开放的方法，通过髓腔释放压力来减轻患牙疼痛，但如此做法会使口腔细菌进入敞开根管的系统，可能导致本为非感染根管的患牙变为感染根管，进一步导致后续的根管治疗成功率降低。现已不提倡将髓腔开放于口腔环境中。急性牙髓炎临床上摘除牙髓后可行一次根管治疗，如为急诊，可摘除牙髓止痛后封药关闭髓腔，避免进一步感染，择期再行根管清理、成形或充填。故正确答案是 D。

79、正确答案：D

答案解析：牙隐裂多起自深而宽的窝沟底，临床表常见裂与窝沟重叠。

80、正确答案：E

答案解析：牙髓组织可以耐受的温度范围是 20~50°C，将小于 10°C 称为冷测试，高于 60°C 为热测试。

81、正确答案：C

答案解析：嵌入性脱位的年轻恒牙不能强行拉出复位，应该让其自然萌出。

82、正确答案：E

答案解析：大量研究表明侵袭性牙周炎主要的优势菌为伴放线聚集杆菌。因此选 E。

83、正确答案：D

答案解析：

84、正确答案：B

答案解析：急性坏死性溃疡性龈炎常发生于青壮年，以男性吸烟者多见，发病急，以龈乳头和龈缘的坏死为特征性损害，病变常见于下前牙，疼痛明显，患处牙龈极易出血，并伴有全身症状，不会出现明显的牙齿松动，因此选 B。

85、正确答案：E

答案解析：牙周组织破坏程度与局部刺激物的量不成比例的是侵袭性牙周炎，表现为牙周组织发生快速进展的附着丧失伴牙槽骨吸收，其破坏与局部菌斑刺激量不成正比。故本题选 E。

86、正确答案：C

答案解析：急性坏死性溃疡性龈炎的主要致病菌是梭形杆菌与螺旋体。因此选 C。

87、正确答案：C

答案解析：急性坏死性溃疡性龈口炎患者在抵抗力极度低下、同时感染产气荚膜杆菌时，可使面颊部组织迅速坏死，甚至穿孔，发生走马牙疳。故本题选 C。

88、正确答案：B

答案解析：成人慢性牙周炎具有病变进展缓慢、存在相对稳定的病变静止期。故本题选 B。

89、正确答案：B

答案解析：慢性牙周炎可发生于任何年龄，但大多数患者为 35 岁以上，随着年龄的增长，患病率和疾病的炎症程度也增加，但也偶可发生于青少年和儿童，故本题答案为 B。

90、正确答案：C

答案解析：掌跖角化-牙周破坏综合征表现为手掌和脚掌部位的皮肤过度角化和脱屑，牙周组织严重破坏，发病率为百万分之一到百万分之四。故本题选 C。

91、正确答案：D

答案解析：Papillon-Lefevre 综合征即掌跖角化-牙周破坏综合征，出现手掌、足底、膝部及肘部局限性的过度角化和牙周严重破坏，病变不累及躯干。因此选 D。

92、正确答案：E

答案解析：菌斑微生物仍为主要病因。故本题选 E。

93、正确答案：E

答案解析：牙周脓肿是牙周炎的伴发症状，有深牙周袋，牙龈呈椭圆形隆起，脓肿后期扪诊有波动感，有牙周炎后期的表现，牙齿松动，牙周脓肿的脓肿部位局限在牙周袋壁，牙龈脓肿的脓肿局限在龈乳头及龈缘，所以选 E。

94、正确答案：C

答案解析：发生于种植体周软组织的炎症性损害称为种植体周黏膜炎。种植体周围黏膜炎表现为软组织的炎症和水肿，通常不表现为周围骨丧失。故本题选 C。

95、正确答案：D

答案解析：

96、正确答案：D

答案解析：龈袋一旦发生附着水平丧失，即为牙周袋。故本题选 D。

97、正确答案：C

答案解析：

98、正确答案：E

答案解析：对牙周兼性厌氧菌及微需氧菌感染无效的是甲硝唑。甲硝唑对专性厌氧菌具有杀菌作用。故本题选 E。

99、正确答案：B

答案解析：牙周基础治疗后，牙龈肥大增生仍未消退，适用的手术治疗方法为牙龈切除术。此为牙龈切除术适应证之一。故本题选 B。

100、正确答案：A

答案解析：刮治器入袋时，工作面应与根面平行（0°）。故本题答案是 A。

101、正确答案：D

答案解析：超声洁牙禁止将工作头停留在一点上振动，以免损伤牙面，因此选 D。

102、正确答案：E

答案解析：

103、正确答案：D

答案解析：

104、正确答案：A

答案解析：

105、正确答案：D

答案解析：

106、正确答案：E

答案解析：

107、正确答案：A

答案解析：

108、正确答案：B

答案解析：

109、正确答案：B

答案解析：

110、正确答案：A

答案解析：

111、正确答案：A

答案解析：

112、正确答案：B

答案解析：

113、正确答案：D

答案解析：

114、正确答案：D

答案解析：

115、正确答案：C

答案解析：

116、正确答案：E

答案解析：

117、正确答案：B

答案解析：

118、正确答案：A

答案解析：

119、正确答案：D

答案解析：

120、正确答案：C

答案解析：

121、正确答案：E

答案解析：

122、正确答案：E

答案解析：

123、正确答案：A

答案解析：

124、正确答案：E

答案解析：

125、正确答案：A

答案解析：

126、正确答案：A

答案解析：

127、正确答案：C

答案解析：

128、正确答案：E

答案解析：冠根折：折断线累及牙冠和根部，以斜行冠根折多见，均与口腔相通，牙髓往往暴露，患牙断片动度大，触痛明显。此占牙齿外伤的一小部分。

129、正确答案：D

答案解析：

130、正确答案：B

答案解析：患者右面部放射性疼痛3天，可能为急性牙髓炎的表现，为进一步确诊需要检查牙髓活力。

131、正确答案：C

答案解析：患者半年前上前牙外伤冠折露髓未治，现因唇侧牙龈肿包就诊，考虑最大的可能性是患慢性根尖周炎，可以确诊的检查项目是X线片检查。

132、正确答案：B

答案解析：患者全口牙齿自幼就有黄褐色及白垩状斑，同村居民也有类似表现，提示患者患有地区性的牙齿发育异常性的疾病，应考虑为氟牙症；而题干未提供幼时的疾病和用药史，不应考虑四环素牙和釉质发育不全症；探牙面光滑而硬，无实质性缺损可与猛性龋鉴别。因此标准答案为B。

133、正确答案：C

答案解析：题干提示“龋洞达牙本质深部，探诊不敏感”和“热测迟缓痛，并持续数十秒”提示患牙已有牙髓炎症状，可以排除A、B和E选项。而且题干中并未提及有自发性痛，且叩痛(+)，表明牙髓炎为慢性；因此标准答案为C。

134、正确答案：A

答案解析：本牙髓活力温度测验结果是患牙与患者本人正常牙的牙髓对照后的结果，具体表示法为“正常、敏感、迟缺、无反应”四级记录结果。因此正确答案为A。

135、正确答案：A

答案解析：题干中“咬物不适，牙尖高被，裂纹越过斜嵴达远中边缘”提示患牙诊断为牙隐裂，“冷测正常，冰棒置于颊面一过性敏感”说明裂线达到牙本质深层，可能累及牙髓。这种情况应做牙髓治疗。因牙髓病治疗过程中牙体硬组织会进一步削弱，为了防止裂线的加深，治疗前应降合，治疗期间可粘接裂纹，治疗完毕要及时冠修复。

136、正确答案：A

答案解析：

137、正确答案：A

答案解析：全口牙均可见不同程度散在黄褐色及白垩状斑，未提及地区、饮水等因素，排除氟牙症。未提及牙本质染色及相关服药史，排斥四环素牙。正确答案为A。

138、正确答案：B

答案解析：化工厂工作，提示为酸蚀症。其余表述都是干扰项。

139、正确答案：B

答案解析：抗癫痫史，服用治疗癫痫病的药物，伴牙龈增生，最可能为药物性牙龈增生。故本题答案是B。

140、正确答案：D

答案解析：自发疼痛，牙间乳头红肿、易出血，可知牙龈乳头发生炎症，牙体无龋坏和非龋性疾病，排除牙髓和根尖周病变，三叉神经痛的疼痛有扳机点。故此题选D。

141、正确答案：D

答案解析：中度牙周袋伴附着丧失，结合发病年龄，口腔卫生状况，可明确诊断为慢性牙周炎。故选D。

142、正确答案：D

答案解析：

143、正确答案：E

答案解析：X线片显示有典型的烧瓶形病变，根尖区阴影与牙槽骨吸收相连。最可能的诊断是牙周牙髓联合病变。故本题选E。

144、正确答案：D

答案解析：牙周脓肿与牙槽脓肿的鉴别点有感染来源、牙体情况、牙髓活力、脓肿部位、疼痛程度、牙松动度、叩痛、X线表现以及病程几方面区别，是否有龈下牙石不能加以区别。故本题选D。

145、正确答案：D

答案解析：

146、正确答案：C

答案解析：叩诊检查用力要轻，可先叩正常牙，在患儿未注意时再叩患牙，这样才可得到较确切的反应。因此本题的正确答案为C。

147、正确答案：A

答案解析：

148、正确答案：E

答案解析：

149、正确答案：E

答案解析：

150、正确答案：E

答案解析：