

目前治疗无并发症的淋病奈瑟菌宫颈炎首选抗生素是

- A.四环素
- B.头孢类**
- C.红霉素
- D.甲硝唑
- E.青霉素类

解析:淋病患者首选头孢曲松钠 250mg, 单次肌肉注射加阿奇霉素 1g 顿服。

婴幼儿患病住院后最突出的心理反应是

- A.思念亲人
- B.分离性焦虑**
- C.建立母子病室
- D.准备美味可口的食物
- E.播放悦耳动听的音乐

解析:住院使患儿离开了熟悉的生活环境, 由于医院规章制度的限制和各种诊疗、护理措施, 患儿常出现各种心理反应。分离焦虑指由现实的或预期的与家庭、日常接触的人、事物分离时引起的情绪低落, 甚至功能损伤。

下列均是过敏性紫癜的病因, 除了

- A.感染
- B.食物
- C.花粉、尘埃
- D.药物
- E.自身免疫性疾病**

解析:过敏性紫癜的病因包括:①感染;②食物;③药物;④其他:如花粉、尘埃、昆虫咬伤、寒冷刺激及疫苗接种等。

绝经期内分泌发生变化错误的是

- A.FSH 水平降低**
- B.GnRH 水平增高
- C.雄激素水平降低
- D.孕激素水平降低
- E.雌激素水平降低

解析:卵泡闭锁导致雌激素和抑制素水平降低以及 FSH 水平升高, 是绝经的主要信号。

阿司匹林的药理作用是

- A.兴奋肾上腺素
- B.抗组胺作用
- C.解热镇痛**
- D.解痉
- E.抗凝

解析:阿司匹林的药理作用:抗炎、镇痛、解热等作用。

患者, 女, 50 岁。最近血压波动在(160~170)/(90~95)mmHg, 诊断为高血压, 属于

A.2 级高血压

B.3 级高血压

C.1 级高血压

D.收缩期高血压

E.舒张期高血压

解析:根据中国高血压防治指南,将高血压分为 1~3 级,其中 2 级高血压是指收缩压 160~179mmHg 和/或 100~109mmHg,该患者血压波动在(160~170)/(90~95)mmHg,属于 2 级高血压。

能迅速终止心绞痛发作的药物

A.硝苯地平

B.西地兰

C.硝酸异山梨醇酯

D.普萘洛尔

E.吗啡

解析:硝酸酯类药物是最有效、作用最快的终止心绞痛发作的药物,如硝酸异山梨醇酯。

临时备用医嘱的有效期为

A.6 小时

B.48 小时

C.12 小时

D.24 小时

E.36 小时

解析:临时备用医嘱指自医生开写医嘱起 12 小时内有效。

患者,男性,60 岁,因发热就诊,实验室检查示:HIV(+),护士应将此结果首先告诉

A. 病人

B.子女

C.朋友

D.配偶

E.曾经性伴侣

解析:隐私保密权是指病人要求医方不得侵犯自身隐私的权利。病人有权利要求护士对其既往史、婚育史、生理缺陷等进行保密。

患者,男,32 岁。TAT 皮试结果阳性,因病情需要,采用脱敏注射法,正确的方法和药物剂量为

A.分 3 次注射,剂量递增

B.分 4 次注射,剂量递增

C.分 4 次注射,剂量递减

D.分 4 等份分次注射

E.分 3 等份分次注射

解析:脱敏注射法是给过敏试验阳性者分多次少剂量注射药液,以达到脱敏目的的方法。具体方法为:分 4 次注射,小剂量并逐渐增加,每隔 20 分钟肌内注射 1 次,每次注射后均应密切观察。

出现肺水肿症状时，护士应首先采取的措施是

- A.高流量吸氧
- B.立即停止输液**
- C.给予强心扩管药
- D.通知医生
- E.四肢轮流结扎

解析:发现肺水肿症状，应立即停止输液，并通知医生，进行紧急处理。

急性心肌梗死 24 小时内应禁用的药物是

- A.利多卡因
- B.速尿
- C.尿激酶
- D.硝酸甘油
- E.洋地黄**

解析:急性心肌梗死 24 小时内禁止使用洋地黄制剂。

患儿，女，5 岁，2 周前与水痘患儿有密切接触。现该患儿体温为 39℃，胸前出现红斑疹、丘疹，护士不能采用的降温措施是

- A.冰枕
- B.温湿敷
- 多易哈佛

C.阿司匹林口服

- D.适量对乙酰氨基酚口服易哈佛
- E.吲哚美辛栓剂直肠用药

解析:水痘患儿需要降低体温时可用物理降温，忌用阿司匹林，以免增加 Reye 综合征的危险。卧床休息，饮食清淡，多喝水。

小儿急性喉炎引起呼吸困难的原因不包括

- A.小儿喉腔较小
- B.小儿喉内黏膜松弛，黏膜与黏膜下层附着疏松
- C.喉黏膜下淋巴组织及腺样体不丰富，抵抗力弱**
- D.小儿咳嗽反射差，分泌物不易排除
- E.小儿神经系统不稳定，易发生喉痉挛

解析:儿童喉部呈漏斗形，相对较窄，软骨柔软，黏膜柔嫩，富有血管及淋巴组织，故感染后易发生充血、水肿，引起喉头狭窄，出现声音嘶哑和吸气性呼吸困难。

患者王某，患伤寒，需做大量不保留灌肠，为此患者灌肠的液量及液面与肛门的距离是

- A.1000ml，不超过 50cm
- B.500ml 以内，不超过 4cm
- C.1000ml，不超过 30cm
- D.500ml，不超过 20cm
- E.500ml 以内，不超过 30cm**

解析:为伤寒病人灌肠时，溶液量不得超过 500ml，压力要低，即液面距肛门不得超过 30cm。

肝与其相表里的是

- A.胆
- B.脾
- C.大肠
- D.小肠
- 国易哈佛
- E.肾

解析:心与小肠,肺与大肠,脾与胃,肝与胆,肾与膀胱,一脏一腑,一阴一阳,一表一里,它们所属经脉互相络属,组成脏腑表里关系。

大量不保留灌肠的高度

- A.<30cm
- B.>30cm
- C.40~60cm
- D.30~40cm
- E. >60cm

解析:大量不保留灌肠的灌肠筒筒内液面高于肛门约 40~60cm。

成人正常颅内压的正常值

- A.50~70mmH₂O
- B.50~100mmH₂O
- C.70~100mmH₂O
- D.70~200mmH₂O
- E.150~200mmH₂O

解析:成人颅内压的正常值为 70~200mmH₂O。

灌肠过程中患者有便意,正确的处理方式是

- A.立即停止灌肠,并报告医生
- B.告诉患者深呼吸,放松腹肌
- C.捏紧肛管并挤捏
- D.抬高灌肠筒高度
- E.转移患者注意力

解析:灌肠过程中,如患者感觉腹胀或有便意,可嘱患者张口深呼吸,放松腹部肌肉,并降低灌肠筒的高度以减慢流速或暂停片刻,以便转移患者的注意力,减轻腹压,同时减少灌入溶液的压力。

中骨盆平面狭窄者,其坐骨棘间径

- A.<10cm
- B.<8cm
- C.<12cm
- D.<9cm
- E.<11cm

解析:中骨盆横径也称坐骨棘间径。两坐骨棘间的距离,平均值约为 10cm。

浅二度烧伤主要伤及

- A.表皮浅层
- B.表皮全层
- C.真皮乳头层
- D.皮肤全层
- E.真皮网状层

解析:浅Ⅱ度烧伤伤及表皮的生发层及真皮乳头层。

头部外伤患者鼻腔流出血性液体，眼睑青紫，结膜下出血，嗅觉丧失，该患者损伤的部位是

- A.面部软组织损伤
- B.颅盖骨骨折
- C.颅前窝骨折
- D.颅中窝骨折
- E.颅后窝骨折

解析:颅前窝骨折表现为眼睑、球结膜下有瘀斑，有脑脊液鼻漏，嗅神经损伤。

患者男，20岁。因腿部被铁钉刺伤急诊入院。医嘱:破伤风抗毒素注射。注射前询问患者，得知其1周前曾用过破伤风抗毒素，破伤风抗毒素皮试液浓度为

- A.500IU/ml
- B.150IU/ml**
- C.15IU/ml
- D.50IU/mi
- E.1001U/ml

解析:破伤风抗毒素皮试液的标准为每毫升含破伤风抗毒素150IU。

“三凹征”是指

- A.胸骨上窝、锁骨下窝、纵隔在吸气时明显下陷
- B.胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙在呼气时明显下陷
- C.胸骨上窝、锁骨上窝、纵隔在吸气时明显下陷
- D.胸骨上窝、锁骨上窝、纵隔在呼气时明显下陷
- E.胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙在吸气时明显下陷

解析:吸气性呼吸困难病人吸气费力，出现明显三凹征(胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙或腹上角凹陷)。

医疗事故分为几级

- A.2
- B.3
- C.4**
- D.5
- E.1

解析:《[医疗事故处理条例]》第四条规定，根据对病人人身造成的损害程度，将医疗事故分为四级。

顺铂的输注方式

A.静脉输注

- B.皮内注射
- C.皮下注射
- D.口服
- E.肌肉注射

解析:顺铂可采用静脉注射或静脉滴注, 30mg/d。

护理道德的基本原则是

A.不伤害原则、行善原则、公正原则、尊重原则

- B.不伤害原则、互利原则、平等原则、遵从原则
- C.平等原则、主动原则、行善原则、尊重原则
- D.不伤害原则、行善原则、平等原则、互利原则
- E.协调原则、公正原则、尊重原则、进取原则

解析:护理伦理学是关于护理职业道德的科学, 基本原则包括尊重原则、不伤害原则、公正原则、行善原则等。

地尔硫卓抗心绞痛作用的主要机理为

- A.降低心脏后负荷, 减少心肌耗氧量
- B.降低心脏前负荷, 减少心肌耗氧量
- C.扩张冠状动脉, 增加心肌供氧
- D.减慢心率, 减弱心肌收缩力, 减少心肌耗氧**
- E.降低血浆肾素活性, 扩张周围血管, 减少心肌耗氧量

绒毛膜癌发生转移, 最常见的部位是

- A.肺**
- B.脑
- C.肾
- D.骨骼
- E.阴道

解析:绒毛膜癌主要经血行播散, 最常见的转移部位是肺, 其次是阴道、盆腔、肝、脑等。

二尖瓣膜位于

- A.右心室与主动脉之间
- B.左、右心室之间
- C.左心室与主动脉之间
- D.左侧房室之间**
- E.右侧房室之间

解析:左心房、室之间有二尖瓣, 左房、室间通过二尖瓣相通。

手术室的无菌手术感染率要求小于

- A.0.1%
- B.0.5%**
- C.1.0%
- D.1.5%

E.2.0%

解析:无菌操作和消毒隔离应严格执行无菌操作规程无菌手术感染率小于 0.5%。

血压测量时，两次测量的时间间隔不少于

A.20 秒

B.30 秒

C.40 秒

D.50 秒

E.60 秒

解析:测量血压时，应相隔 1~2 分钟重复测量，取 2 次读数的平均值记录。

患者，男，36 岁。患慢性痢疾，纤维结肠镜检查示病变部位在乙状结肠，对其进行保留灌肠时宜采取

A.右侧卧位

B.头低脚高位

C.头高脚低位

D.屈膝位

E.左侧卧位

解析:保留灌肠时应根据患者病情安置不同卧位，如慢性细菌性痢疾，病变多在乙状结肠和直肠，采用左侧卧位为宜。

开放性气胸病理生理变化主要是

A.纵隔扑动

B.肺萎陷

C.纵隔移位

D.皮下气肿

E.反常呼吸运动

解析:开放性气胸患者吸气时健侧负压增大，呼气时减小，使纵隔随呼吸而左右摆动，这种现象称为纵隔扑动。

护士吊销执照后几年内不能注册

A.两年

B.一年

C.三年

D.五年

E.四年

解析:对注册有效期届满未延续注册的、受吊销《护士执业证书》处罚且自吊销之日起满 2 年的护理人员，需要重新进行执业注册。

乙醇拭浴的浓度应为

A.60%~70%

B.20%~30%

C.45%~55%

D.40%~50%

E.25%~35%