

**2017 年全国卫生专业技术资格考试护理学(中级)  
考前压轴密卷**

**社区护理学**

**模拟试卷(二)**

金英杰国家医学考试研究中心 编



## 答题须知

- 1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
- 2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
- 3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
- 4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
- 5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
- 6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
- 7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
- 8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
- 9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
- 10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

## 模拟试卷(二)

### 基础知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 肝门静脉压力增高时,下列病理变化中最早出现的是
  - 腹水
  - 充血性脾大
  - 上消化道出血
  - 食管胃底静脉曲张
  - 腹壁静脉怒张
- 属于手术室限制区的是
  - 走廊
  - 更衣室
  - 手术间及刷手间
  - 休息室
  - 敷料准备间
- 肛裂好发生于膝胸位时的
  - 12 点处
  - 8 点处
  - 10 点处
  - 4 点处
  - 3 点和 6 点处
- 在普查和诊断肺癌时,下列检查占重要地位的是
  - 肺功能检查
  - 胸部 X 线摄片检查
  - 痰细胞学检查
  - 纤维支气管镜检查
  - 胸腔积液检查
- 胎盘早剥的病因除外
  - 妊娠高血压综合征
  - 外伤
  - 肾炎
  - 母体有血管病变
  - 胎膜早破
- 肿瘤转移途径最常见的是
  - 直接蔓延
  - 跳跃性转移
  - 血行转移
  - 种植性转移
  - 淋巴道转移
- 股骨下 1/3 骨折,易造成
  - 股动脉损伤
  - 腓动脉损伤
  - 皮神经损伤
  - 肱静脉损伤
  - 坐骨神经损伤
- 阴道毛滴虫最适合的生长环境 pH 为
  - 2~3.5
  - 3.6~4.2
  - 4.3~5.2
  - 5.5~6
  - 6.3~6.8
- 导致产后出血原因中最常见的是
  - 胎盘残留
  - 胎盘嵌顿
  - 软产道损伤
  - 血友病
  - 子宫收缩乏力
- 外科最常见的脱水类型是
  - 原发性脱水
  - 慢性脱水
  - 高渗性脱水

- D.低渗性脱水  
E.等渗性脱水
- 11.胃癌的转移途径中主要是
- A.直接浸润  
B.淋巴转移  
C.血行转移  
D.腹腔种植  
E.肝肾转移
- 12.可以反映心脏后负荷的指标是
- A.血压  
B.脉搏  
C.中心静脉压  
D.肺动脉楔压  
E.周围血管阻力
- 13.阻塞性肺气肿的病理分型按累及肺小叶的部位,可分为
- A.小叶中央型、气肿型、混合型  
B.小叶中央型、气肿型、全小叶型  
C.小叶中央型、全小叶型、混合型  
D.气肿型、全小叶型、混合型  
E.全小叶型、气肿型、支气管炎型
- 14.病毒性脑炎最常见的病原体是
- A.肠道病毒  
B.科萨奇病毒  
C.EB病毒  
D.腺病毒  
E.疱疹病毒
- 15.临床最主要导致新生儿颅内出血的原因是
- A.窒息、产伤  
B.脑血管先天畸形  
C.脑膜炎  
D.血友病  
E.输注高渗液体
- 16.以下疾病可表现为前囟早闭或过小的的是
- A.佝偻病  
B.小头畸形  
C.呆小病  
D.早熟  
E.脑肿瘤
- 17.乳牙出齐的年龄一般在
- A.10~12个月  
B.12~18个月  
C.20~24个月  
D.2~2.5岁  
E.3~3.5岁
- 18.最严重的肾损伤类型是
- A.肾挫伤  
B.肾盂部分裂伤  
C.肾实质部分裂伤  
D.肾横断  
E.肾蒂损伤
- 19.微循环的灌注状态取决于
- A.心功能、血容量、血压  
B.心功能、周围血管张力、脉压  
C.血容量、血压、周围血管张力  
D.心功能、血容量、周围血管张力  
E.血容量、脉压、周围血管张力
- 20.每人每天需要氨基酸的量是
- A.0.6~1.0 g/(kg·d)  
B.1.0~1.5 g/(kg·d)  
C.1.3~1.8 g/(kg·d)  
D.2.0~2.5 g/(kg·d)  
E.2.6~3.0 g/(kg·d)
- 21.确诊恶性肿瘤最可靠的方法是
- A.血清酶学检查  
B.CT  
C.MRI  
D.病理检查  
E.X线造影
- 22.确诊菌血症的可靠证据是
- A.表现脉搏、呼吸快,体温高  
B.神志淡漠、嗜睡  
C.出现黄疸、皮下淤血  
D.肝、脾大  
E.血细菌培养阳性
- 23.成年人体液量约占体重的

- A.35%  
B.45%  
C.50%  
D.60%  
E.65%
- 24.丹毒指的是  
A.急性管状淋巴管炎  
B.急性网状淋巴管炎  
C.疖病  
D.淋巴结炎  
E.痈
- 25.肠套叠病人特征性 X 线表现为  
A.杯口状阴影  
B.鸟嘴状阴影  
C.立位 X 线片见多个气-液平面  
D.鱼肋骨刺征  
E.充盈缺损
- 26.正常 5 个月小儿的体重是出生体重的  
A.1.5 倍  
B.2 倍  
C.3 倍  
D.3.5 倍  
E.5 倍
- 27.输卵管通液检查的禁忌情况是  
A.月经干净 5 天  
B.术前体温 36.8 °C  
C.阴道炎治疗中  
D.婚后 2 年不孕  
E.脂肪瘤
- 28.暴发性脑膜炎的病原体是  
A.大肠埃希菌  
B.肺炎链球菌  
C.金黄色葡萄球菌  
D.流感嗜血杆菌  
E.脑膜炎双球菌
- 29.急性心肌梗死临床上特征性的心电图改变是  
A.ST 段弓背向上抬高  
B.ST 段弓背向下  
C.高大的 R 波  
D.ST 段水平下移  
E.T 波倒置
- 30.与慢性胃炎发病有关的细菌为  
A.大肠埃希菌  
B.沙门球菌  
C.空肠弯曲菌  
D.幽门螺杆菌  
E.嗜盐杆菌
- 31.胃壁细胞的功能是分泌  
A.盐酸  
B.胃蛋白酶  
C.血清促胃液素  
D.胃泌素  
E.雌激素
- 32.出生时存在但 3~4 个月后消失的反射是  
A.拥抱反射  
B.喉反射  
C.腹壁反射  
D.角膜反射  
E.吞咽反射
- 33.引起新生儿颅内出血的病因除外  
A.产伤  
B.臀位产  
C.滴注高渗性溶液  
D.新生儿窒息  
E.妊娠早期母患风疹
- 34.易导致枕骨大孔疝的是  
A.小脑蚓部  
B.小脑扁桃体  
C.大脑颞叶  
D.下丘脑  
E.小脑绒球小结叶
- 35.导致前列腺增生的主要原因是  
A.慢性咳嗽  
B.雌激素和雄激素水平失调  
C.膀胱结石

- D.老龄化  
E.雄激素增多
- 36.下列最常引起心搏、呼吸骤停的是  
A.感染  
B.冠心病  
C.颅内高压  
D.麻醉  
E.溺水
- 37.妊娠期母体心脏负荷最重的时间是妊娠  
A.24~28周  
B.30~32周  
C.32~34周  
D.34~36周  
E.36~40周
- 38.习惯性流产定义为  
A.连续2次流产  
B.连续2次自然流产  
C.连续3次流产  
D.连续3次自然流产  
E.连续3次人工流产
- 39.CO中毒时最先受损的器官是  
A.肝  
B.肺部  
C.胃肠道  
D.肾  
E.心、脑
- 40.导致心肌炎最主要的病原体是  
A.病毒  
B.细菌  
C.药物中毒  
D.螺旋体  
E.寄生虫
- 41.法洛四联症患者,2岁,喜蹲踞,其原理是  
A.保证重要器官供血  
B.缓解腹部不适  
C.腔静脉回心血量增加  
D.休息,缓解疲劳  
E.增加体循环阻力,减少右向左分流血量
- 42.肝硬化腹水的性质是  
A.渗出液  
B.漏出液  
C.乳糜液  
D.黏液性  
E.血性液
- 43.我国产妇死亡第一位的原因是  
A.妊娠合并心脏病  
B.产后出血  
C.羊水栓塞  
D.产褥感染  
E.妊娠期高血压疾病
- 44.细菌引发细菌性肝脓肿的最主要入侵途径是  
A.胆道系统  
B.肝动脉  
C.门静脉系统  
D.淋巴系统  
E.直接入侵
- 45.发生急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的原因是  
A.肿大胆囊压迫胆总管  
B.胆总管狭窄  
C.胆总管结石  
D.胆总管肿瘤合并梗阻  
E.肝脓肿并发出血,阻塞胆管
- 46.引起颅内压增高的主要原因  
A.颅内、外感染  
B.颅内占位性病变  
C.颅外占位性病变  
D.脑缺血缺氧  
E.脑脊液循环异常
- 47.胸膜腔内的压力为负压,其生理意义正确的是  
A.组成肺的弹性回缩力  
B.使肺维持扩张状态  
C.降低肺泡表面张力

- D.维持肺泡稳定性  
E.不能促进淋巴液的回流
- 48.典型的苯丙酮尿症是因肝脏缺乏
- A.苯丙氨酸羟化酶  
B.酪氨酸羟化酶  
C.谷氨酸羟化酶  
D.二氢生物蝶呤合成酶  
E.羟苯丙酮酸氧化酶
- 49.慢性阻塞性肺气肿患者不会出现的体征是
- A.胸廓呈桶状  
B.呼吸运动减弱  
C.两肺语颤增强  
D.双肺叩诊过清音  
E.两肺肺泡呼吸音减弱
- 50.引起新生儿窒息的因素不包括
- A.母亲患糖尿病  
B.急产  
C.脐带绕颈  
D.早产儿  
E.胎粪吸入
- 51.引起早产儿发生新生儿颅内出血的主要原因是
- A.缺氧  
B.产伤  
C.过快输入高渗液体  
D.机械通气不当  
E.脑血管畸形
- 52.慢性呼吸系统疾病发生急性呼吸衰竭最常见的诱因是
- A.呼吸道感染  
B.吸烟  
C.剧烈活动  
D.电解质紊乱  
E.营养不良
- 53.符合产后循环系统变化特征的是
- A.循环血容量于产后3天恢复至未孕状态  
B.血小板数量减少  
C.红细胞计数和血红蛋白值变化不大  
D.白细胞于产褥早期较高  
E.血液处于低凝状态,易出血
- 54.阑尾炎直接蔓延可引起急性盆腔炎,其主要病原体是
- A.淋病奈瑟菌  
B.支原体  
C.链球菌  
D.结核杆菌  
E.大肠埃希菌
- 55.子宫脱垂的主要病因是
- A.营养不良  
B.盆底组织先天发育不良  
C.长期站立工作  
D.便秘或长期咳嗽等致腹压增力  
E.分娩损伤
- 56.子宫颈癌普查常用的检查方法是
- A.阴道镜检查  
B.宫颈脱落细胞学检查  
C.宫颈活组织检查  
D.诊断性刮宫  
E.女性激素测定
- 57.判断心肌梗死最具敏感性和特异性的生化指标是
- A.肌钙蛋白  
B.酸激酶  
C.肌酸激酶同工酶  
D.C反应蛋白  
E.中性粒细胞
- 58.非特异性感染病理改变不包括
- A.炎症介质、细胞因子释放  
B.血管通透性增加  
C.血浆成分渗出  
D.干酪样坏死  
E.转为慢性炎症
- 59.不属于闭合性单根单处肋骨骨折治疗原则的是
- A.手术治疗  
B.对症止痛



- C.固定胸廓  
 D.防止并发症  
 E.鼓励患者咳嗽咳痰
- 60.急性心肌梗死最基本的病因是  
 A.体力活动  
 B.情绪激动  
 C.血压剧升  
 D.冠状动脉张力增高  
 E.冠状动脉粥样硬化
- 61.慢性浅表性胃炎的最主要病因是  
 A.幽门螺杆菌感染  
 B.自身免疫  
 C.饮食和环境因素  
 D.十二指肠液反流  
 E.长期食用刺激性食物和药物
- 62.符合铁代谢特征的是  
 A.缺铁时正常肠黏膜对铁吸收减少  
 B.铁主要在回肠吸收  
 C.在肠黏膜内能合成铁蛋白  
 D.人体所需铁完全依靠从食物中摄取  
 E.血清铁一般是亚铁离子
- 63.急性白血病出血的主要原因是  
 A.弥散性血管内凝血  
 B.血小板数量减少  
 C.血小板功能异常  
 D.凝血因子减少  
 E.血管损伤
- 64.不符合糖尿病临床特征的是  
 A.糖尿病是一组常见的内分泌代谢疾病  
 B.糖尿病是由多种原因导致的,绝对或相对胰岛素分泌不足或作用的缺陷而引起的代谢紊乱  
 C.糖尿病特征为高血糖、糖尿、葡萄糖耐量降低及胰岛素释放试验异常  
 D.糖尿病可引起糖、蛋白质、脂肪、水及电解质等代谢紊乱  
 E.糖尿病是一种遗传病
- 65.与宫缩乏力导致的产后出血无关的因素是  
 A.巨大儿  
 B.双胞胎妊娠  
 C.胎膜早破  
 D.羊水过多  
 E.产程延长
- 66.有机磷农药中毒后,血液中胆碱酯酶活性  
 A.不变  
 B.升至正常人的 70%以上  
 C.降至正常人的 70%以下  
 D.升至正常人的 90%以上  
 E.降至正常人的 90%以下
- 67.微生态失衡会引起  
 A.自身和交叉感染  
 B.菌群失调和移位  
 C.定植抵抗力提高  
 D.内源性和外源性感染  
 E.非特异性免疫功能增强
- 68.不符合内脏性疼痛临床特点的是  
 A.疼痛过程缓慢、持续  
 B.痛感弥散,定位不准确  
 C.痛觉迟钝,对刺、割、灼等刺激不敏感  
 D.感觉敏锐,定位准确  
 E.对较强的张力及缺血、炎症等刺激较敏感
- 69.下肢深静脉血栓形成的原因之一是  
 A.吸烟  
 B.静脉腔狭窄  
 C.静脉内膜损伤  
 D.长久站立  
 E.大隐静脉曲张
- 70.良性前列腺增生好发于  
 A.外周区  
 B.移行区  
 C.中央区  
 D.纤维区  
 E.基质区
- 71.骨折早期并发症不包括



- A. 血管损伤  
B. 内脏损伤  
C. 脂肪栓塞  
D. 畸形愈合  
E. 神经损伤
72. 正常成人颅内压的范围是  
A. 20~30 mmH<sub>2</sub>O  
B. 50~100 mmH<sub>2</sub>O  
C. 70~200 mmH<sub>2</sub>O  
D. 80~200 mmH<sub>2</sub>O  
E. 100~220 mmH<sub>2</sub>O
73. 供移植器官的保存原则是  
A. 常温保存  
B. 低温原则  
C. 延长热缺血时间  
D. 变冷缺血为热缺血  
E. 中断血流后不应立即降温
74. 新生儿低血糖的病因中属于葡萄糖消耗增加的是  
A. 早产儿  
B. Rh 溶血病患者  
C. 小于胎龄儿  
D. 败血症患儿  
E. 先天性心脏病患儿
75. 猩红热的主要传染源是  
A. 患者及带菌者  
B. 恢复期患者  
C. 链球菌携带者  
D. 家畜  
E. 蚊蝇
76. 中毒性痢疾多见于  
A. 新生儿  
B. 婴幼儿  
C. 儿童  
D. 青年  
E. 成人
77. 卵子排出后如未受精, 黄体开始萎缩的时间是  
A. 排卵后第 24 小时  
B. 排卵后第 7 日  
C. 排卵后 9~10 日  
D. 排卵后 14 日  
E. 下次月经来潮前
78. 符合产后泌乳特征的是  
A. 雌激素是产后泌乳的基础  
B. 产后雄激素水平急剧下降, 解除了对垂体催乳素的抑制作用  
C. 雌磁素有抑制垂体催乳素对乳腺的发育作用  
D. 乳汁的分泌很大程度上取决于哺乳时的吸吮刺激  
E. 吸吮动作可以反射性地引起腺垂体释放缩宫素, 促进乳汁排出
79. 软产道裂伤多见于  
A. 阴道手术操作不当  
B. 胎盘植入  
C. 凝血功能障碍  
D. 软产道充分扩张  
E. 产程延长
80. 青春期功能失调性子宫出血的主要发病机制是  
A. 黄体功能不足  
B. 缺乏雌激素的负反馈作用  
C. 孕激素分泌不足, 导致子宫内膜分泌反应不良  
D. 垂体分泌 FSH 相对不足, 无 LH 高峰, 卵巢不能排卵  
E. 子宫内膜含有过多前列腺素
81. 患者, 女性, 37 岁。孕 1 产 0, 孕 14 周出现口渴多饮症状, 孕 24 周糖筛查血糖值为 10.5 mmol/L, 下一步检查为  
A. 尿糖检测  
B. 空腹血糖  
C. OGTT  
D. 尿酮体  
E. 羊水穿刺

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(82~84 题共用备选答案)

- A. 第一心音
- B. 第二心音
- C. 第三心音
- D. 第四心音
- E. 杂音

82. 主动脉瓣肺动脉关闭时产生的振动音为

83. 二尖瓣和三尖瓣关闭时振动产生的为

84. 心室舒张早期血流自心房急流入心室使心室振动产生的为

(85~86 题共用备选答案)

- A. 病史
- B. 临床表现
- C. 脑脊液病原学检查
- D. 脑电图检查
- E. 头部 CT

85. 确诊化脓性脑膜炎的主要依据是

86. 确诊脑积水的主要依据是

(87~88 题共用备选答案)

- A. 正常
- B. 延长
- C. 减少
- D. 正常或增多
- E. 正常或减少

87. 特发性血小板减少性紫癜巨核细胞数目

88. 特发性血小板减少性紫癜白细胞数目

(89~90 题共用备选答案)

- A. 尿培养
- B. 痰培养
- C. 血培养
- D. 粪便培养
- E. 骨髓培养

89. 临床诊断败血症的重要方法是

90. 临床诊断白血病的重要依据是

(91~94 题共用备选答案)

- A. 大片炎症浸润影或实变影
- B. 肺蜂窝状肺脓肿
- C. 肺部多种形态浸润影,见于肺下野为
- D. 双肺弥漫性结节性浸润
- E. 肺下叶斑片状浸润

91. 军团菌肺炎 X 线所见是

92. 肺炎支原体肺炎 X 线所见是

93. 肺炎克雷伯杆菌肺炎 X 线所见是

94. 肺炎链球菌肺炎 X 线所见是

(95~96 题共用备选答案)

- A. 幼儿急疹
- B. 风疹
- C. 麻疹
- D. 水痘
- E. 猩红

95. 由带状疱疹病毒引起的疾病是

96. 发热 3~4 天出现斑丘疹,疹间皮肤正常,出疹后热度增高见于

(97~98 题共用备选答案)

- A. 高血压
- B. 低血压
- C. 呼吸道梗阻
- D. 头痛
- E. 全脊髓麻醉

97. 全麻时麻醉过深可能引起

98. 硬膜外麻醉最危险的并发症是

(99~100 题共用备选答案)

- A. 易复性疝
- B. 滑动性疝
- C. 难复性疝
- D. 嵌顿性疝
- E. 绞窄性疝

99. 疝内容物很容易纳入腹腔多见于

100. 疝内容物不能或不能完全回纳入腹腔内多见于

## 相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 医院感染漏报调查年监测患者数及漏报率分别为

- A. 不少于 5%, 漏报率应低于 10%
- B. 不少于 10%, 漏报率应低于 10%
- C. 不少于 10%, 漏报率应低于 15%
- D. 不少于 10%, 漏报率应低于 20%
- E. 不少于 10%, 漏报率应低于 30%

2. 糖尿病病人学习皮下注射方法时, 常采用

- A. 无意模仿
- B. 有意模仿
- C. 强迫模仿
- D. 主动交往
- E. 被动交往

3. 计划工作中, 评估形势的主要内容

包括

A. 社会关系、社会经济、社会竞争、服务对象的需求

B. 社会需求、社会竞争、组织资源、社会

经济的需求

C. 社会竞争、社会关系、社会需求、服务对象的需求

D. 社会需求、社会竞争、组织资源、服务对象的需求

E. 社会需求、社会关系、社会竞争、组织资源的需求

4. 下列是协调活动的重要手段和依据准则的为

- A. 规章制度
- B. 行政法规
- C. 基本法
- D. 刑法
- E. 民法

5. 拉斯韦尔模式的正确表述是

A. 传者 → 信息 → 传播途径 → 受者 → 效果

B. 传者 → 传播途径 → 信息 → 效果 → 受者

C. 信息 → 传者 → 传播途径 → 受者 → 效果

D. 信息 → 传者 → 传播途径 → 效果 → 受者

E. 传者 → 信息 → 传播途径 → 效果 → 受者

6. 授权的步骤不包括

A. 选择授权对象

B. 明确授权内容

C. 形成沟通渠道

D. 实施授权计划

E. 排除被授权者的工作障碍

7. 医患关系要做到真诚相处, 最主要的是

A. 关系和谐

B. 尽职尽责

C. 平等相待

D. 互相尊重

E. 互相信任

8. 属于多线型组织结构的为

A. 直线型

B. 直线-参谋型

C. 职能型

D. 主导型

E. 综合型

9. 脓性指头炎若需要切开引流, 应采用

A. 鱼口状切开

B. 手指侧面纵切开

C. 手指掌面纵切开

D. 在波动明显处横行切开

- E.从原伤口处放射状切开
- 10.空气消毒不宜使用
- A.紫外线照射
- B.臭氧消毒
- C.甲醛熏蒸
- D.醋酸熏蒸
- E.过氧化氢喷雾消毒
- 11.肠道隔离使用的标志是
- A.黄色标志
- B.蓝色标志
- C.橙色标志
- D.红色标志
- E.棕色标志
- 12.健康教育的核心为
- A.促进人们自身护理能力和行为
- B.促进人们住院适应能力
- C.促进人们自我保健能力和行为
- D.促进人们的健康行为和生活方式
- E.帮助人们建立健康行为
- 13.领导效能的内容不包括
- A.时间效能
- B.用人效能
- C.决策办事效能
- D.组织整体贡献效能
- E.结构效能
- 14.三度原位菌群失调的主要原因为
- A.免疫功能降低
- B.大量应用广谱抗菌药物
- C.慢性病诱发
- D.插管或介入治疗
- E.细菌结构变化
- 15.护理部发现问题及时纠正,遵循的管理原则是
- A.整分合原则
- B.能级原则
- C.激励原则
- D.随机制宜原则
- E.反馈原则
- 16.从健康计划实施时开始,并贯穿于计划执行全过程的评价活动是指
- A.形成评价
- B.总结评价
- C.过程评价
- D.效应评价
- E.结局评价
- 17.不适宜血液病病区采用的空气净化方法是
- A.紫外线灯照射消毒
- B.化学消毒
- C.自然通风
- D.空气消毒器
- E.集中空调通风系统
- 18.不需要洗手的情况是
- A.护理两名病人之间
- B.穿隔离衣前
- C.给病人输液后,准备导尿管
- D.给病人伤口换药后
- E.与病人交谈后
- 19.吸毒行为应属于
- A.日常危害健康行为
- B.致病性行为模式
- C.不良疾病行为
- D.违规行为
- E.不良嗜好行为
- 20.不需进行消化道隔离的疾病是
- A.麻疹
- B.甲型肝炎
- C.脊髓灰质炎
- D.霍乱
- E.细菌性痢疾
- 21.以下可能导致偏倚的因素,哪项属于测量对象因素
- A.霍桑效应
- B.暗示效应
- C.评定错误
- D.干预组和对照组选择不均衡
- E.测量者成熟性
- 22.开放性肺结核应采取

- A.保护性隔离  
B.血液隔离  
C.呼吸道隔离  
D.消化道隔离  
E.抗酸杆菌隔离
- 23.直线参谋型组织结构的优点是  
A.组织适应性好  
B.组织反应灵敏  
C.满足统一指挥和严格责任制要求  
D.直线领导和职能部门职权明确  
E.联系便捷,管理成本低
- 24.抗感染药物的作用机制不包括  
A.抑制细菌核酸的合成  
B.影响细菌细胞壁的合成  
C.细菌缺乏药物的靶位点  
D.干扰细菌蛋白质的合成  
E.损伤细菌的细胞膜
- 25.不属于责任心差引起的护患冲突表现在  
A.在班不在岗  
B.在岗不尽责  
C.医嘱执行不严格  
D.查对不认真  
E.知识有限
- 26.手术前预防性应用抗生素方法错误的是  
A.术前 0.5~1 小时通过静脉给予一次足量抗生素  
B.需有明确指征  
C.总的预防用药时间不超过 24 小时  
D.择期的结直肠手术前,还需通过导泻或灌肠进行肠道准备  
E.污染手术使用万古霉素作为预防药物
- 27.通风的目的与哪项无关  
A.调节室内温湿度  
B.降低微生物密度  
C.避免噪音的刺激  
D.使患者心情舒畅  
E.增加室内空气中含氧量
- 28.炭疽患者用过的治疗性废物和有机垃圾应  
A.熟石灰浸泡消毒  
B.丢弃  
C.焚烧  
D.过氧乙酸喷洒  
E.深埋
- 29.医院的 I 类环境的空气消毒适用于  
A.层流洁净手术室和层流洁净病房  
B.产房、婴儿室、早产儿室  
C.供应室无菌室  
D.注射室、治疗室、换药室  
E.急诊室、化验室及各类普通病房
- 30.美国管理学家莱金提出的 ABC 时间管理方法中,C 级目标指  
A.必须完成的目标  
B.最重要的目标  
C.较重要的目标  
D.很想完成的目标  
E.不太重要的目标
- 31.门诊教育往往侧重于以下哪项的防治教育  
A.危重疾病的教育  
B.慢性病的教育  
C.常见疾病的教育  
D.发病机制的教育  
E.传染性疾病的教育
- 32.组织或个人为了完成某一目标而制订具体行动方案称为  
A.程序化决策  
B.非程序化决策  
C.目标决策  
D.战略决策  
E.战术决策
- 33.“鱼和熊掌不可兼得”属于  
A.双趋式冲突  
B.双避式冲突  
C.趋避式冲突



- D.双趋双避式冲突  
 E.多重趋避式冲突
- 34.用图形表示组织的整体结构、职权关系及主要职能,称为
- A.程序  
 B.结构图  
 C.规划图  
 D.政策  
 E.组织图
- 35.“动态”原理中管理工作动态特性是指
- A.稳定状态是相对的,运动状态是绝对的  
 B.稳定状态是绝对的,运动状态也是绝对的  
 C.稳定状态是绝对的,运动状态是相对的  
 D.稳定状态是相对的,运动状态也是相对的  
 E.稳定和运动状态的变化互不干扰
- 36.有效训导的方法错误的是
- A.用平等客观的态度对待下属  
 B.对于反复发生的错误,逐步加重处罚  
 C.批评对事不对人  
 D.以行动强化语言  
 E.提出防范错误的建议
- 37.关于抗菌药物的作用机制,错误的叙述是
- A.干扰细胞壁的合成  
 B.抑制细菌芽孢生成  
 C.抑制细菌核酸合成  
 D.影响细菌蛋白质的合成  
 E.损伤细胞膜
- 38.常规器械消毒灭菌合格率的评价属于
- A.基础质量评价  
 B.服务质量评价  
 C.环节质量评价  
 D.综合评价  
 E.终末质量评价
- 39.梅毒的病原体是
- A.奈瑟菌  
 B.钩端螺旋体  
 C.苍白螺旋体  
 D.汉坦病毒  
 E.人类乳头瘤病毒
- 40.四象限时间管理法的两个维度是指事情的
- A.战略性和战术性  
 B.集体性和个人性  
 C.时间性和紧迫性  
 D.权威性和重要性  
 E.重要性和紧迫性
- 41.不属于行政管理方法优点的是
- A.市管理系统达到高度统一  
 B.利于对常规问题处理  
 C.受决策者水平的限制  
 D.保证整个系统计划、目标的实现  
 E.灵活有效的解决各种例外问题
- 42.护理管理是现代医院管理的重要组成部分,其管理内容不包括
- A.角色管理  
 B.组织管理  
 C.人员管理  
 D.业务管理  
 E.质量管理
- 43.“霍桑实验”发现决定工作效率最重要的因素是
- A.人际关系  
 B.严格的纪律  
 C.统一的指挥  
 D.科学的领导  
 E.自我控制
- 44.不属于时间管理策略的是
- A.标准化消耗时间  
 B.将一般事件安排在不干扰时间  
 C.保持时间连续性  
 D.充分利用最佳工作时间

- E.选择好的助手
- 45.经常出现的活动的决策是
- A.程序化决策
- B.非程序化决策
- C.战术决策
- D.不确定性决策
- E.确定性决策
- 46.护理组织文化建设不正确的是
- A.易接受性
- B.群众关注
- C.针对性
- D.独特性
- E.交流性
- 47.护理组织文化的核心是
- A.护理群体文化
- B.护理哲理
- C.社会文化
- D.护理价值观
- E.护理专业
- 48.不属于医院院外培训方法的是
- A.全脱产学习
- B.业余培训
- C.电视大学
- D.科室轮转
- E.自学高考
- 49.属于沟通过程中的一个步骤但却包括了信息沟通过程的几个环节的是
- A.信息源
- B.编码
- C.传递信息
- D.解码
- E.反馈
- 50.制定护理质量标准的原则不包括
- A.可衡量性原则
- B.科学性和先进性原则
- C.实用性原则
- D.严肃性和相对稳定性原则
- E.经济原则
- 51.“降低平均住院天数”属于评估指标分类中的
- A.年度评估指标
- B.质量评估指标
- C.差异度评估指标
- D.临床成果评估指标
- E.患者满意度评估指标
- 52.小组讨论是指在一位主持人的带领下,一小组人围绕某个主题进行座谈讨论。确保小组讨论效果的关键点不包括
- A.选择适当的主持人
- B.做好充分准备工作
- C.掌握小组讨论的技巧
- D.安排好小组人员座位排列
- E.现场提出讨论主题
- 53.影响传播效果的因素有多种,其中属于社会环境因素的是
- A.环境布置
- B.传播活动地点、场所
- C.相关的政策法规
- D.传播者的行为动机
- E.患者的心理需求
- 54.健康教育活动的目标是
- A.开展卫生宣传
- B.配合调查研究
- C.普及保健知识
- D.改善人类的健康相关行为
- E.实施系统的健康相关行为干预
- 55.下列不属于按教育目的分类的健康教育研究范畴的是
- A.营养健康教育
- B.生殖健康教育
- C.职业人群健康教育
- D.环境保护健康教育
- E.疾病防治健康教育
- 56.0~3岁时期,个体所处的行为发展阶段是
- A.初试发展阶段
- B.被动发展阶段
- C.主动发展阶段



- D. 自主发展阶段  
E. 巩固发展阶段
57. 以下属于“日常危害健康行为”的是  
A. 药物滥用  
B. 讳疾忌医  
C. 不遵医嘱  
D. 缺乏体育锻炼  
E. 违反法律法规
58. “您今天的气色好多了, 是吧?” 属于常见提问方式中的  
A. 封闭式  
B. 开放式  
C. 复合式  
D. 探索式  
E. 偏向式
59. 选择健康传播途径的原则除准确性外还包括  
A. 针对性、速度性、经济性  
B. 科学性、速度性、经济性  
C. 针对性、科学性、通用性  
D. 速度性、通用性、经济性  
E. 针对性、速度性、科学性
60. 关于健康教育计划目标的叙述, 下列错误的是  
A. Who 是指对象  
B. What 是指实现什么变化  
C. When 是指在多长时间内实现这种变化  
D. How much 是指有多少对象发生行为变化  
E. Where 是指在什么范围内实现这种变化
61. 降低烟草的价格对吸烟行为来讲是一种  
A. 倾向因素  
B. 促成因素  
C. 强化因素  
D. 抑制因素  
E. 强制因素
62. 为减少回归因素对评价结果正确性的影响, 可采用的方法是  
A. 设立对照组  
B. 重复测量  
C. 抽样测量  
D. 比较分析  
E. 随机调查
63. 适度变化语音引起对方注意属于非语言传播技巧中的  
A. 面部表情  
B. 仪表形象  
C. 动态语言  
D. 同类语言  
E. 体态语言
64. 医院感染学是研究医院感染  
A. 发生、发展和控制的一门学科  
B. 病原体特征的一门学科  
C. 流行病学特征的一门学科  
D. 管理制度建立和完善的一门学科  
E. 控制措施的一门学科
65. 去污染就是人为地将机体的  
A. 正常菌群或已定植的细菌部分去除  
B. 正常菌群或已定植的细菌全部去除  
C. 已定植的细菌部分或全部去除  
D. 正常菌群部分或全部去除  
E. 正常菌群或已定植的细菌部分或全部去除
66. ICU 最常见的条件致病菌是  
A. 肺炎克雷伯菌  
B. 大肠埃希菌  
C. 铜绿假单胞菌  
D. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌  
E. 洋葱伯克霍德菌
67. 医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院患者中, 短时间内突然发生  
A. 许多医院感染病例  
B. 医院感染流行  
C. 医院感染集中  
D. 医院感染失控

- E. 医院感染蔓延
68. 手术器械和物品属于
- A. 消毒物品
- B. 无危险性物品
- C. 低度危险性物品
- D. 中度危险性物品
- E. 高度危险性物品
69. 腹腔镜使用前必须经过
- A. 清洁
- B. 消毒
- C. 减菌
- D. 灭菌
- E. 无害
70. 接触下列物品护士不需戴手套的是
- A. 患者的血液
- B. 患者的分泌物
- C. 患者的药物
- D. 患者的排泄物
- E. 污染的敷料
71. 下列属于决策步骤的是
- A. 列出对象
- B. 目标分类
- C. 追踪评价
- D. 排列顺序
- E. 分配时间
72. 护士长担任咨询、协调、激励者角色

的护理组织方式是

- A. 个案护理
- B. 功能制护理
- C. 小组护理
- D. 责任制护理
- E. 综合护理

73. 领导在日常工作中有权调度人、财、物、时间等,体现了领导的

- A. 管理权
- B. 决策权
- C. 决定权
- D. 用人权
- E. 指挥权

74. 各要素配置达到科学化、最优化的基本要求是

- A. 解决问题要注重根本
- B. 及时协调出现的问题
- C. 调动组织成员积极性
- D. 协调问题注意合理原则
- E. 协调过程要相互尊重

75. 实施护理质量控制应注意

- A. 检查标准应人性化
- B. 重视细节的控制
- C. 质量控制应具体化
- D. 控制方法应体现管理技巧
- E. 强调综合系统的控制

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(76~77 题共用备选答案)

- A. 护士工作兴趣与满意度高
- B. 责任护士技能水平要求高
- C. 患者安全感与归属感增强
- D. 所需要的人力物力费用高
- E. 护士职责明确,责任心增强

76. 责任制护理的优点是

77. 综合护理的优点是

(78~80 题共用备选答案)

- A. 吸烟
- B. 戒烟
- C. 及时就医
- D. 讳疾忌医
- E. 药物滥用

78. 属于保健行为的是

79. 属于不良疾病行为的是

80. 属于戒除不良嗜好行为的是

(81~85 题共用备选答案)

- A. 消化道隔离  
 B. 呼吸道隔离  
 C. 血液、体液隔离  
 D. 接触隔离  
 E. 严密隔离
81. 皮肤白喉采取的隔离是  
 82. 腮腺炎采取的隔离是  
 83. 艾滋病采取的隔离是  
 84. 伤寒采取的隔离是  
 85. 疟疾采取的隔离是  
 (86~89 题共用备选答案)
- A. 5%  
 B. 10%  
 C. 50%  
 D. 80%  
 E. 90%
86. 下排式灭菌剂的装载量不得超过柜室内容积的  
 87. 预真空灭菌剂的装载量不得超过柜室容积的  
 88. 预真空灭菌剂的装载量不得小于柜室容积的  
 89. 脉动真空灭菌剂的装载量不得小于柜室容积的  
 (90~91 题共用备选答案)
- A. 2 小时  
 B. 4 小时  
 C. 12 小时  
 D. 24 小时  
 E. 48 小时
90. 医疗机构发生 5 例以上疑似医院感染暴发事件的报告时限为  
 91. 医疗机构发生 10 例以上的医院感染暴发事件的报告时限为  
 (92~93 题共用备选答案)
- A. 个案护理  
 B. 功能制护理  
 C. 小组护理  
 D. 责任制护理  
 E. 综合护理
92. 由一名护理人员在当班期间承担一名患者所需要的全部护理, 被称为  
 93. 由一组护理人员应用护理程序的工作方法, 共同完成对一组患者的护理工作, 被称为  
 (94~96 题共用备选答案)
- A. 肯定性反馈  
 B. 否定性反馈  
 C. 模糊性反馈  
 D. 动态体语  
 E. 仪表形象
94. 护士小王在和患者交谈中, 适时插入了一些“是的”“很好”等语言或点头、微笑等非语言形式给予对方肯定和鼓励, 对患者的言行表示了赞同和支持, 小王在交谈中的反馈行为属于  
 95. 当小王发现患者的言行不正确时, 她应当使用的恰当反馈形式是  
 96. 在交谈中, 小王以关注的眼神注视患者, 表示在专心倾听对方的话, 小王的交流行为属非语言交流中的  
 (97~98 题共用备选答案)
- A. 先天性  
 B. 习得性  
 C. 偶然性  
 D. 一致性  
 E. 可控性
97. 属于促进健康行为的特点是  
 98. 属于危害健康行为的特点是  
 (99~100 题共用备选答案)
- A. 食用生的污染贝类  
 B. 直接接触有传染性的分泌物感染  
 C. 破损的皮肤接触被病原菌污染的物品感染  
 D. 输血感染  
 E. 吸入被病原菌污染的空气感染
99. 淋病的传播途径是  
 100. 炭疽的传播途径是

## 专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 发展社区卫生服务的必要性主要在于
- A. 大型医院不能满足人们的就医需要, 社区是小型医院
- B. 计划生育使家里一个孩子甚为珍贵, 社区主要为满足儿童的需要
- C. 疾病谱为肝炎、结核等传染病主导
- D. 疾病谱转为心血管病、恶性肿瘤等慢性病
- E. 主要满足生病患者和家属的需要
2. 社区护理计划中应注意的问题是
- A. 形成口头计划
- B. 计划只体现采取一级预防的护理干预措施
- C. 计划只体现采取二级预防的护理干预措施
- D. 计划只体现采取三级预防的护理干预措施
- E. 选择最佳护理干预策略
3. 家庭访视的次数为
- A. 一天一次
- B. 两天一次
- C. 三天一次
- D. 一周一次
- E. 根据具体情况决定
4. 社区健康促进的评价指标不包括
- A. 政治环境
- B. 人口统计学指标
- C. 自然环境质量
- D. 经济状况
- E. 教育水平与质量
5. 冠心病康复分期的叙述, 正确的是
- A. I 期: AMI 住院期的康复, 一般 1~2 周, 休息为主
- B. II 期: 出院至病情稳定性完全建立, 一般需要 6~12 周
- C. II 期: 适当体力活动、循序渐进、禁忌过分用力
- D. III 期: 病情长时间稳定状态, 3~6 个月
- E. III 期: 避免竞技性运动, 训练必须持之以恒, 感觉不良时也要适当运动
6. 糖尿病患者运动的注意事项, 叙述不正确的是
- A. 穿厚底防滑运动鞋
- B. 戴护膝
- C. 随身带糖果, 运动一半时立即吃糖果
- D. 运动量逐渐加大
- E. 从短时间开始
7. 社区护士在健康普查中的主要作用是
- A. 推动个人的健康普查
- B. 推动家庭的健康普查
- C. 实施健康检查
- D. 个人和集体的健康教育
- E. 普查后的治疗与护理
8. 居家护理的对象主要是
- A. 孕产妇
- B. 新生儿
- C. 老年病人
- D. 计划生育
- E. 急诊患者
9. 健康教育的主要任务是
- A. 普及卫生知识
- B. 提倡文明、健康、科学的生活方式
- C. 加强社区行动, 挖掘社区资源
- D. 建立或提高个人和群众对防病和促进健康的责任感
- E. 提高自我保健能力、解决自身健康
10. 社区护士对冠心病患者心绞痛发作

时的指导,正确的是

- A.立即停止原来的活动
- B.找个安静的地方休息
- C.口服硝酸甘油 1 片
- D.硝酸甘油如无效,立即再口服两片
- E.如硝酸甘油仍无缓解,立即开车到大

医院处理

11.关于脑血栓的叙述,正确的是

- A.起病急,进展快
- B.多无先兆症状
- C.发病时意识不清
- D.在安静、睡眠的情况下发病
- E.不及时抢救会短时间内神志不清

12.社区流行病学研究中,现状调查属于

- A.分析性研究
- B.回顾性研究
- C.实验研究
- D.描述性研究
- E.筛检性研究

13.某项研究欲证明音乐疗法是否有效减轻癌症患者疼痛时,随机抽取了两组研究对象,分为实验组和对照组,实验组给予音乐疗法,对照组常规护理。该研究方法属于

- A.描述性研究
- B.历史性研究
- C.实验研究
- D.分析性研究
- E.调查性研究

14.居家护理的范畴,一般不包括

- A.临终关怀
- B.急性病护理
- C.用药指导
- D.慢性病管理
- E.传染病的消毒隔离

15.家庭的功能不包括

- A.生育功能
- B.国际化功能
- C.健康照顾功能
- D.情感功能

E.经济功能

16.根据杜瓦尔(Duvall)理论,下列关于家庭生活周期说法正确的是

A.家庭生活周期可分为新婚期、生产期、学龄期、青少年期、年轻人期、中年期、老年期

B.新婚期的主要任务是适应父母角色,应对养育子女的压力

C.青少年期的主要任务是教育子女

D.学龄期的主要任务是针对子女的特点,增加沟通,加强性教育

E.老年期的主要任务是适应和应对退休、疾病、丧偶、死亡等多种变化

17.家庭包含的社会关系不包括

- A.血缘
- B.感情
- C.经济
- D.政治
- E.人口生产关系

18.关于健康促进的任务,主要需要强化的是

- A.强化政策行动
- B.强化家庭行动
- C.强化个人行动
- D.强化社区行动
- E.强化社会行动

19.健康教育的基本原则不包括

- A.因材施教
- B.寓教于乐
- C.讲究实效性
- D.社区参与
- E.程序性原则

20.社区护士指导孕妇避免性生活的时间是

- A.12 周以内
- B.12~32 周
- C.12~40 周
- D.32~36 周
- E.40 周后



21. 妇女更年期一般发生在
- A. 40~50 岁
  - B. 45~50 岁
  - C. 45~55 岁
  - D. 50~55 岁
  - E. 40~55 岁
22. 老年人药效学特点正确的是
- A. 对大多数药物敏感性减弱
  - B. 不良反应增加
  - C. 依从性增强
  - D. 多药合用耐受性明显升高
  - E. 对肝脏有损害的药物耐受性升高
23. 加强老年人药疗的健康指导, 内容正确的是
- A. 药袋上用醒目颜色标明注意事项
  - B. 老年人常发生失眠、便秘、疼痛, 鼓励首选药物性措施
  - C. 指导老人随意购买及服药
  - D. 不必进行家属的安全用药知识教育
  - E. 老人用药不良反应时不必停药
24. 青春发育期的心理特点, 说法正确的是
- A. 对性发育的充分认识
  - B. 独立意向发展很快
  - C. 伙伴关系较淡
  - D. 自我意识发展较慢, 人生理想尚未形成
  - E. 认识社会的能力强
25. 不属于慢性病的行为危险因素是
- A. 吸烟
  - B. 不合理饮食
  - C. 遗传
  - D. 缺乏体力活动
  - E. 体力活动过度
26. 属于乙肝传播途径的是
- A. 呼吸道
  - B. 消化道
  - C. 虫媒传播
  - D. 血液传播
  - E. 一般生活接触
27. 传染病的二级预防要做到“五早”, 不包括
- A. 早发现
  - B. 早诊断
  - C. 早治疗
  - D. 早隔离
  - E. 早宣传
28. 高血压病人的家护理要点不包括
- A. 定时定量服用降压药
  - B. 好转时不必服药
  - C. 注意休息劳逸结合
  - D. 不宜剧烈运动
  - E. 避免情绪激动
29. 关于社区概念的阐述, 不正确的是
- A. 以地域为基础的实体
  - B. 由正式的、非正式的组织、机构和群体等社区系统组成
  - C. 行使社区功能
  - D. WHO 指出有代表性的社区人口在 10 万~30 万之间, 面积在 500~5 000 平方公里
  - E. 是彼此依赖、生活上相互关联的大集体
30. 社区卫生服务的阐述正确的是
- A. 政府领导、社区参与
  - B. 以医院为主体
  - C. 针对社区存在的个别健康问题
  - D. 无需上级卫生机构指导
  - E. 主动为社区居民提供的高级卫生服务
31. 社区社会系统中最重要的内容是
- A. 教育系统
  - B. 政治系统
  - C. 经济系统
  - D. 福利系统
  - E. 保健系统
32. 目前国际上常用的社区护理方法不包括
- A. 家庭访视

- B.传染病隔离  
 C.健康指导  
 D.流行病学调查  
 E.健康普查
- 33.关于家庭权力结构正确的说法是  
 A.包括权力来源、权力结果和决策过程  
 B.决策过程须视其成员的个性、角色、能力、家人认同而定  
 C.权力来源指的是最后做主的人  
 D.权力结果是家庭产生共识而采取的行动方式  
 E.反映权力在家庭外部的分布情况
- 34.关于家庭压力事件与家庭危机叙述,正确的是  
 A.家庭资源不足,可通过调试,应对家庭压力事件,恢复正常功能  
 B.家庭危机包括由意外事件引发的危机、家庭发展所伴随的危机、与照顾者有关的危机和家庭结构本身造成的危机  
 C.家庭发展所伴随的危机有灾害、意外事故  
 D.丧偶、离婚属于家庭结构本身造成的危机  
 E.家庭某一成员长期患病需要照顾属于由意外事件引发的危机
- 35.关于家庭常用消毒技术说法正确的是  
 A.居室空气消毒可以采用通风、食醋熏蒸、过氧乙酸喷雾的方法  
 B.患者用过的床垫、被褥、枕头、衣物可采用煮沸消毒的方法  
 C.患者用过的餐具可采用日光暴晒的方法  
 D.传染患者的分泌物、排泄物、呕吐物可不经毒处理就倒掉  
 E.患者用过的脸盆、便盆、痰杯等可用0.1%~0.5%过氧乙酸浸泡消毒0.5小时后洗净待用
- 36.从健康教育的角度看,对人群健康起主要影响作用的是  
 A.生物  
 B.遗传  
 C.政治  
 D.生活方式  
 E.经济因素
- 37.青春期卫生保健内容不必要的是  
 A.青春期性教育  
 B.生殖健康教育  
 C.营养饮食指导  
 D.自我保健行为的建立  
 E.定期检查,预防常见病
- 38.母乳喂养至少坚持到新生儿出生后  
 A.2~3个月  
 B.3~4个月  
 C.4~6个月  
 D.6~8个月  
 E.12个月
- 39.家庭健康护理的目的是  
 A.维持和提高家庭的健康水平及其家庭自我保健功能  
 B.调节家庭矛盾  
 C.缓和夫妻关系  
 D.提供经济支持  
 E.提供教育支持
- 40.社区家庭访视的艺术,说法正确的是  
 A.合适的时间家访  
 B.不必太周全的计划,随机应变  
 C.慢性病为先,急性病为后  
 D.不能开门见山,慢慢引出主题  
 E.不必控制时间,可以过分亲热
- 41.第一次产前检查最迟在怀孕后的  
 A.1周  
 B.3周  
 C.6周  
 D.12周  
 E.15周
- 42.中国城市妇女前五位死因不包括  
 A.心脏病



- B.恶性肿瘤  
C.自杀  
D.呼吸系统疾病  
E.损伤、中毒等外部疾病
- 43.社区妇女保健的定义阐述不正确的是  
A.以预防为主  
B.以保健为中心  
C.以维护妇女身心健康为目标  
D.以家庭为对象  
E.以群体为对象
- 44.慢性病社区管理需要团队通合作,其中团队的核心是  
A.全科医生  
B.社区护士  
C.患者和家属  
D.康复师  
E.社会工作者
- 45.关于慢性病的定义,叙述正确的是  
A.暂时性的疾病  
B.不会造成残疾  
C.有可逆转的病理变化  
D.需要长期的照顾  
E.可以自然消退的疾病
- 46.老年人临床合理用药五大原则正确的是  
A.受益原则  
B.三种药物原则  
C.大剂量原则  
D.四种药物原则  
E.不停用药原则
- 47.开启过的疫苗,有效时间是  
A.室温 24 小时内  
B.室温 6 小时内  
C.室温 2 小时内  
D.冷藏 6 小时内  
E.冷藏 2 小时内
- 48.为使调查结果更具代表性,社区评估时间问卷调查的最好方法是  
A.正式的随机抽样方法  
B.方便抽样方法  
C.不必考虑信度  
D.不必考虑效度  
E.目的抽样方法
- 49.社区卫生服务的内容不包括  
A.预防  
B.医疗  
C.各种保健仪器的试用  
D.计划生育  
E.健康教育
- 50.患者,女性,17岁。学生,其母陪同就诊,诊断为单纯性甲状腺功能亢进,采用药物治疗、定期复查,医生要求母亲对张某的用药实行督促。然而3个月的治疗未见病情好转。原因是其父认为年纪轻轻不必天天吃药,主张靠锻炼,而母亲不敢多说,致使用药过程断续。该问题说明该家庭对个人的作用体现在  
A.家庭权力中心  
B.家庭结构  
C.家庭功能  
D.家庭发展周期  
E.家庭关系
- 51.社区评估中问卷调查的注意事项正确的是  
A.问题可以多问几件事,以调查更多的结果  
B.适当以诱导的方式提问,以提高效率  
C.慎重处理敏感与隐私的问题  
D.问题的顺序可以不必拘泥  
E.问卷不必用随机抽样方法
- 52.下列属宁核心家庭及其特点是  
A.由父母及已婚子女组成  
B.核心家庭结构简单、关系较稳定、资源少  
C.由父母、已婚子女及第三代组成  
D.由较近的亲戚组成,如叔叔、姑姑等  
E.随着现代社会的发展,核心家庭有不断减少的趋势

- 53.关于居家照顾团队说法正确的是
- 居家照顾团队由单一专业人员组成.
  - 团队成员包括护理人员、医师、康复师、营养师、药剂师、社工人员
  - 分工不同,但都是以医疗内容为中心
  - 护士的作用是为居家病人提供间接性的护理照顾和健康教育指导
  - 护士的作用还包括指导其他专业人员对患者进行康复锻炼和日常生活活动能力的训练
- 54.语言性健康教育不包括
- 交谈
  - 健康咨询
  - 小组讨论
  - 同伴教育
  - 卫生专栏
- 55.产前检查的等率叙述正确的是
- 怀孕 28 周内,每 2 周检查一次
  - 怀孕 29~36 周,每 4 周检查一次
  - 怀孕 36 周后,每周检查一次
  - 怀孕 28 周内,每 5 周检查一次
  - 怀孕 40 周内,每周检查二次
- 56.社区护士产后访视的时间叙述正确的是
- 产后访视至少 5 次
  - 第一次在出院后 3 天内
  - 第二次在出院后 7 天
  - 第三次在产后 14 天
  - 第四次在产后 21 天
- 57.老年期妇女生理上最突出表现是
- 衰老、老化
  - 孤独、寂寞
  - 绝经
  - 痴呆症
  - 阴道炎
- 58.高血压患者的饮食指导正确的说法是
- 低盐饮食
  - 高脂、高蛋白饮食

- 高胆固醇饮食
- 低钙饮食
- 少吃水果、蔬菜

59.在中国人群中,冠心病的主要危险因素不包括

- 高血压
- 糖尿病
- 吸烟
- 血脂异常
- 长期精神紧张

60.对社区地理环境的评估不必要的是

- 社区大小,区域范围,农村还是城市
- 地理特征及其资源
- 医疗保健服务的人员
- 气候条件
- 垃圾处理及废气处理等人文环境

61.采用筛检时必须遵循的原则是

- 筛检的疾病治疗方法待定
- 筛检的疾病不是严重的公共卫生问题
- 被筛检的疾病有合适的筛检试验
- 筛检出的可疑患者无能力接受进一步的诊断和治疗
- 筛检符合时间-效益分析

(62~64 题共用题干)

患者,女性,67 岁。确诊糖尿病 10 年。试行饮食控制治疗 2 个月,因无法耐受严格的饮食控制,遂接受二甲双胍+格列吡嗪联合降糖治疗,空腹血糖控制在 6.1 mmol/L。此后,患者未能坚持按医嘱服药及加强饮食控制,空腹血糖波动在 6.0~12.4 mmol/L。

62.该患者在居家期间最主要的护理诊断是

- 药物依从性差
- 饮食控制不良
- 运动控制不良
- 活动无耐力
- 营养不良

63.针对护理诊断相应的预期护理目

标是

- A.加强营养
- B.坚持锻炼
- C.饮食控制良好
- D.长期严格接医嘱服用降糖药和进行饮食控制

E.需要时即服药

64.为达到预期目标,居家护士应采取的最主要的护理措施是

- A.心理护理
- B.加强药物护理
- C.行为促进
- D.家属动员
- E.护患关系

65.社区护士在进行家庭访视时,指导其女儿增加体力活动,减轻体重。该行为属于糖尿病社区管理的

- A.0级预防
- B.一级预防

C.二级预防

D.三级预防

E.四级预防

66.属糖尿病社区管理二级预防的是

A.开展糖尿病教育,强调糖尿病危险因素的认识

B.为糖尿病患者制订饮食计划、运动计划

C.减少糖尿病肾病

D.减少糖尿病足

E.减少糖尿病死亡率

67.如果患者发生了糖尿病足,那么针对糖尿病足,社区护理的内容正确的是

A.每天坚持小腿和足部运动30~60分钟

B.小伤口可用2%碘酊消毒处理

C.伤口处可涂甲紫消毒并保持干燥

D.鞋袜尽量紧些,防止水肿

E.如有皮肤溃疡、间接性跛行,早期截肢以防溃疡蔓延整个腿部

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方格涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(68~70题共用备选答案)

A.  $a/(a+c) \times 100\%$

B.  $d/(b+d) \times 100\%$

C.  $c/(a+c) \times 100\%$

D.  $b/(b+d) \times 100\%$

E.  $a/(a+b) \times 100\%$

筛检试验与诊断试验均为阳性的有a人,均阴性的为d人,诊断阳性而筛检阴性的为c人,而诊断阴性筛检阳性的为b人。那么

68.该筛查试验的阳性预测值为

69.该筛查试验的特异度为

70.该筛查试验的灵敏度为

(71~72题共用备选答案)

A.核心家庭

B.主干家庭

C.联合家庭

D.兄弟姐妹组成的家庭

E.同性恋家庭

71.由父母及未婚子女组成的家庭属于

72.由核心家庭及其较近的亲戚组成,如叔叔、姑姑、姨妈等,属于

(73~76题共用备选答案)

A.红色

B.黄色

C.绿色

D.蓝色

E.黑色

某社区遇到大型灾害性事故,社区立即组织人力物力,保证迅速及时的抢救,预检分诊救护中分别用不同颜色表示伤员的病情轻重。

73.标志着一小时内需要接受治疗护理的伤员用

74. 遇难伤员所用的标志颜色是  
 75. 损伤严重、生存希望渺茫的标志颜色是

76. 标志着 4~6 小时内需要接受治疗护理的伤员用

(77~81 题共用备选答案)

- A. 11 岁
- B. 12~14 岁
- C. 15~17 岁
- D. 17~20 岁
- E. 20 岁以上

77. 快速生长,其速度达最高峰的年龄是

78. 第二性征的发育明显的年龄是

79. 常常以自我为中心,自我陶醉的年龄是

80. 感情较专注,能忍耐的年龄是

81. 情绪变化大,容易用发火、粗暴的行为表示生气的年龄是

(82~84 题共用备选答案)

- A. 知识目标
- B. 态度目标
- C. 技巧目标
- D. 行为目标
- E. 信念目标

多个社区为了加强健康促进的工作,共同制订了控制吸烟计划,执行该计划一年后,分别达到了不同程度的效果。请判断下列情况分别属于什么类型的健康教育与行为的具体目标

82. 60% 青少年戒烟了

83. 60% 青少年表示现在和将来都不会吸烟

84. 60% 青少年相信自己能把烟戒掉

(85~89 题共用备选答案)

- A. 2 小时
- B. 6 小时
- C. 12 小时
- D. 24 小时
- E. 72 小时

85. 对于新发现的甲类传染病,城市报告时间为

86. 对于新发现的甲类传染病,农村报告时间为

87. 对于新发现的乙类传染病,城市报告时间为

88. 对于新发现的乙类传染病,农村报告时间为

89. 对于新发现的丙类传染病,城市报告时间为

(90~93 题共用备选答案)

目前许多社区开展了丰富多彩的健康促进活动。请说明他们所进行的健康促进活动分别属于哪一类的健康促进活动。

- A. 社区体育锻炼
- B. 学校卫生
- C. 艾滋病教育
- D. 慢性病的综合防治
- E. 母乳喂养

90. 社区对高血压高危人群的筛查并给于营养和膳食指导

91. 社区协调各部门,装备适宜的健身器材

92. 社区推进安全套的提供

93. 学生定期检查龋齿以及近视的情况

(94~97 题共用备选答案)

- A. 粪口途径
- B. 空气传播
- C. 虫媒传播
- D. 接触传播
- E. 性传播

94. SARS 的主要传播途径是

95. 甲肝的主要传播途径是

96. HIV 病毒的主要传播途径是

97. 乙脑的主要传播途径是

(98~100 题共用备选答案)

A. 先 1 分钟的心肺复苏,再启动紧急救护系统

B. 先启动紧急救护系统,再心肺复苏

- C.1 秒钟
- D.10 秒钟
- E.5 秒钟

98.如社区内突然发现一居民出现心搏、呼吸骤停,初步考虑该患者的心搏呼吸骤停是由于心脏疾病造成的,只有社区护士一人

在旁边,那么社区护士应该

99.如果要评估该患者是否存在呼吸,评估时间应限制在

100.每两分钟的 CPR 后,社区护士需要轮换,要求轮换时间限制在





## 专业实践能力

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1.在社区精神疾病患者的心理治疗工作中,下列最重要的原则是

- A.必须详细地收集病史,包括个人成长史
- B.与药物配合治疗
- C.建立良好、信任的护患关系
- D.注意调动患者的主观能动性
- E.必须掌握各种心理治疗的理论

2.社区老年痴呆患者家庭护理管理最优先考虑应是

- A.帮助患者维持最佳的功能状态
- B.减少患者的受挫感
- C.改善患者的认知功能
- D.缓解患者的躯体症状
- E.保证足够的营养

3.列入卫生部计划免疫程序的有

- A.卡介苗,脊髓灰质炎疫苗,百白破混合制剂,麻疹疫苗和乙脑疫苗
- B.卡介苗,脊髓灰质炎疫苗,麻疹疫苗,乙脑疫苗和风疫疫苗
- C.百白破混合制剂,卡介苗,脊髓灰质炎疫苗,麻疹疫苗和乙肝疫苗
- D.脊髓灰质炎疫苗,乙肝疫苗,腮腺炎疫苗,风疹疫苗和卡介苗
- E.卡介苗,脊髓灰质炎疫苗,麻疹疫苗,流脑疫苗和乙肝疫苗

4.确定一种传染病的检疫期是根据该病的

- A.潜伏期
- B.传染期
- C.症状明显期
- D.恢复期
- E.前驱期

5.麻疹的传播途径是

- A.呼吸道传播
- B.虫媒传播
- C.血液传播
- D.消化道传播
- E.皮肤接触传播

6.有机磷农药中毒患者烟碱样症状表现为

- A.呕吐、腹痛、腹泻
- B.流涎
- C.支气管痉挛及分泌物增加
- D.肌纤维颤动
- E.昏迷

7.人工全膝关节置换术后的康复重点是

- A.关节功能的训练
- B.关节活动度的训练
- C.肌力的训练
- D.预防并发症发生的训练
- E.缓解肌肉痉挛的训练

8.近视眼的护理要点正确的是

- A.读书写字姿势要正确,眼与书本 30 cm
- B.连续看书写字 2 小时左右要休息或望远片刻
- C.在光线暗处及直射阳光下看书
- D.躺在床上及走路或乘车时看书
- E.连续看书写字半小时左右要做眼保健操

9.纠正 CO 中毒缺氧的最有效措施是

- A.低流量吸氧
- B.输血
- C.静脉给阿托品
- D.静脉给普鲁卡因
- E.高压氧舱

10.如发现大咯血患者有窒息先兆,应立

- A.低流量吸氧
- B.输血
- C.静脉给阿托品
- D.静脉给普鲁卡因
- E.高压氧舱

10.如发现大咯血患者有窒息先兆,应立

即采取的抢救措施是

- A.用导管吸除血块,保持呼吸道通畅
- B.作气管插管
- C.进行气管切开
- D.加压吸氧
- E.应用呼吸兴奋剂

11.感染后可获得终身免疫的病毒性肝炎是

- A.甲型病毒性肝炎
- B.乙型病毒性肝炎
- C.丙型病毒性肝炎
- D.丁型病毒性肝炎
- E.戊型病毒性肝炎

12.处于急性 HIV 感染期患者其症状表现为

- A.血清抗体检测均呈阳性
- B.发热、腹泻、淋巴结肿大
- C.HIV 数量渐增但传染性不强
- D.无特殊不适,CD4 细胞数量无变化
- E.淋巴结肿大,全身及关节疼痛长达

1 年

13.对自杀自伤患者行约束带保护性约束时,一次约束持续时间宜为

- A.10~20 分钟
- B.20~30 分钟
- C.30~60 分钟
- D.1~2 小时
- E.2~4 小时

14.社区护士怀疑患者有自杀念头时,下列护理措施错误的是

- A.不要让患者独处
- B.不能谈论自杀问题
- C.建议家属提供适当的监护
- D.同患者建立良好的护患关系
- E.加强对病情的观察

15.不是空气传播的疾病是

- A.水痘
- B.麻疹
- C.肺结核

D.风疹

E.金黄色葡萄球菌感染

16.慢性携带者指携带病原持续时间为

- A.1 个月以上
- B.2 个月以上
- C.3 个月以上
- D.4 个月以上
- E.6 个月以上

17.乙型肝炎患者血清中,检出抗-HBs,

说明

- A.肝炎病毒在体内复制
- B.获得免疫,疾病已恢复
- C.病毒变异,仅查出抗-HBs
- D.免疫耐受,病情迁延不愈
- E.血清中可同时检出 HBsAg

18.结核菌素试验强阳性反应结果为

- A.红晕直径>10 mm
- B.红晕直径>15 mm
- C.硬结直径>15 mm
- D.硬结直径>12 mm
- E.硬结直径>20 mm

19.从目标人群的生活质量入手,评估社区的需求和健康问题是

- A.社会诊断
- B.流行病学诊断
- C.行为诊断
- D.环境诊断
- E.教育与组织诊断

20.不符合食物中毒特点的是

- A.潜伏期较短
- B.季节性不明显
- C.人与人之间不传染
- D.临床症状相似
- E.有食用相同食物史

21.膀胱功能训练的间歇导尿法是

- A.留置尿管 2~3 小时放尿一次
- B.留置尿管 4~6 小时放尿一次
- C.2~3 小时导尿一次
- D.4~6 小时导尿一次



- E.有尿意时导泉
- 22.全髋关节置换术后为防止脱位,应将患肢保持在
- A.内收外旋位  
B.外展内旋位  
C.外展中立位  
D.内收内旋位  
E.内收中立位
- 23.临终患者的疼痛控制目前采用三阶梯方法。属于第一阶梯止痛的药物是
- A.布桂嗪  
B.可待因  
C.阿司匹林  
D.吗啡  
E.哌替啶
- 24.对临终患者实施治疗和护理的基本原则是
- A.以病因治疗和整体护理为主  
B.以延长生命和减轻痛苦为主  
C.以保存生命和心理护理为主  
D.以适度治疗和全方位护理为主  
E.以挽救生命和生活照顾为主
- 25.倾斜床站立训练的优点之一是调节血管紧张性,其目的是为了
- A.利于患者呼吸  
B.防止直立性低血压  
C.预防压疮  
D.预防静脉血栓  
E.增加腹压利于排便
- 26.包扎的原则是
- A.从上向下  
B.从右向左  
C.从近心端向远心端  
D.可在骨隆突处打结  
E.不可在伤口处打结
- 27.服毒后洗胃时间最佳为
- A.12小时内  
B.10小时内  
C.8小时内  
D.6小时内  
E.8~10小时内
- 28.菌痢的潜伏期为
- A.1~2天  
B.3~4天  
C.4~5天  
D.6~7天  
E.7天以上
- 29.乙型病毒性肝炎最主要的传播途径是
- A.粪-口传播  
B.血行传播  
C.呼吸道传播  
D.蚊虫叮咬  
E.水源传播
- 30.根据格林模式,健康教育诊断的首要步骤是
- A.流行病学诊断  
B.行为环境诊断  
C.社会诊断  
D.教育与组织诊断  
E.管理与政策诊断
- 31.西方国家近年来提倡和推广的精神病治疗和管理体系是
- A.“去机构化”管理  
B.社区管理  
C.精神病医院管理  
D.安全管理  
E.精神患者严加监视
- 32.关于妄想,下列说法最正确的是
- A.是不符合事实的信念  
B.是一种病态的信念  
C.是患者坚信不移的信念  
D.是一种可以说服的错误信念  
E.是一种十分荒谬的信念
- 33.开放性气胸现场急救应首先
- A.立即清创  
B.迅速封闭伤口  
C.给予抗菌药

- D.注射破伤风抗毒素吸氧  
E.吸氧
- 34.急性坏死型胰腺炎患者出现的休克多属于
- A.中毒性休克  
B.低血容量性休克  
C.过敏性休克  
D.心源性休克  
E.神经源性休克
- 35.睡眠障碍在神经症患者中极为常见,此类患者最多见的主诉是
- A.头昏  
B.入睡困难  
C.易惊醒  
D.多梦  
E.夜惊
- 36.属于计划免疫程序的疫苗是
- A.乙脑疫苗  
B.流脑疫苗  
C.甲肝疫苗  
D.乙肝疫苗  
E.流感疫苗
- 37.下列属于监测管理的一组传染病是
- A.鼠疫,霍乱  
B.病毒性肝炎,新生儿破伤风,肺结核  
C.脊髓灰质炎,流行性出血热,血吸虫病  
D.白喉,猩红热,麻疹  
E.麻风,血吸虫病,风疹
- 38.临终一般指由于各种疾病或损伤而造成人体主要器官功能趋于衰竭,经过积极治疗后仍无生存希望,各种迹象显示生命活动即将终结的状态,属于死亡过程的
- A.濒死期  
B.临床死亡期  
C.生物学死亡期  
D.最后期  
E.社会死亡期
- 39.患者,男性,42岁。在家中发现步态

本稳,言语不清,无任何气味,疑为中毒,可能为

- A.酒精中毒  
B.CO中毒  
C.安眠药中毒  
D.过敏休克  
E.有机磷中毒

40.患者,女性,25岁。有性接触史,近3个月来发热、咳嗽、喘憋,疑为肺炎,经多种抗生素治疗无效,全身状况日渐衰竭,全身淋巴结肿大,为确诊首先考虑的检查是

- A.痰培养  
B.肺功能  
C.胸部CT  
D.胸部X线检查  
E.HIV抗体测定

41.可传播HIV病毒的是

- A.蚊虫叮咬  
B.打喷嚏、咳嗽  
C.与HIV感染者拥抱  
D.与HIV染者共同进餐  
E.分娩过程中胎儿经产道娩出

42.肺结核化学治疗原则是

- A.早期、联合、适量、规律、全程  
B.仅早期使用抗结核药  
C.间断使用抗结核药  
D.仅用一种杀菌剂  
E.药物剂量应偏大

43.防止精神分裂症复发的重要措施是

- A.坚持服药  
B.营养充足  
C.居住环境安静  
D.有家属的照顾  
E.使患者心情愉快

44.严重CO中毒者出现精神障碍前可有假性痊愈期,此期最长可达

- A.2周  
B.4周  
C.8周

- D.10周  
E.12周
- 45.记忆障碍在脑器质性精神障碍的早期主要表现为
- A.顺行性遗忘  
B.逆行性遗忘  
C.错构  
D.虚构  
E.近事遗忘
- 46.抗精神病药物治疗中,下列疾病不能使用的是
- A.精神分裂症  
B.脑器质性疾病所致精神障碍  
C.中枢神经系统抑制,高热,昏迷  
D.反应性精神障碍  
E.躁狂症
- 47.昏迷的早期表现是
- A.意识不清晰,对外界刺激有主动反应,可出现小便失禁  
B.意识不清晰,对外界刺激无主动反应,可出现小便失禁  
C.意识清晰,对外界刺激有主动反应,小便正常  
D.意识清晰,但血压明显下降  
E.意识不清晰,血压、呼吸有明显变化
- 48.有机磷中毒者呼出气体有
- A.苦杏仁味  
B.酒味  
C.蒜臭味  
D.苯酚味  
E.烂苹果味
- 49.符合青春发育期的心理特点的是
- A.对性发育的充分认识  
B.独立意向发展很快  
C.伙伴关系较淡  
D.自我意识发展较慢,人生理想尚未形成  
E.认识社会的能力强
- 50.不符合临终关怀的宗旨是
- A.满足临终患者的身心需要  
B.使临终患者舒适、安详、有尊严地度过人生最后的时期  
C.以治疗为主,尽量延长患者的生命  
D.注重提高生命质量  
E.对家属提供心理支持
- 51.患者,男性。前臂撕脱伤,血流缓慢,应首选
- A.加压包扎法  
B.指压止血法  
C.止血带止血法  
D.屈肢加垫止血法  
E.填塞止血法
- 52.住院菌痢患者,临床症状消失后的出院标准是
- A.血常规检查正常  
B.大便镜检无脓细胞  
C.体温正常  
D.连续两次大便培养阴性  
E.生命体征恢复正常
- 53.锐器用后必须稳妥、安全地置入
- A.防水、耐刺的有醒目的明显标识容器中  
B.双层污物袋  
C.双层黄色污物袋  
D.双层红色污物袋  
E.双层黑色污物袋
- 54.老年痴呆患者记忆力障碍在初期主要表现为
- A.错构  
B.近事遗忘  
C.顺行性遗忘  
D.远事遗忘  
E.界限性遗忘
- 55.女性,患者,40岁。已婚,近1个月来无诱因出现情绪低落,晨重夜轻,对生活失去信心,食欲减退、精力下降,有自杀意念,睡眠差,有早醒,该患者最可能的诊断是
- A.精神分裂症

- B.焦虑症
- C.强迫症
- D.抑郁症
- E.神经衰弱

56.患者,男性,25岁。尿道口脓分泌物3天。5天前不洁性接触史。查体:尿道口红肿,深黄色脓性分泌物,腹股沟淋巴结肿大,触痛。尿道分泌物涂片镜下可见大量多核形白细胞,细胞内可见数量不等的革兰阴性双球菌。考虑患者为

- A.淋病
- B.滴虫性尿道炎
- C.尖锐湿疣
- D.梅毒
- E.艾滋病

57.患者,女性,41岁。患COPD,突然一次咯血700 mL。患者烦躁,面色苍白,皮肤湿冷。血压110/87 mmHg,脉率98次/分。应判断为

- A.尚未发生休克
- B.休克失代偿期
- C.早期休克
- D.中期休克
- E.晚期休克

58.患者,男性,27岁。手部动脉出血,首选的止血方法是

- A.压迫颈总动脉
- B.压迫肱动脉
- C.压迫锁骨下动脉
- D.压迫尺、桡动脉
- E.压迫颞动脉

59.患者,男性,21岁。腹部外伤,疼痛严重并有肠脱出,应立即

- A.包扎
- B.将肠还纳腹腔
- C.使用止痛药
- D.用容器将肠扣住,再包扎
- E.嘱其平卧

60.患者,女性,53岁。3个月前在火车

上急性起病,突然不认识女儿,恐惧说:“头痛,眼前有甲虫飞舞,兴奋,应当杀死她。”耳边听到儿子、女儿说话声,经治疗后症状消失。1周前听到儿子死亡的消息旧病复发,症状同前。既往有高血压史5年。躯体检查:BP 200/90 mmHg,神经检查正常精神检查:意识模糊,恐惧,有幻觉,思维不连贯,智力减退,记忆力差,有时意识清晰,叙述自己儿子已死亡,性格急躁,易激动,血压升高时精神症状加重。本病例应考虑为

- A.脑血管病所致精神障碍
- B.老年性痴呆
- C.反应性精神病
- D.躯体疾病伴发精神障碍
- E.精神分裂症

(61~62题共用题干)

患者,女性,38岁。常用“高兴不起来”“心里难受”描述自己的心理体验,觉得活着毫无意义,经诊断为抑郁症,在家口服药物治疗。

61.符合抑郁症情感障碍特点的是

- A.情绪低落
- B.情感淡漠
- C.情绪不稳
- D.焦虑症状
- E.情感高涨

62.患者抑郁情绪的变化特点为

- A.中午最重
- B.半夜最重
- C.中午起逐渐加重
- D.晨重夜轻
- E.晨轻夜重

(63~66题共用题干)

男性,22岁。乏力、咳嗽、盗汗、低热2个月余,近1周来有咯血及痰中带血。诊断为浸润性肺结核。

63.该患者结核菌素试验1:2 000强阳性。此结果最可能提示

- A.现在正患活动性肺结核

- B.可排除结核病  
 C.非典型结核杆菌感染  
 D.结核病已经治愈  
 E.曾有结核菌感染

64.与感染结核菌后是否发病无关的是

- A.侵入结核菌的数量  
 B.侵入结核菌的耐药性  
 C.侵入结核菌的毒力  
 D.机体对结核菌的免疫力  
 E.机体对结核菌的变态反应

65.结核病灶中常有生长速度不同的结核菌群,其中无致病、传染性的是

- A.耐药菌  
 B.休眠菌  
 C.细胞内酸性环境中的菌  
 D.偶然繁殖菌  
 E.不断生长繁殖菌

66.结核病最常见的传播途径是

- A.呼吸道传播  
 B.虫媒传播  
 C.血液传播  
 D.消化道传播  
 E.皮肤接触传播

(67~69题共用题干)

患者,女性,26岁。全血细胞减少,骨髓有核细胞增生低下,粒系、红系低下,巨核细胞缺如。

67.对该患者有最可能的诊断是

- A.缺铁性贫血  
 B.再生障碍性贫血  
 C.急性白血病  
 D.慢性白血病  
 E.特发性血小板减少性紫癜

68.与该疾病无关的因素是

- A.氯霉素  
 B.X射线接触  
 C.病毒感染  
 D.饮食因素  
 E.遗传倾向

69.对该患者最重要的护理措施是

- A.合理的休息与活动  
 B.饮食护理  
 C.预防颅内出血  
 D.心理护理  
 E.观察药物的不良反应

(70~72题共用题干)

患者,男性,50岁。精神分裂症住院治疗1个月余,病情稳定后回家继续治疗。

70.该患者口服氯氮平治疗,属于该药物抗胆碱能不良反应的表现的是

- A.恶心、呕吐  
 B.癫痫发作  
 C.体重增加  
 D.粒细胞缺乏症  
 E.脑电图改变

71.属于该药物严重不良反应的是

- A.恶心、呕吐  
 B.癫痫发作  
 C.体重增加  
 D.粒细胞缺乏症  
 E.脑电图改变

72.针对该反应,社区护士在家庭访视中应教育患者及其家属

- A.出现反应立即停药并进行相应的处理  
 B.治疗开始前3个月内应坚持每1~2周检查白细胞计数及分类,以后定期检查  
 C.定期检查肝功能与心电图  
 D.用药期间不宜驾驶车辆、操作机械或高空作业  
 E.用药期间出现不明原因发热,应暂停用药

(73~75题共用题干)

患者,女性,38岁。接触生石灰后,局部烧伤,基底渐红,剧痛,马上用清水冲洗,损伤范围扩大,基底红白相间,疼痛减轻。

73.患者初始的烧伤深度为

- A.轻度烧伤



- B. I 度烧伤
- C. 浅 II 度烧伤
- D. 深 II 度烧伤
- E. III 度烧伤

74. 现患者的烧伤深度为

- A. 轻度烧伤
- B. I 度烧伤
- C. 浅 II 度烧伤
- D. 深 II 度烧伤
- E. III 度烧伤

75. 其原因为

- A. 冲洗不及时
- B. 冲洗不充分
- C. 不应冲洗
- D. 没有去除石灰粉末就冲洗
- E. 未涂烫伤膏

(76~78 题共用题干)

患儿 7 岁, 高热体温: 40.5 °C, 昏迷, 抽搐, 四肢厥冷, 血压 60/38 mmHg, 肛拭子取便镜检为脓细胞、红细胞(+)

76. 应考虑该患者为

- A. 细菌性痢疾
- B. 霍乱
- C. 钩端螺旋体病
- D. 阿米巴痢疾
- E. 伤寒

77. 不符合该疾病致病微生物特点的是

- A. 为革兰阴性的无鞭毛杆菌
- B. 在外界生存能力较差
- C. 主要流行菌群为 B 群
- D. 可产生内毒素
- E. 属肠杆菌科志贺菌属

78. 预防该综合措施中最重要的是

- A. 隔离患者
- B. 发现并处理带菌者
- C. 加强社区卫生监督管理
- D. 接种疫苗
- E. 流行季节预防服药

(79~81 题共用题干)

患者, 男性, 70 岁。近期出现近事记忆受损, 智能减退, 难以胜任简单家务劳动, 不能正确回答自己亲人的名字与年龄, 但尚能记住自己的名字, 饮食不知饥饱, 外出找不到家门, 举止幼稚, 不知羞耻等主要表现

79. 患者经 CT 检查未发有异常, 应考虑其为

- A. 阿尔茨海默病
- B. 精神分裂
- C. 血管性痴呆
- D. 抑郁症
- E. 人格障碍

80. 该病时首发症状常为

- A. 智能衰退
- B. 痴呆
- C. 定向能力受损
- D. 记忆障碍
- E. 妄想

81. 该患者如进入晚期, 其结局为

- A. 丧失生活能力, 需人照顾
- B. 幻觉
- C. 情感淡漠
- D. 妄想
- E. 注意力不集中

(82~85 题共用题干)

患者, 女性, 70 岁。突发头痛, 随即意识丧失, 呼之无反应。查体: 血压 24/15 kPa, 脉率 60 次/分, 体温 38 °C; 瞳孔 3 mm, 双侧等大、等圆, 对光反射迟钝, 右侧肢体肌张力 II 级, 痛觉反射消失。应用 20% 甘露醇静脉注射。

82. 患者的意识程度是

- A. 嗜睡
- B. 意识模糊
- C. 昏睡
- D. 昏迷
- E. 谵妄

83. 应采用的卧位是

- A. 去枕平卧, 头偏向一侧

- B. 仰卧屈膝位, 头偏向一侧  
 C. 头低脚高位, 头偏向一侧  
 D. 俯卧位, 头偏向一侧  
 E. 半坐卧位, 头偏向一侧

84. 血管活性药救有效的指标是

- A. 血压  
 B. 体温  
 C. 尿量  
 D. 意识状态  
 E. 神经反射

85. 肌肉萎缩的有效护理措施是

- A. 针灸疗法刺激肌肉收缩  
 B. 肢体被动锻炼, 肌肉按摩  
 C. 物理疗法促进血液循环  
 D. 抬高四肢, 促进肌肉等张收缩  
 E. 肢体关节处垫软枕

(86~88 题共用题干)

患者, 女性, 20 岁。火焰烧伤双大腿, 双足, 均为Ⅲ度。

86. 该患者的烧伤面积是

- A. 23%  
 B. 24%  
 C. 26%  
 D. 27%  
 E. 28%

87. 该患者烧伤严重性分度为

- A. 轻度烧伤  
 B. 中度烧伤  
 C. 重度烧伤  
 D. 深度烧伤  
 E. 特重度烧伤

88. 该患者治疗最重要的是

- A. 清水清洗创面, 减少损伤  
 B. 给予口服盐水, 预防低血容量  
 C. 保持呼吸道通畅  
 D. 用干净的布类保护创面  
 E. 口服抗生素预防感染

二、以下提供若干组考题, 每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(89~91 题共用备选答案)

- A. 酒精依赖  
 B. 酒精中毒性幻觉症  
 C. 酒精中毒性妄想症  
 D. 酒精中毒性痴呆  
 E. 震颤谵妄

89. 饮酒后突然骤减而出现的短暂意识障碍状态

90. 酒的强烈渴求而无法控制

91. 期大量饮酒引起的酒精性脑病

(92~94 题共用备选答案)

A. 城镇应于 1 小时内, 农村应于 6 小时内

B. 城镇应于 2 小时内, 牧村应于 6 小时内

C. 城镇应于 6 小时内, 农村应于 12 小时内

D. 城镇应于 12 小时内, 液村应于 12 小时内

E. 24 小时内

92. 艾滋病的患者、病原携带者或疑似患者, 通过传染病疫情监测信息系统进行报告的时限为

93. 淋病的患者、病原携带者或疑似患者, 通过传染病疫情监测信息系统进行报告的时限为

94. 流行性腮腺炎的患者、病原携带者或疑似患者, 通过传染病疫情监测信息系统进行报告的时限为

(95~96 题共用备选答案)

A. 预防压疮、肢体置功能位及被动关节运动, 呼吸训练及排痰训练和防止泌尿系感染

B. 肌力训练、床上全面锻炼, 坐位练习、



轮椅训练,站立和步行训练,作业疗法

- C.痉挛、性功能障碍和疼痛的处理
- D.运动功能障碍和姿势异常的锻炼
- E.早期发现早期康复,康复与游戏及教育相结合

95.伤急性期的康复措施是

96.损伤恢复期的康复措施是

(97~98 题共用备选答案)

- A.嫉妒妄想
- B.罪恶妄想
- C.夸大妄想
- D.超价观念
- E.思维被洞悉妄想

97.男性,42岁,工人。夫妻关系好,钻研出许多新技术,写了不少文章,因情绪低落自杀未遂,说自己对不起领导,占公家的

便宜,要求受法律处分,该表现属于

98.女性,25岁,干部。患者告诉护士自己在饭厅吃饭觉得菜很淡,想拿酱油,但别人先拿走了,想喝水时,有人即去倒水,认为别人了解自己的想法,该表现属于

(99~100 题共用备选答案)

- A.否认期
- B.愤怒期
- C.协议期
- D.忧郁期
- E.接受期

99.临终患者表现为喜欢独处,情感减退,属于心理分期中的

100.患者四处求医以证实医生的诊断是否正确,属于心理分期中的



考前点睛班