

口腔执业(含助理)医师资格考试考前 100 考点

- 1.放线菌是人口腔正常菌丛中最常见的革兰阳性丝状菌。
- 2.牙内陷常见于上颌侧切牙,偶发于上颌中切牙或尖牙,牙中牙是牙内陷最严重的一种。
- 3.急性化脓性牙髓炎的临床表现:患牙自发性剧烈的跳痛,可有夜间痛和放散性痛,最明显的特点是热加剧痛,而冷能缓解痛。
- 4.急性化脓性腮腺炎的致病菌主要是金黄色葡萄球菌。
- 5.甲硝唑主要用于牙周抗厌氧菌治疗。
- 6.牙本质过敏症的主要表现为刺激痛,当刷牙,吃硬物、酸、甜、冷、热等刺激时均可发生酸痛,尤其对机械刺激最敏感。
- 7.检查继发龋的最佳方法是拍牙片。
- 8.外科手术最常用的止血方法是钳夹、结扎止血法。
- 9.颌骨骨折最常见的体征是咬合错乱。
- 10.腺源性感染最常见于下颌下间隙感染。
- 11.疱疹性口腔炎不宜使用激素类药物。
- 12.可引起牙龈增生的药物有硝苯地平、苯妥英钠、环孢素。
- 13.局麻药作用时间从长到短依次为:布比卡因>丁卡因>利多卡因)普鲁卡因。
- 14.牙挺原理包括楔原理、轮轴原理、杠杆原理。
- 15.咬合紧,牙冠短,最佳修复方案是铸造全冠。
- 16.皮片越薄,移植成活力越强。
- 17.最早萌出的乳牙:下颌乳中切牙。最晚萌出的乳牙:上颌第二乳磨牙。
- 18.下颌第二前磨牙最常见畸形中央尖。
- 19.对牙周健康状况影响最大的不良习惯是吸烟。
- 20.圈形卡环多用于远中孤立的磨牙上。
- 21.Ⅱ型观测线为基牙向缺隙方向倾斜时所画。
- 22.肯氏三类是一侧后牙缺失,缺隙前后都有天然牙,单侧非游离端缺牙。
- 23.釉质是人体中最硬的组织,无机物占总重量的 96%~97%,有机物占总重量的 1%。
- 24.新生线见于乳牙和第一恒磨牙。
- 25.牙周膜纤维结构有牙槽嵴组、水平组、斜行组、根尖组、根间组。
- 26.舌腭腺和腭腺是纯黏液腺体。
- 27.口腔白斑可根据临床表现的不同,分为均质型和非均质型。非均质型又分为疣状型、溃疡型和颗粒型。
- 28.心绞痛急性发作时,为迅速缓解症状,应首选:舌下含化硝酸甘油。
- 29.治疗厌氧菌感染的首选药是:甲硝唑。
- 30.肺心病肺动脉高压形成的最重要的原因是:肺细小动脉痉挛。

31. 国内咯血的最常见病因是:肺结核。
32. 慢性阻塞性肺气肿发病的最主要因素是:吸烟。
33. 正常人的开口度为 3.7~4.5 cm, 低于该值表明有开口受限。
34. 下颌最大侧方运动范围约为 12 mm。
35. 牙槽骨修整一般在拔牙后 1 个月左右修整较好。
36. 下颌骨薄弱部位:正中联合,颏孔区,下颌角,髁状突颈部。
37. 侧腭杆位于上颌硬区两侧,离开龈缘 4~6 mm。
38. 半解剖式人工牙的牙尖斜度:20 度。
39. 干槽症发生在拔牙后 3~4 天。
40. 负压引流 24 小时内引流液不超过 20~30 ml 即可拔出引流条。
41. 双侧唇裂整复术宜在出生后 6~12 个月内进行。
42. 随意皮瓣血供特别丰富的部位长宽比可达 4:1。
43. 窝沟封闭最适宜的时间:乳磨牙在 3~4 岁,第一恒磨牙在 6~7 岁,第二恒磨牙在 11~13 岁。
44. 乳牙的特点:牙冠短小,色白,颈嵴明显,冠根分明。上颌乳尖牙的牙尖偏远中。下颌乳前牙的舌面边缘嵴与颈嵴比恒前牙明显。乳磨牙根干短,根分叉大。
45. 在我国以舌癌、颊癌、牙龈癌等常见,唇癌较少见。
46. 必需氨基酸有赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸。
47. 医学伦理学原则包括不伤害原则、有利原则、尊重原则、公正原则。
48. 知觉是人脑对客观事物整体属性的反映。
49. 对患者死因有异议时,应在 48 小时内进行尸检,有冻存条件者可延长至 7 日。
50. 葡萄球菌食物中毒临床期短,出现反复剧烈呕吐,常呈喷射状。体温正常或稍高。
51. 粘接力与粘结面积成正比,粘接力与粘固剂的厚度成反比。粘固剂厚度不超过 30 μ m
52. 金瓷结合力-化学结合(最主要),机械结合,压缩结合,范德华力
53. 铸铸造全冠肩台-非贵金属属 0.5~0.8 mm 宽,贵金属 0.35~0.5 mm 宽,烤瓷熔附金属全冠肩台宽度一般为 1.0 mm。
54. 桩冠要求:根尖部保留 3~5 mm 根充材料,桩的长度为根长的 2/3~3/4,直径为根径的 1/3。
55. 与下颌骨发育相关的是第 1 鳃弓软骨。
56. 耳屏前形成的皮肤盲管可能是由于第 1 对鳃沟发育异常。
57. 腭裂是口腔较常见的一种畸形,为侧腭突和鼻中隔未融合或部分融合的结果。
58. 决定牙齿形态的重要的结构是牙乳头。
59. 修复性牙本质又称反应性牙本质或第三期牙本质。
60. 牙髓中的主要细胞是成纤维细胞,故又称为牙髓细胞。
61. 唾液腺的导管分为闰管、分泌管、排泄管三段。其中,闰管是导管最细小的终末

分支部分,连接腺泡与分泌管。

62.大唾液腺中,腮腺属于纯浆液腺。

63.病损体部是釉质龋病变的主要部位,从表层下一直延伸到近暗层。

64.慢性牙髓炎根据临床表现可分为闭锁性、溃疡性、增生性。

65.牙髓钙化有两种形式,一种是髓石形成;另一种是弥散性钙化。

66.慢性盘状红斑狼疮区别于扁平苔藓的病理表现是可见角质栓塞,血管周有淋巴细胞浸润。

67.口腔黏膜念珠菌感染的病理变化是角化层内形成微小脓肿。

68.含牙囊肿内衬上皮发生于缩余釉上皮。

69.人类最早萌出的乳牙是下颌乳中切牙。

70.切牙乳头(腭乳头)位于腭中缝前端的黏膜隆起,其深面为切牙孔,鼻腭神经、血管经此孔穿出。

71.描述性流行病学的方法主要有横断面研究、纵向研究和常规资料分析。

72.偏倚是由于某些原因造成检查结果与实际情况不符,属于系统误差,应该设法防止,其常见的种类有选择性偏倚、无应答偏倚和信息偏倚。

73.WHO 评价龋病流行程度的标准年龄组是 12 岁。

74.在碳水化合物中致龋性最强的是蔗糖。

75.氟排泄的主要途径是肾。

76.氟滴剂适用于 2 岁以下的幼儿。

77.窝沟封闭失败的最主要原因是酸蚀后唾液污染。

78.脓肿穿刺:8 或 9 号针头。血管瘤:7 号。肿瘤:6 号

79.妊娠 4~6 个月是治疗口腔疾病的适宜时期在,但也应注意在保护措施下拍照 X 线片,不要直接照射盆腔和腹部。

80.临床医疗在处理医疗废物时设置三种颜色的废物袋,黑色袋装生活废物,黄色袋装除了尖锐性物品外的医疗废物,红色袋装放射性废物。

81.变形链球菌有强的致龋性主要取决于其产酸性和耐酸性。

82.龋病是在以细菌为主的多种因素作用下,牙齿硬组织发生的慢性、进行性破坏的一种疾病。

83.龋病的主要致龋因素包括细菌、牙菌斑、食物以及牙齿所处的环境等。

84.下颌第一磨牙各表面患龋病的顺序依次为咬合面、颊面、近中面、远中面和舌面。

85.磷酸锌水门汀内的游离磷酸可对牙髓产生刺激。

86.氧化锌丁香油水门汀由粉和液两部分组成,为一种软而有安抚作用的水门汀。

87.氟牙症是氟摄入量过高引起的一种特殊类型的釉质发育不全。

88.氟牙症的发生取决于过多氟进入人体的时机。

89.修复体的主要固位力来自于摩擦力和黏结力。

90.固定义齿修复的最佳时间一般是在拔牙后 3 个月

91.舍格伦综合征:唾液腺肿大以腮腺最常见,唇腺活检,主导管葱皮样改变,末梢导管点球状扩张

92.慢性复发性腮腺炎:儿童5岁多见,自愈性,迁延不愈变成人复发性腮腺炎。造影末梢导管点球状,胶冻样脓液

93.下颌下腺前部结石用下颌横断骀片,后部用下颌下腺侧位片

94.导致牙列缺损的常见原因是龋病。

95 完全固定桥是指双端固定桥。

96 设计固定义齿时,增加基牙的目的是为了分散骀力,减轻基牙的负荷。

97.如果牙槽突的吸收超过根长的1/3,就不宜选作基牙。

98.与解剖式人工牙比较,非解剖式人工牙咀嚼效能差,侧向骀力小。

99 I型卡环的特点是固位、支持和稳定作用好。

100.回力卡环具有应力中断作用的原因是基托相连,骀力通过人工牙和基托传到黏膜和颌骨上,减轻基牙的负担。



口腔执业(含助理)医师资格考试考前 100 考题

1. 窝沟龋中最多的菌是

- A. 乳酸杆菌
- B. 变性链球菌
- C. 放线菌
- D. 棒状杆菌
- E. 韦永菌

答案: B

2. 畸形舌侧窝多见于

- A. 上颌前磨牙
- B. 下颌前磨牙
- C. 上、下颌前磨牙
- D. 上颌侧切牙
- E. 磨牙

答案: D

3. 急性牙髓炎最有效的应急处理是

- A. 安抚作用
- B. 开髓引流
- C. 服药止痛
- D. 针灸止痛
- E. 消炎止痛

答案: B

4. 急性牙髓炎脓肿的排脓通路对根尖周组织破坏最小的是

- A. 穿通唇侧、颊侧骨壁
- B. 穿通舌腭侧骨壁
- C. 通过根尖孔经根管从龋洞排出
- D. 向上颌窦内排脓
- E. 通过牙周膜从龈沟或牙周袋排脓

答案: C

5. 以下哪一种菌属在加速龋病的发展中可能起主要作用

- A. 变链菌

B. 放线菌

C. 韦荣菌

D. 乳杆菌

E. 类杆菌

答案: D

6. 楔状缺损的病因中, 近年提出的是

- A. 横刷牙机械磨损
- B. 牙颈部特殊结构
- C. 釉质的发育异常
- D. 酸性食物的酸蚀
- E. 硬组织应力疲劳

答案: E

7. 检查继发龋的最佳方法是

- A. 探诊
- B. 叩诊
- C. 咬诊
- D. 拍 X 线片
- E. 去除充填物

答案: D

8. 不做初期缝合的创口是

- A. 无菌创口
- B. 污染窗口
- C. 感染创口
- D. 切开拔牙创口
- E. 有组织缺损的无菌创口

答案: C

9. 脑脊液耳瘘多见于

- A. LeFortI 型骨折
- B. LeFortII 型骨折
- C. LeFortIII 型骨折
- D. 颧骨骨折
- E. 颧弓骨折

答案:C

10.最易导致呼吸困难的是

- A.眶下间隙感染
- B.咬肌间隙感染
- C.下颌下间隙感染
- D.颞下颌间隙感染
- E.口底蜂窝织炎

答案:E

11.复发性单纯疱疹性口炎与复发有关的有因不包括

- A.局部机械损伤
- B.过度疲劳
- C.妇女月经期
- D.微量元素缺乏
- E.感冒

答案:D

12.用于治疗急性坏死性溃疡性龈炎最有效的药物是

- A.四环素
- B.金霉素
- C.磺胺类
- D.甲硝唑
- E.青霉素

答案:D

13.与百分之二普鲁卡因比较,以下哪项不是百分之二利多卡因的特点

- A.毒性较大,但可用作表面麻醉
- B.有较强的组织穿透性和扩散性
- C.维持时间较短
- D.麻醉作用强,起效快
- E.有抗室性心律失常作用

答案:C

14.牙拔除术的基本步骤不包括

- A.安放牙钳

B.挺松患牙

C.分离牙龈

D.去骨

E.处理拔牙窝

答案:D

15.全冠修复时,制备患牙时轴面向切方向少许聚合,以多少度为宜

- A.0°
- B.2°-5°
- C.10°-15°
- D.15°-20°
- E.5°-10°

答案:B

16.拔上颌磨牙时牙根完整拔除,拔牙后发现口腔上颌窦瘘,穿孔小于1mm时

- A.必须做瘘口修补术
- B.使拔牙创面充满血块
- C.冲洗拔牙创面
- D.填塞明胶海绵
- E.行上颌窦根治

答案:B

17.临床上对乳牙近髓深龋的治疗最好采用

- A.直接盖髓
- B.间接盖髓
- C.冠髓切除术
- D.干髓术
- E.根管治疗

答案:B

18.牙内陷最严重的情况是

- A.畸形舌侧窝
- B.牙中牙
- C.畸形根面沟
- D.畸形舌侧尖

E.锥形牙

答案:B

19.属于牙周炎全身促进因素的是

- A.牙根形态异常
- B.吸烟
- C.牙菌斑
- D.畸形中央尖
- E.颊面深窝沟

答案:B

20.在口腔健康调查中由于调查对象的代表性差,导致调查结果与实际不符,这属于

- A.随机误差
- B.无应答偏倚
- C.选择性偏倚
- D.检查者之间偏性
- E.检查者本身偏性

答案:C

21.固定义齿修复时,一端基牙若有倾斜可设计

- A.一端为活动连接
- B.两端为活动连接
- C.两端为固定连接
- D.增加一端基牙数
- E.增加两端基牙数

答案:A

22.黏膜支持式可摘局部义齿和牙支持式可摘局部义齿的主要区别是

- A.卡环的多少
- B.有无间接固位体
- C.有无殆支托
- D.缺牙的多少
- E.基托面积的大小

答案:C

23.关于釉质的描述,错误的是

- A.是人体中最硬的组织
- B.无机物占釉质总重量的 96%~97%
- C.有机物约占釉质总重量的 1%
- D.大部分水是以游离水的形式存在
- E.主要由钙、磷离子组成的羟基磷灰石晶体的形式存在

答案:D

24.生长线、横纹均明显的早期釉质龋的病理改变位于

- A.表层
- B.透明层
- C.暗层
- D.脱矿层
- E.病损体部

答案:E

25.口腔黏膜上皮的生发层是指

- A.基底层和颗粒层
- B.基底层和棘层
- C.颗粒层和棘层
- D.颗粒层和角质层
- E.角质层和基底层

答案:B

26.能调节唾液的量及渗透压的结构是

- A.浆液性腺泡
- B.粘液性腺泡
- C.润管
- D.分泌管
- E.排泄管

答案:D

27.下列为白斑的临床分型,除外

- A.颗粒型
- B.增殖型
- C.均质型

D.溃疡型

E.疣状型

答案:B

28.正中颌位时

A.上下牙达到最大面积接触

B.咀嚼肌处于最松弛状态

C.上下切牙间有1-4mm间隙

D.下颌骨处于被动的位置

E.只有前牙接触,后牙不接触

答案:A

29.正常小开口运动时,运动的轴心在

A.髁突

B.下颌孔

C.喙突

D.下颌小舌

E.关节盘

答案:A

30.应用鹰嘴钳拔下前牙时,术者应站在患者

A.右侧后方

B.右侧前方

C.左侧后方

D.左侧前方

E.正后方

答案:B

31.下颌骨最不易发生骨折的部位是

A.下颌角

B.下颌体

C.髁状突颈

D.正中联合

E.颞孔区

答案:B

32.舌杆位于下颌舌侧龈缘与舌系带或黏膜皱襞之间,距牙龈缘

A.1mm

B.2-3mm

C.3-4mm

D.5-6mm

E.7mm

答案:C

33.可摘局部义齿卡环的数量一般为

A.2-4个

B.5-6个

C.7-8个

D.尽量少

E.尽量多

答案:A

34.干槽症发生在拔牙术后的几天

A.马上

B.1天

C.3天

D.5天

E.10天

答案:C

35.感染创口去除引流的时间一般是无脓液排出

A.即刻去除

B.12小时后

C.24小时后

D.36小时后

E.24-48小时后

答案:E

36.间隔抽样或机械抽样方法又称为

A.单纯抽样

B.系统抽样

C.分层抽样

D.整群抽样

E.多阶段抽样

答案:B

37.根据唇腭裂序列治疗的原则,进行腭形成术的年龄应在

- A.3-6 个月
- B.12-18 个月
- C.2-3 岁
- D.4-5 岁
- E.6-7 岁

答案:B

38.进行窝沟封闭时乳牙酸蚀时间是

- A.20 秒
- B.30 秒
- C.40 秒
- D.50 秒
- E.60 秒

答案:E

39.出生后,第一次做口腔检查的时间是

- A.3 个月,乳牙未萌出
- B.6 个月,第一颗乳牙萌出
- C.1 岁,下中、侧切牙萌出
- D.2 岁,多数乳牙已萌出
- E.2 岁半,乳牙全部萌出

答案:B

40.婴儿创伤性溃疡最好发的部位是

- A.舌缘
- B.颊黏膜
- C.舌系带附近
- D.前庭沟黏膜
- E.舌背

答案:C

41.颈窦的形成是由于以下哪个鳃弓生长速度快并与颈部组织融合形成的

- A.第一鳃弓

B.第二鳃弓

C.第三鳃弓

D.第四鳃弓

E.第五鳃弓

答案:B

42.神经嵴可衍化为下列细胞,除了

- A.成釉细胞
- B.成牙本质细胞
- C.成牙骨质细胞
- D.牙髓细胞
- E.牙周膜成纤维细胞

答案:A

43.口腔颌面部发育基本上在哪期发育完成

- A.受孕后 1 周
- B.受孕后 2 周
- C.受孕后 10 周
- D.受孕后 3~8 周
- E.受孕后 9 周

答案:D

44.唇裂发生的原因是

- A.上颌突和下颌突未联合或部分联合
- B.中鼻突和侧鼻突未联合或部分联合
- C.上颌突和侧鼻突未联合或部分联合
- D.球状突和上颌突未联合或部分联合
- E.两侧侧腭突未融合或部分融合

答案:D

45.上颌尖牙来源于哪个突起

- A.上颌突
- B.下颌突
- C.球状突
- D.中鼻突
- E.侧鼻突

答案:A

46.形成牙釉质的细胞为

- A.外釉上皮细胞
- B.内釉上皮细胞
- C.星网状层细胞
- D.中间层细胞
- E.成牙本质细胞

答案:B

47.牙发育过程中最先形成的硬组织是

- A.牙髓
- B.牙本质
- C.牙骨质
- D.牙槽骨
- E.牙釉质

答案:B

48.形成牙周膜的结构是

- A.成釉器
- B.牙乳头
- C.牙囊
- D.牙板
- E.前庭板

答案:C

49.关于牙齿的发生不正确的是

- A.成釉器形成釉质
- B.牙乳头形成牙本质、牙骨质
- C.牙囊形成牙周膜
- D.牙乳头形成牙髓
- E.牙囊形成固有牙槽骨

答案:B

50.釉质基质形成时矿物质占有

- A.10%
- B.20%
- C.30%
- D.40%
- E.50%

答案:C

51.因磨损、酸蚀或龋等较重的刺激,使成牙本质细胞突起变性、分解,小管内充满空气,形成

- A.修复性牙本质
- B.第三期牙本质
- C.透明牙本质
- D.反应性牙本质
- E.死区

答案:E

52.正常情况下,最易引起牙本质敏感症的釉质牙骨质界结构为

- A.少量牙骨质覆盖在釉质表面
- B.多量牙骨质覆盖在釉质表面
- C.釉质与牙骨质端端相接
- D.釉质与牙骨质分离
- E.牙骨质全部覆盖在釉质表面

答案:D

53.胶原纤维排列与牙本质小管平行的牙本质是

- A.管周牙本质
- B.管间牙本质
- C.前期牙本质
- D.球间牙本质
- E.罩牙本质

答案:E

54.下列口腔黏膜中不属于被覆黏膜的是

- A.唇黏膜和颊黏膜
- B.硬腭黏膜和舌背黏膜
- C.口底黏膜和舌腹黏膜
- D.软腭黏膜和唇红黏膜
- E.牙槽黏膜和口底黏膜

答案:B

55. 下列腺体中属于纯浆液腺的是

- A. 腮腺
- B. 下颌下腺
- C. 舌下腺
- D. 唇腺
- E. 磨牙后腺

答案:A

56. Kappa 值为 0.61~0.80 时可定为

- A. 完全不可靠
- B. 可靠度不合格
- C. 可靠度中等
- D. 可靠度优
- E. 完全可靠

答案:D

57. 现况调查样本含量估计常用以下公式: $N = K \times Q / P$, 其中 K 值是根据研究项目的允许误差大小而确定, 当允许误差为 10% (0.1P) 时, K 为

- A. 50
- B. 100
- C. 200
- D. 400
- E. 800

答案:D

58. 我国进行第二次全国口腔流行病学抽样调查属于

- A. 横断面研究
- B. 纵向研究
- C. 常规资料分析
- D. 病例对照研究
- E. 群组研究

答案:A

59. 釉质龋病损区分层不包括

- A. 表层

B. 透明层

C. 暗层

D. 脂肪变性层

E. 病损体层

答案:D

60. 年轻恒牙备洞时敏感的原因是

- A. 牙髓疏松, 纤维少
- B. 硬组织薄, 矿化度低
- C. 牙本质小管粗大, 周围钙化低
- D. 磨耗少, 点隙清楚
- E. 牙根发育未完成

答案:C

61. 釉质龋中脱矿最严重的区域是

- A. 透明层
- B. 暗层
- C. 病损体部
- D. 表层
- E. 脱矿层

答案:C

62. 急性牙髓炎的主要病理变化是

- A. 淋巴细胞浸润
- B. 浆细胞浸润
- C. 肉芽组织形成
- D. 巨噬细胞浸润
- E. 中性粒细胞浸润

答案:E

63. 不用于防龋的蔗糖代用品是

- A. 山梨醇
- B. 木糖醇
- C. 甜菊糖
- D. 果糖
- E. 甘露醇

答案:D

64. 中度张口受限是指切牙距

- A. 小于 1cm
- B. 大于 1cm, 小于 2cm
- C. 大于 2cm, 小于 3cm
- D. 大于 3cm, 小于 4cm
- E. 大于 4cm

答案: B

65. 根尖肉芽肿内的上皮成分绝大多数来自

- A. 异位的腺上皮
- B. 口腔上皮
- C. 缩余釉上皮
- D. Malassez 上皮剩余
- E. 牙板上皮

答案: D

66. 唇舌病变使用双合诊检查时, 应该

- A. 双手置于病变上下或两侧
- B. 双手食指置于病变上下或两侧
- C. 一手的食指和拇指置于病变上下或两侧
- D. 一手的食指和中指置于病变上下或两侧
- E. 一手的食指和另一手拇指置于病变上下或两侧

答案: C

67. 用于口内消毒的氯己定浓度是

- A. 0.1%
- B. 0.2%
- C. 0.5%
- D. 1.0%
- E. 1.5%

答案: A

68. 口腔颌面部创伤活动性出血时, 最可靠的止血方法是

- A. 指压止血

- B. 包扎止血
- C. 填塞止血
- D. 结扎止血
- E. 药物止血

答案: D

69. 正常人每日唾液总量为 1000 ~ 1500ml, 其中腮腺和下颌下腺的分泌量占

- A. 75%
- B. 80%
- C. 85%
- D. 90%
- E. 95%

答案: D

70. 利多卡因一次最大用量为

- A. 10 ~ 50mg
- B. 80 ~ 100mg
- C. 300 ~ 400mg
- D. 800 ~ 1000mg
- E. 1500mg

答案: C

71. 布比卡因麻醉时间可达

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 4 小时
- D. 5 小时
- E. 6 小时

答案: E

72. 主要用扭转力拔除的牙是

- A. 上颌第三磨牙
- B. 下颌中切牙
- C. 上颌中切牙
- D. 上颌前磨牙
- E. 下颌前磨牙

答案: C

73.颞下颌关节功能检查项目中不包括

- A. 关节活动度
- B. 下颌侧方运动
- C. 开口型
- D. 有无关节弹响
- E. 叩齿动作

答案:E

74.义齿修复前,对口腔软组织的处理措施中不包括

- A. 松软牙槽嵴修整
- B. 义齿性口炎治疗
- C. 黏膜扁平苔癣治疗
- D. 咀嚼肌功能训练
- E. 唇系带修整

答案:D

75.眶下间隙感染向颅内扩散,并发海绵窦血栓性静脉炎,其扩散途径通常是

- A. 面前静脉,颈内静脉
- B. 颞浅静脉,内眦静脉
- C. 面前静脉,颞浅静脉,颈内静脉
- D. 面前静脉,内眦静脉,眼静脉
- E. 眶内静脉,面前静脉

答案:D

76.咬肌间隙感染如未及时切开引流,最常引起的并发症是

- A. 败血症
- B. 脓毒血症
- C. 下颌骨中央性骨髓炎
- D. 颈间隙感染
- E. 下颌骨边缘性骨髓炎

答案:E

77.最可能含有静脉石的是

- A. 血管瘤
- B. 静脉畸形

C. 微静脉畸形

D. 动静脉畸形

E. 混合型脉管畸形

答案:B

78.属发育性囊肿的是

- A. 甲状舌管囊肿
- B. 舌下腺囊肿
- C. 唾液腺囊肿
- D. 皮脂腺囊肿
- E. 根端囊肿

答案:A

79.舌癌最少发生于

- A. 舌侧缘
- B. 舌尖
- C. 舌背
- D. 舌腹
- E. 舌根

答案:D

80.以下不宜行组织活检术的恶性肿瘤为

- A. 舌癌
- B. 唇癌
- C. 恶性淋巴瘤
- D. 恶性黑色素瘤
- E. 肉瘤

答案:D

81.皮肤创口缝合后过度外翻是因为

- A. 进针点距创缘过远
- B. 两侧进针深度不一致
- C. 皮肤切口两侧进针间距大于皮下间距
- D. 皮肤切口两侧进针间距小于皮下间距
- E. 打结过紧

答案:D

82.不属于蔓状血管瘤临床表现的是

- A.体位移动试验阳性
- B.表面皮温高
- C.扪诊有震颤感
- D.听诊有吹风样杂音
- E.肿瘤高起呈念珠状

答案:A

83.上前牙 3/4 冠邻沟的方向为

- A.与唇面切 1/3 平行
- B.与唇面切 2/3 平行
- C.与唇面龈 2/3 平行
- D.与舌隆突平行
- E.与牙长轴平行

答案:B

84.多形性腺瘤最常发生于

- A.腮腺
- B.下颌下腺
- C.舌下腺
- D.腭腺
- E.唇腺

答案:A

85.铸造全冠最常用的颈缘形态为

- A.直角肩台型
- B.斜面型
- C.刃状型
- D.凹面型
- E.凹斜面

答案:D

86.下列不属于口腔二级预防的是

- A.口腔 X 线片辅助诊断
- B.龋病的早期充填
- C.龋病的早期诊断
- D.定期口腔检查

E.窝沟封闭

答案:E

87.关于病例-对照研究特点不包括哪一项

- A.观察时间短
- B.需要研究的对象少
- C.适合研究一些病程较长的慢性病和一些比较多见的疾病
- D.尤其适合那些原因未明疾病的研究
- E.准确性低,可靠性较差,回忆偏倚较大

答案:C

88.儿童复发性腮腺炎最常见的发病年龄是

- A.7 岁左右
- B.5 岁左右
- C.3 岁左右
- D.2 岁左右
- E.1 岁左右

答案:B

89.急性化脓性腮腺炎的主要感染途径是经

- A.腮腺导管逆行感染
- B.口内破损黏膜
- C.牙源性途径
- D.血源性途径
- E.淋巴途径

答案:A

90.描述性口腔流行病学最常用的研究方法是

- A.横断面调查
- B.纵向调查
- C.常规资料分析
- D.疾病监测

E. 群组研究

答案:A

91. 男孩, 15 岁。因双侧颞下颌关节强直已行颞下颌关节假关节成形术, 开始张口训练的时间应是术后

A. 1 天

B. 2~3 天

C. 7~10 天

D. 2 周

E. 1 个月

答案:C

92. 单侧颞下颌关节强直导致面部两侧不对称, 具体表现为

A. 颞部偏向患侧, 患侧下颌支正常, 健侧面部丰满

B. 颞部偏向健侧, 患侧下颌支正常, 健侧面部丰满

C. 颞部偏向健侧, 患侧下颌支正常, 患侧面部丰满

D. 颞部偏向患侧, 患侧下颌支短小, 患侧面部丰满

E. 颞部偏向患侧, 患侧下颌支短小, 健侧面部丰满

答案:D

93. 口腔保健咨询时, 对于第一恒磨牙窝沟封闭的适宜时间为:

A. 6~7 岁

B. 6~9 岁

C. 7~8 岁

D. 7~9 岁

E. 8~9 岁

答案:A

94. 最常见的颞下颌关节脱位类型是

A. 急性上方脱位

B. 急性前方脱位

C. 陈旧性侧方脱位

D. 复发性后方脱位

E. 陈旧性前方脱位

答案:B

95. 在深龋中, 细菌可以通过暴露的牙本质小管感染牙髓, 下列说法正确的是

A. 牙本质厚度 < 2mm, 牙髓内可找到细菌

B. 牙本质厚度 < 1.1mm, 牙髓内可找到细菌

C. 牙本质厚度 < 0.5mm, 牙髓内可找到细菌

D. 牙本质厚度 < 0.2mm, 牙髓内可找到细菌

E. 牙本质厚度 < 1.5mm, 牙髓内可找到细菌

答案:D

96. 典型的三叉神经痛疼痛的性质是

A. 持续性隐痛

B. 阵发性剧痛

C. 间歇性隐痛

D. 持续性剧痛

E. 持续性刀割样疼痛

答案:B

97. 确定面瘫病人是否有膝状神经节受损, 应做

A. 定分支检查

B. 听觉检查

C. 味觉检查

D. 泪液检查

E. 唾液检查

答案:D

98. 面瘫的贝尔征是指

- A.用力紧闭眼睑,则眼球转向外上方
- B.患侧口角下垂,健侧向上歪斜
- C.不能鼓腮、吹气
- D.睑裂过大,闭合不全
- E.下结膜腔内常有泪液积滞

答案:A

99.隐性唇裂是指

- A.红唇完全裂开
- B.红唇及白唇完全裂开,但鼻底未裂
- C.红唇、白唇及鼻底完全裂开
- D.红唇、白唇、鼻底、牙槽突及腭部全

部裂开

E.红唇、白唇皮肤、黏膜虽完整,但肌肉层连接性中断

答案:E

100.龋损形成的过程如下。除外

- A.硬组织脱矿、崩解
- B.色素沉着
- C.牙釉质的再矿化
- D.修复性牙本质形成
- E.腐坏牙本质再矿化

答案:E

