

妇科护理学

| 题号 | 预测题干 | 预测答案 | 星级 |
|-----|---------------------|---|-----|
| 妇科 | 1 绝经后阴道流血 | 子宫内膜癌 | ☆☆☆ |
| | 2 接触性出血 | 宫颈癌 | ☆☆☆ |
| 护理学 | 3 (妊娠期) 高血压基本病理生理改变 | 全身小动脉痉挛 | ☆☆☆ |
| | 4 不同类型流产表现及处理 | 主要看宫口有没有闭、妊娠产物是否已经完全排出 | ☆☆☆ |
| | 5 产后出血最常见的原因 | 子宫收缩乏力(最常见)、胎盘胎膜残留、软产道损伤、凝血功能障碍 | ☆☆☆ |
| | 6 女性外生殖器 | 阴蒂、阴阜、小阴唇、大阴唇、阴道前庭 | ☆☆☆ |
| | 7 女性青春期开始的标志 | 月经初潮 | ☆☆☆ |
| | 8 胎儿脐静脉及脐动脉 | 胎儿脐静脉 1 条及脐动脉 2 条 | ☆☆☆ |
| | 9 妊娠最早的临床表现 | 停经 | ☆☆☆ |
| | 10 孕妇自我监测胎儿宫内情况方法 | 胎动计数 | ☆☆☆ |
| | 11 产前检查 | 妊娠 6~13+6 周、14~19+6 周、20~23+6 周、24~27+6 周、28~31+6 周、32~36+6 周各一次, 37~41 周则每周检查 1 次 | ☆☆☆ |
| | 12 预产期推算 | 末次月经第 1 日起, 月份减 3 或加 9, 日期加 7. 如为阴历, 月份减 3 或加 9, 但日期加 15 | ☆☆☆ |
| | 13 临产后主要产力 | 子宫收缩力 | ☆☆☆ |
| | 14 产程分期 | 第一产程(宫颈扩张期)从规律宫缩到宫口开全, 初产妇需 11~12 小时, 经产妇需 6~8h; 第二产程(胎儿娩出期)从宫颈口开全到胎儿娩出, 初产妇需 1~2 小时, 经产妇需几分钟至 1 小时; 第三产程(胎盘娩出期)从胎儿娩出到胎盘娩出, 需 5~15 分钟, 一般不超过 30 分钟。 | ☆☆☆ |

| | | | |
|----|--------------------|--|-----|
| 15 | 新生儿娩出后处理 | 首先清理呼吸道，防止窒息 | ☆☆☆ |
| 16 | 新生儿 Apgar 评分五项依据时 | 心率、呼吸、肌张力、皮肤颜色、喉反射 | ☆☆☆ |
| 17 | 乳汁变化 | 初乳指产后 7 天乳汁，浑浊淡黄色液体，含丰富蛋白质；产后 7 天，乳房开始分泌过渡乳，蛋白质含量逐渐减少；产后 14 天以后乳房开始分泌成熟乳，呈白色 | ☆☆ |
| 18 | 新生儿为什么发生溢奶？ | 新生儿胃部呈水平状，且贲门括约肌发育不全，新生儿在喂奶后常出现溢奶现象 | ☆☆☆ |
| 19 | 目前治疗中、重度妊高征的首选解痉药物 | 硫酸镁 | ☆☆☆ |
| 20 | 前置胎盘主要临床特点 | 无诱因、无痛性反复阴道流血 | ☆☆☆ |
| 21 | 诊断前置胎盘最可靠而安全的方法是 | B 超检查 | ☆☆☆ |
| 22 | 处理胎盘早剥原则 | 纠正休克、及时终止妊娠 | ☆☆☆ |
| 23 | 患心脏病孕妇最危险的时期 | 妊娠 32~34 周、分娩期及产后最初 3 天内是患有心脏病孕妇最危险的时期 | ☆☆☆ |
| 24 | 不协调性子宫收缩乏力处理原则 | 恢复子宫收缩的协调性，酌情给镇静剂，禁用缩宫素 | ☆☆☆ |
| 25 | 滴虫性阴道炎分泌物表现 | 稀薄泡沫状白带增多及外阴瘙痒 | ☆☆☆ |
| 26 | 外阴阴道假丝酵母菌性阴道炎分泌物表现 | 豆渣样，黏膜红肿 | ☆☆☆ |
| 27 | 宫颈炎治疗原则 | 急性宫颈炎抗生素治疗，同时禁止性生活；慢性宫颈炎治疗以物理治疗为主 | ☆☆☆ |
| 28 | 尖锐湿疣致病菌 | 人乳头瘤病毒感染引起性传播疾病 | ☆☆ |
| 29 | 确诊功血主要检查方法 | 诊断性刮宫 | ☆☆☆ |
| 30 | 确定有无排卵最简单方法 | 基础体温测定 | ☆☆☆ |
| 31 | 侵蚀性葡萄胎治疗原则 | 主要以化疗为主，手术和放疗为辅 | ☆☆☆ |
| 32 | 确诊宫颈癌最可靠方法 | 宫颈和宫颈管活组织检查 | ☆☆☆ |
| 33 | 筛查宫颈癌常用方法 | 宫颈脱落细胞学检查 | ☆☆☆ |
| 34 | 子宫内膜异位症典型症状 | 继发性渐进性痛经 | ☆☆☆ |
| 35 | 良性卵巢肿瘤最常见的并发症 | 蒂扭转 | ☆☆☆ |
| 36 | 子宫脱垂最主要发病因素 | 分娩损伤 | ☆☆☆ |
| 37 | 避孕药物副作用 | 类早孕反应、不规则阴道流血、月经过少或停经、色素沉着、体重增加 | ☆☆ |
| 38 | 宫内节育器放置时间 | 月经干净后 3~7 天；产后 3 个月，剖宫产术后半年；人流术后 | ☆☆ |
| 39 | 晚期产后出血原因 | 胎盘、胎膜残留是晚期产后出血最常见原因 | ☆☆☆ |
| 40 | 糖尿病孕妇治疗 | 不宜口服糖尿病、胰岛素是主要治疗药物 | ☆☆ |