

## 2021《药学综合知识与技能》真题（网友回忆版）

### 一、最佳选择题

1.为配制有效氯浓度为 500mg/L 的消毒剂 10L,需要次氯酸钠溶液（有效氯浓度为 6.0%）和纯化水的量分别是（B）

- A.83mL 和 9917mL
- B.830mL 和 9170mL
- C.120mL 和 9880mL
- D.150mL 和 9850mL
- E.500mL 和 9500mL

2.药学信息按照其来源通常分为三级。属于三级信息资源的是（C）

- A.期刊发表的病例报告
- B.期刊发表的试验研究结果
- C.临床实践指南
- D.文摘数据库
- E.全文数据库

3.药师审核麻醉药品处方时，应逐项审核。不属于规范性审核内容的是（A）

- A.处方医师是否有麻醉药品处方权
- B.处方用量是否严格执行国家有关规定
- C.是否有病历记录
- D.是否写明临床诊断
- E.处方字迹是否清晰

4.关于药品贮存要求的说法，正确的是（A）

- A.常温（室温），指 10℃~30℃
- B.阴凉处，指不超过 25℃
- C.避光，指用不透光的容器包装
- D.遮光，指避免日光直射
- E.凉暗处，指避光且 2℃~10℃

5.医师处方：头孢呋辛酯片（规格 250mg/片），500mg bid po。为方便患者理解，药师宜将用法标示为（C）

- A.每日 2 次，每次 250mg,口服
- B.每日 1~2 次，每次 1 片
- C.每日 2 次，每次 2 片，口服
- D.必要时，可餐后服用 2 片
- E.必要时服用，每日剂量不超过 2 片

6.关于滴眼剂使用的说法，错误的是（E）

- A.使用前需清洁双手
- B.将药液滴入下眼袋内，每次 1-2 滴
- C.滴眼后轻轻闭眼 1-2 分钟
- D.如同时使用两种眼药水，宜间隔 10 分钟
- E.两眼同时患病时，先滴病情重的眼，后滴病情轻的眼

7.患者，男，52 岁，支气管哮喘病史 10 年。因间断喘息发作，长期自行服用泼尼松片 20mgqd 该患者可能出现的不良反应中，不包括的是（A）

- A.低血压

- B.骨质疏松
- C.消化性溃疡
- D.血糖升高
- E.感染

8.患者,女,31岁,1个月前顺产一健康男婴。近2周出现心境低落、乏力纳差、失眠焦虑,有自杀倾向,无法哺乳。诊断为产后抑郁症,给予氟西汀片 20mg qd。关于该患者用药教育的说法,错误的是(D)

- A.应足量和足疗程用药,疗效不佳可考虑换药
- B.向患者解释“剂量滴定原则”,提示其用药剂量可能需要逐渐增加
- C.氟西汀应于每日早餐后服用
- D.为尽快恢复哺乳,患者应在症状改善1个月后逐渐减量直至停药
- E.氟西汀可通过乳汁分泌,服药期间建议暂停哺乳

9.患者,男,45岁,因消化不良(上腹饱胀,餐后明显)来药店咨询。下列说法错误的是(C)

- A.应除外器质性疾病
- B.可用助消化药对症治疗
- C.Hp感染是引起消化不良的常见原因
- D.进餐时不要摄入过多的液体
- E.低脂饮食,同时避免摄入过多的膳食纤维

10.患者,女,28岁,停经40天,妊娠试验结果阳性,平时月经周期32天。20天前因泌尿系感染服用左氧氟沙星片3天,患者担心用药对胎儿有影响,前来咨询关于药物对胎儿影响的说法,正确的是(B)

- A.此阶段是泌尿生殖器官发育期,其结果可能为胎儿泌尿殖器官畸形
- B.此阶段胚胎细胞尚未分化,其结果可能为死胎流产或存活发育成正常胎儿
- C.此阶段是心脏发育期,其结果可能为胎儿心脏畸形
- D.此阶段是骨骼、肌肉发育期,其结果可能为胎儿骨骼发育异常
- E.此阶段是牙齿、中枢神经系统发育期,其结果可能为胎儿唇腭裂

11.患者,女,65岁,因乳腺癌接受第二周期化疗。禁用的止吐药物是(A)

- A.甲氧氯普胺
- B.昂丹司琼
- C.地塞米松
- D.苯海拉明
- E.阿瑞匹坦

12.患者,男,75岁,患高血压、冠心病、高脂血症,服用阿托伐他汀钙、阿司匹林、美托洛尔、赖诺普利、曲美他嗪。近日患者无明显诱因出现肌肉疼痛,可能引起该症状的药物是(C)

- A.阿司匹林
- B.美托洛尔
- C.阿托伐他汀钙
- D.赖诺普利
- E.曲美他嗪

13.患者,男,28岁,因鼻塞、鼻痒、打喷嚏、流涕就影,诊断为过敏性鼻炎。该患者从事塔吊操作工作,不宜使用的药物是(C)

- A.肥大细胞膜稳定剂
- B.鼻用减充血剂

C.第一代口服抗组胺药

D.白三烯受体阻断剂

E.鼻用抗组胺药

14.下列组合中，属于联合化疗的是（A）

A.CHOP 方案（环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+泼尼松）

B.MTX 方案（甲氨蝶呤小剂量鞘内注射+甲氨蝶呤大剂量静脉输注）

C.CTX+美司钠（环磷酰胺+美司钠）

D.VEGF 抑制剂+ALK 抑制剂（贝伐珠单抗+奥希替尼）

E. EGFR 抑制剂+PD-1 抑制剂（曲妥珠单抗+帕博利珠单抗）

15.患者，男，59岁，诊断为2型糖尿病，因口服降糖药疗效欠佳，给予预混胰岛素30R注射液。关于该患者用药教育的说法，错误的是（A）

A.应警惕发生低血糖，提醒患者随身携带木糖醇糖果

B.未开启的胰岛素制剂应冷藏保存，冷冻后不可再使用

C.胰岛素笔芯启用后不宜冷藏保存

D.使用前应缓慢摇匀，确保给药剂量准确

E.注射时应变换部位，两次注射点要间隔2cm以上

16.关于儿童药动学和药效学特点的说法，错误的是（A）

A.和成人相比，婴儿胃液pH低，对酸不稳定的药物易被破坏

B.儿童内分泌系统不够稳定，长期使用糖皮质激素易导致发育迟缓

C.婴幼儿血浆白蛋白与药物的结合能力低于成人，血中游离药物浓度较高

D.儿童血-脑屏障不完善，多种药物均能通过，有可能引发不良反应

E.儿童水、电解质调节及平衡功能较差，不宜轻易使用泻下药

17.患者，女，27岁，外阴瘙痒5天，妇科检查见阴道分泌物呈豆腐渣样，擦除后露出红肿黏膜面，诊断为阴道炎。宜选用的治疗方案是（C）

A.局部用克林霉素软膏

B.局部用尼尔雌醇片

C.局部用克霉唑栓

D.局部用甲硝唑阴道片

E.口服莫西沙星片

18.患者，女，32岁，诊断为缺铁性贫血，口服硫酸亚铁治疗。药师对该患者进行用药教育时，告知其同用可促进铁剂吸收的是（C）

A.牛奶

B.咖啡

C.肉类

D.钙剂

E.茶水

19.经皮肤和黏膜吸收中毒的救治措施，错误的是（C）

A.溶于水的毒物可用大量温水清洗被污染部位

B.温水清洗皮肤时，特别注意清除毛发中的毒物

C.对由伤口进入局部的药物中毒，严禁用止血带结扎

D.眼部被毒物污染时，应立即用清水冲洗，并滴入相应的中和剂

E.不溶于水的毒物，可用适当溶剂清洗

20.影响药物治疗有效性的因素不包括（B）

A.给药途径

- B.药品价格
- C.药物相互作用
- D.患者的生理状态
- E.给药时间

21.患者，女，35岁，近日去植物园游玩后出现双眼结膜充血、瘙痒伴流泪，无分泌物，诊断为过敏性结膜炎。宜选用的药物是（B）

- A.红霉素眼膏
- B.色甘酸钠滴眼液
- C.酞丁安滴眼液
- D.阿昔洛韦滴眼液
- E.左氧氟沙星滴眼液

22.关于干扰素 $\alpha$ 治疗病毒性乙型肝炎的说法，错误的是(D)

- A.用药1周内多数患者会出现流感样症状
- B.需要监测血常规
- C.可引起甲状腺功能异常
- D.若患者出现明显流感样症状，应立即停药
- E.用药期间若出现神经精神症状，应及时就诊

23.患者，女，58岁，房颤多年，既往服用华法林，因INR值波动大，反复出现牙出血后停用。医师建议恢复口服抗凝治疗，但患者拒绝再用华法林。宜选用的药物是（E）

- A.替格瑞洛
- B.氯吡格雷
- C.西洛他唑
- D.双嘧达莫
- E.达比加群酯

24.关于维生素D缺乏的临床表现及治疗的说法错误的是(E)

- A.孕妇维生素D缺乏容易出现胎儿骨及免疫功能发育障碍
- B.婴幼儿维生素D缺乏容易出现“枕秃”
- C.小儿维生素D缺乏容易出现鸡胸、漏斗胸、O形或X形腿
- D.建议6个月以上婴幼儿适当增加户外活动，多晒太阳
- E.维生素D缺乏者在补充维生素D的同时，无需额外补充钙剂

25.患者，男，48岁，诊断为2型糖尿病。经生活方式干预，血糖控制仍不佳，拟开始单药治疗，宜选用的药物是（B）

- A.门冬胰岛素
- B.二甲双胍
- C.甘精胰岛素
- D.阿卡波糖
- E.格列美脲

26.患者，男，62岁，4年前出现运动迟缓，诊断为帕金森病。日前症状逐渐加重并伴有轻度认知障碍。宜选用的药物是（E）

- A.普拉克索
- B.司来吉兰
- C.金刚烷胺
- D.恩他卡朋
- E.苄丝肼-左旋多巴



27.患者，男，48岁，平日体健，否认药物过敏史。3天前受凉后出现发热、咳嗽、咳少量黄痰，体温最高39.3℃，血常规：WBC 16.8×10<sup>9</sup>/L，N%83.09%，CRP80mg/L，肝肾功能

正常。诊断为肺炎，给予经验性抗感染治疗，宜选用的药物是（E）

- A.复方磺胺甲噁唑
- B.呋喃妥因
- C.甲硝唑
- D.阿奇霉素
- E.阿莫西林

28.患者，男，75岁，1个月前诊断为阿尔茨海默病，口服多奈哌齐治疗。关于该患者教育的说法，错误的是（A）

- A.出现兴奋症状时，应尽早使用抗精神病药物
- B.长期使用多奈哌齐需评估对患者体重的影响
- C.在给予患者必要看护的前提下，鼓励其尽量独立完成日常活动
- D.多奈哌齐仅能改善症状，并不能改变疾病的进程和结局
- E.多奈哌齐用药过程中，注意监测心率

29.患者，女，54岁，绝经1年，因严重潮热、盗汗、失眠，生活受到明显影响就诊。患者想改善上述症状，但不希望有月经。宜选用的治疗方案是（B）

- A.雌、孕激素序贯治疗
- B.雌、孕激素连续联合治疗
- C.单纯雌激素治疗
- D.单纯孕激素周期治疗
- E.阴道局部用雌激素治疗

30.患者，女，58岁，高血压病史3年，服用氨氯地平控制血压。近1月来间断上腹痛，伴反酸，诊断为胃溃疡，Hp（+），给予雷贝拉唑、克拉霉素、阿莫西林、枸橼酸铋钾进行Hp根除治疗。服药后患者自述舌苔发黑，口中有氨味，可能引起这种现象的药物是（C）

- A.雷贝拉唑
- B.克拉霉素
- C.枸橼酸铋钾
- D.阿莫西林
- E.氨氯地平

31.关于缺血性脑血管病防治的说法，错误的是（D）

- A.二级预防指疾病发生后预防复发的措施
- B.通过控制血压、血脂、血糖，能有效降低复发风险
- C.积极治疗伴发疾病，如冠心病、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征等
- D.对短暂性脑缺血发作（TIA）患者应给予抗凝药物进行一级预防
- E.缺血性脑卒中发病后3小时内溶栓，可避免或减轻脑卒中后遗症

32.妊娠5个月后用药物，可导致日后婴儿牙齿黄染、牙釉质发育不全的药物是（D）

- A.阿莫西林
- B.呋喃妥因
- C.甲硝唑
- D.四环素
- E.磺胺甲噁唑

33.患者，女，28岁，因痤疮就诊，给予异维A酸胶囊。关于该患者用药教育的说法，错误的是（B）

- A.治疗期间及停药后3个月内应做好避孕措施  
B.治疗期间若发生皮肤黏膜干燥，应减量或停药  
C.不良反应常见，但停药后绝大多数可恢复  
D.治疗最初2个月可能导致肝酶异常，必要时检查肝功能  
E.部分患者用药2~4周时出现一过性皮疹加重现象
- 34.患者，女，68岁，因尿失禁就诊。无尿频、尿急、发热等症状，血常规检查未见异常，尿培养检出大肠埃希菌，诊断为轻度压力性尿失禁。首选的治疗方案是（E）  
A.选用头孢曲松抗感染治疗  
B.择期行阴道前壁修补术  
C.选用阿米卡星抗感染治疗  
D.选用左氧氟沙星抗感染治疗  
E.进行盆底功能康复训练
- 35.患者，男，52岁，2型糖尿病4年余，长期口服格列吡嗪。近期血糖控制不佳，考虑加用其他降糖药物，不宜联合使用的药物是（B）  
A.西格列汀  
B.瑞格列奈  
C.二甲双胍  
D.阿卡波糖  
E.吡格列酮
- 36.患者，男，52岁，间断胸骨后灼烧痛伴餐后上腹胀、嗝气2个月。诊断为重度反流性食管炎，给予泮托拉唑肠溶片20mg qd。关于该患者用药教育的说法，错误的是（E）  
A.泮托拉唑的最佳服药时间是早餐前0.5~1小时  
B.泮托拉唑肠溶片不可咀嚼或压碎后服用  
C.抑酸效果不佳时可先尝试增加至双倍剂量，仍无效则换其他PPI  
D.发生夜间酸突破时，可在睡前加用H<sub>2</sub>受体阻断剂  
E.症状改善2周后可停药
- 37.患者，男，43岁，诊断为骨性关节炎，给予塞来昔布胶囊200mg bid。关于塞来昔布的说法，错误的是（A）  
A.塞来昔布可抑制血小板活性  
B.长期使用塞来昔布可增加心肌梗死风险  
C.塞来昔布与华法林合用可增加出血风险  
D.塞来昔布引起消化道溃疡的风险低  
E.重度肝功能不全者应避免使用塞来昔布
- 38.患者，女，83岁，左心室肥大、慢性心力衰竭病史5年，NYHA心功能Ⅲ级，肝肾功能正常。既往诊断为2型糖尿病，应避免使用的降糖药物是（E）  
A.格列齐特  
B.格列齐特  
C.瑞格列奈  
D.利拉鲁肽  
E.吡格列酮
- 39.患者，女，52岁，Ⅱ度房室传导阻滞多年，近期发现血压升高，非同日3次血压均高于160/90mmHg，不宜选用的抗高血压药物是（C）  
A.硝苯地平  
B.氨氯地平

- C.美托洛尔
- D.依那普利
- E.厄贝沙坦

40.患者，男，75岁，肺癌晚期，骨转移，口服吗啡控释片止痛，近日因疼痛加剧，增加吗啡剂量后出现便秘。不宜选用的药物是（A）

- A.比沙可啶肠溶片
- B.多潘立酮片
- C.开塞露
- D.聚乙二醇 4000 散
- E.乳果糖口服溶液

## 二、配伍选择题

（41-42）

- A.  $\alpha$  受体阻断剂
- B. 噻嗪类利尿剂
- C. 血管紧张素转换酶抑制剂
- D. 钙通道阻滞剂
- E.  $\beta$  受体阻断剂

41.患者，女，55岁，高血压病史10年，近日体检发现血钾偏高，不宜选用的降压药物是（C）

42.患者，男，50岁，BMI 30.0kg/m，有痛风病史，体检查血压 175/90mmHg，不宜选用的降压药物是（B）

（43-45）

- A. 0.3g tid
- B. 20mg tid
- C. 0.5g qd
- D. 0.4mg qd
- E. 5mg tid

43.患者，女，31岁，自述乏力、纳差，诊断为缺铁性贫血，给予硫酸亚铁治疗，推荐的用法用量是（A）

44.患者，男，64岁，诊断为巨幼细胞贫血，给予叶酸治疗。推荐的用法用量是（E）

45.患者，女，35岁，备孕补充叶酸，推荐的用法用量是(D)

（46-47）

- A. HDL-C
- B. HbA1c
- C. TG
- D. LDL-C
- E. TC

46.能客观地反映过去3个月内平均血糖水平的指标是（B）

47.在一定范围内，其水平与动脉粥样硬化和冠心病的发生、发展呈负相关的指标是（A）

（48-49）

- A.阿托伐他汀
- B.甲巯咪唑
- C.丙硫氧嘧啶
- D.氢氯噻嗪
- E.碳酸氢钠

48.患者,男,54岁,因痛风服用非布司他,为增强降尿酸效果,可同时使用的药物是(E)

49.患者,女,65岁,体检结果示:低密度脂蛋白胆固醇 5.7mmol/L,颈动脉粥样硬化斑块,宜选用的药物是(A)

(50-51)

- A.酮康唑乳膏
- B.甲硝唑栓
- C.雌三醇乳膏
- D.硝酸咪康唑栓
- E.氟康唑胶囊

50.患者,男,35岁,近日出现足趾间皮肤瘙痒、水泡样皮疹,宜选用的药物是(A)

51.患者,女,28岁,已婚未育,因阴道分泌物增多伴瘙痒5天就诊。妇科检查见阴道内大量黄绿色泡沫样分泌物,有臭味,分泌物镜检见滴虫。宜选用的药物是(B)

(52-53)

- A.利巴韦林
- B.依非韦伦
- C.阿昔洛韦
- D.拉米夫定
- E.替诺福韦酯

52.治疗病毒性乙型肝炎的一线药物是(E)

53.治疗艾滋病的非核苷类逆转录酶抑制剂是(B)

(54-56)

- A.复方炔诺酮
- B.依那普利
- C.胰岛素
- D.复方磺胺甲噁唑
- E.莫西沙星

54.哺乳期妇女使用,对乳儿安全无害的药物是(C)

55.哺乳期妇女使用,易诱发新生儿胆红素脑病的药物是(D)

56.哺乳期妇女使用,可致男婴乳房增大的药物是(A)

(57-59)

- A.产生气体
- B.溶液变色
- C.微浑浊或沉淀
- D.产生胶状不溶物
- E.药物分解、降解速度加快

57.青霉素钠用5%葡萄糖注射液溶解,可导致(E)

58.头孢曲松钠与乳酸钠林格注射液直接混合可导致(C)

59.两性霉素B用0.9%氯化钠注射液溶解,可导致(C)

(60-62)

- A.重组人促红素



- B.碳酸镧
- C.非诺贝特
- D.氢氧化铝
- E.骨化三醇

60.尿毒症继发甲状旁腺功能亢进，为抑制甲状旁腺激素水平，宜选用的药物（E）

61.长期使用有中毒风险，不推荐用于慢性肾病高磷血症的药物是（D）

62.肾性贫血宜选用的药物是（A）

（63-65）

- A.头孢哌酮
- B.万古霉素
- C.美罗培南
- D.克拉霉素
- E.左氧氟沙星

63.用药期间饮酒可能出现“双硫仑样反应”的药物是（A）

64.静脉滴速过快，易致“红人综合征”的药物是（B）

65.避免与辛伐他汀合用的药物是（D）

（66-68）

- A.瑞格列奈
- B.阿卡波糖
- C.二甲双胍
- D.沙格列汀
- E.胰岛素

66.患者，男，42岁，诊断为2型糖尿病，既往严重便秘，腹胀明显，不宜选用的降糖药物是（B）

67.患者，女，28岁，诊断为妊娠期糖尿病。首选的降糖药物是（E）

68.患者，男，64岁，空腹血糖8.9mmol/L，后2小时血糖14.8mmol/L，eGFR20mL/(min 1.73m<sup>2</sup>)，肝功能正常。诊断为2型糖尿病，慢性肾功能不全。宜选用的口服降糖是（A）

（69-70）

- A.左氧氟沙星
- B.异烟肼
- C.吡嗪酰胺
- D.乙胺丁醇
- E.利福平

69.可引起体液变色的药物是（E）

70.可引起球后视神经炎的药物是（D）

（71-73）

- A.达比加群酯
- B.氯吡格雷
- C.尿激酶

D.依诺肝素钠

E.华法林

71.药效受食物成分影响较大的药物是 (E)

72.深静脉血栓的溶栓治疗,宜选用的药物是 (C)

73.治疗非心源性栓塞性缺血性脑卒中,宜选用的药物是 (B)

(74-76)

A.X 级

B.A 级

C.C 级

D.D 级

E.B 级

74.利巴韦林的妊娠毒性分级是 (A)

75.阿莫西林的妊娠毒性分级是 (E)

76.氨氯地平妊娠毒性分级是 (C)

(77-79)

A.铝碳酸镁咀嚼片

B.多潘立酮片

C.奥美拉唑肠溶胶囊

D.乳果糖口服溶液

E.巴氯芬片

77.有吸附胆汁的作用,可用于治疗胆汁反流的胃食管反流病的药品是 (A)

78.可引起 Q-T 间期轻度延长的药品是 (B)

79.可影响氯吡格雷代谢的药品是 (C)

(80-81))

A.qs.

B.prn

C.hs.

D.St.

E. sos.

80.表示“必要时(长期备用)”的缩写是 (B)

81.表示“必要时(临时备用)”的缩写是(E)

(82-83)

A.餐后半小时服用

B.清晨空腹整片吞服,并保持上身直立至少分钟

C.睡前服用

D.餐前小时嚼碎服用

E.进餐时整片吞服

82.匹维溴铵片治疗胆石症,正确的用药方法是

(E)

83. 吉法酯片治疗消化性溃疡，正确的用药方法是 (A)

(84-85)

- A. 硫酸镁溶液
- B. 淀粉溶液
- C. 植物油
- D. 高锰酸钾溶液 (1: 5000~1: 10000)
- E. 1%肥皂水

84. 中毒解救需灌肠时，宜选用的灌肠液是 (E)

85. 误服碘酊洗胃时，宜选用的洗胃液是 (B)

(86-87)

- A. 孟鲁司特钠片
- B. 沙丁胺醇气雾剂
- C. 氨茶碱缓释片
- D. 布地奈德气雾剂
- E. 异丙托溴铵气雾剂

86. 患者，男，74岁，青光眼病史5年，近期诊断为支气管哮喘。应慎用的药物是 (E)

87. 患者，男，56岁，哮喘病史6年。哮喘急性发作时，为快速缓解症状，首选的药物是 (B)

(88-90)

- A. 双氯芬酸
- B. 美洛昔康
- C. 阿司匹林
- D. 曲马多
- E. 布洛芬

88. 患者，男，67岁，诊断为骨性关节炎，既往有胃溃疡病史。宜选用的药物是 (B)

89. 患者，女，58岁，诊断为骨性关节炎，经洛索洛芬单药治疗疼痛缓解不理想可联合使用的药物是 (D)

90. 患儿，男，4岁，体温 39.1℃，诊断为上呼吸道感染，有引起 Reye's 综合征风险的药物是 (C)

患者，女，34岁，受凉后出现发热、流涕、鼻塞等感冒症状，自行服用对乙酰氨基酚及其他复方感冒药。为尽快改善症状，自行加量并增加给药频次。用药2天后出现厌食、恶心和呕吐症状，诊断为对乙酰氨基酚中毒。

91. 宜选用的中毒解救药物是 (D)

- A. 普萘洛尔
- B. 氟马西尼
- C. 谷胱甘肽
- D. 乙酰半胱氨酸
- E. 二巯丙醇

92. 对乙酰氨基酚有单次给药剂量和每日总剂量的限制，超剂量服用可能损伤的器官是 (E)

- A.骨关节
- B.耳蜗神经
- C.肺
- D.心脏
- E.肝脏

患者，女，65岁，52岁绝经，自诉腰痛半年，加重2月，腰椎影像学检查提示腰2和腰3椎体压缩性骨折，骨密度检查提示重度骨质疏松，既往有高血压、高脂血症和系统性红斑狼疮，长期口服缬沙坦 80mg qd，阿托伐他汀 20mg qn，阿司匹林 100mg qd 和泼尼松 7.5mg qd。1个月前因反流性食管炎加用奥美拉唑 20mg qd。否认不良嗜好，否认食物药物过敏史。

93.与该患者骨质疏松发病相关性较大的药物是(D)

- A.缬沙坦
- B.阿司匹林
- C.阿托伐他汀
- D.泼尼松
- E.奥美拉唑

94.能明显缓解该患者腰痛症状的药物是(B)

- A.戊酸雌二醇
- B.鲑降钙素
- C.阿仑膦酸钠
- D.碳酸钙
- E.维生素 D

95.关于该患者骨质疏松治疗的说法，错误的是(A)

- A.推荐每日补充维生素 D400IU
- B.每日钙推荐摄入量为 1000mg-1200mg
- C.因有反流性食管炎，可选用双膦酸盐注射剂型
- D.双膦酸盐类药物可引起一过性“流感样”症状
- E.应用双膦酸盐类药物前，需评估肾功能

患者，男，58岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：96.患者既往使用单硝酸异山梨酯缓释片，

就诊医师开具单硝酸异山梨酯片。关于该患者用药教育的说法，错误的是(B)

- A.规律使用硝酸酯类药物有助于预防心绞痛
- B.单硝酸异山梨酯片每天早晚各服1片(20mg)，应间隔12小时
- C.使用西地那非24小时内不可应用单硝酸异山梨酯片，避免引起严重低血压
- D.单硝酸异山梨酯缓释片与普通片均不适于心绞痛急性发作的治疗
- E.硝酸酯类药物可引起心率反射性加快

97.关于该患者使用阿司匹林的说法，正确的是(C)

- A.阿司匹林属于冠心病一级预防，长期使用方可获益
- B.阿司匹林用药期间，需定期监测 INR



- C.用药期间，应关注腹痛、柏油样便或呕血等消化道出血症状
- D.阿司匹林肠溶片在进餐时服用，以减轻对胃肠道的刺激性
- E.阿司匹林不耐受时，可换用替格瑞洛进行长期抗血小板治疗

98.关于该患者药物治疗方案的说法，错误的是(A)

- A.美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用
- B.阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药
- C.如大便次数规律（如每日次），聚乙二醇4000散可按需使用
- D.同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用
- E.麝香保心丸和复方丹参片均属活血剂，选用其中一种即可

患者，男，72岁。体重75kg，1小时前出现右上肢体活动不利，半小时后自行缓解。查体：血压210/90mmHg；检查结果示：糖化血红蛋白9.3%，血肌酐143.2μmol/L。既往有高血压、糖尿病、冠心病病史。诊断为短暂性脑缺血发作。

99.首选的抗血栓药物是(A)

- A.阿司匹林联合氯吡格雷
- B.阿司匹林
- C.阿替普酶
- D.氯吡格雷
- E.依诺肝素

100.关于缺血性脑血管病抗凝治疗的说法，正确的是(D)

- A.合并感染性心内膜炎时，应积极抗凝治疗
- B.短暂性脑缺血发作，应常规抗凝治疗
- C.接受人工机械瓣置换术患者，推荐使用新口服抗凝药
- D.伴发心房纤颤的患者，需要抗凝治疗
- E.合并风湿性二尖瓣病变患者，若无其他危险因素，不推荐抗凝治疗

患者，男，69岁，BMI27.8kg/m<sup>2</sup>，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

101.药师在与患者沟通时，应告知其止痛药对疼痛的治疗属于(D)

- A.姑息治疗
- B.对因治疗
- C.缓和治疗
- D.对症治疗
- E.替代治疗

102.下列药物中，适用于该患者的止痛药是(C)

- A.吗啡控释片
- B.双氯芬酸钠缓释片
- C.颠茄片
- D.加巴喷丁胶囊
- E.卡马西平片

103.如服用所选止痛药，需关注的不良反应是（B）

- A.便秘
- B.肾损害
- C.口干
- D.共济失调
- E.剥脱性皮炎

104.关于该患者教育的说法，错误的是（C）

- A.注意关节保暖
- B.遵医嘱，不得自行增加剂量
- C.疼痛加重时，可将止痛药嚼碎服用
- D.应适当减轻体重
- E.避免关节过度劳累，减少不合理的运动

105.关于解答该患者所咨询问题的说法，正确的是（B）

- A.非那雄胺可增强降压药的降压效果，建议更换降压药
- B.建议睡前服用特拉唑嗪，有助于缓解头晕症状
- C.头晕可能与患者焦虑有关，继续用药会逐渐缓解
- D.非那雄胺可引起直立性低血压，头晕可能此相关
- E.将非那雄胺换成小剂量片剂（1mg）即可缓解头晕

106.关于该患者教育的说法，错误的是（D）

- A.注意药物相互作用，合用其他药物前请咨询医师或药师
- B.日常生活中避免久坐，切勿憋尿
- C.如出现尿路感染症状，应尽早就诊
- D.非那雄胺可快速缓解症状，与特拉唑嗪合用可产生协同作用
- E.症状缓解后，仍需按医嘱用药，不宜自行停药

患者，男，53岁，季节性过敏性鼻炎病史5年，3天前，受凉后出现流涕、鼻塞、咳嗽，咳痰，低热，头痛，无胸闷、气短等其他不适，已在医院发热门诊完成了鼻拭子检查，排除了甲型流感和乙型流感，诊断为普通感冒。

107.为缓解该患者的感冒症状，不宜选用的药物是（B）

- A.含伪麻黄碱的复方抗感冒药
- B.神经氨酸酶抑制剂
- C.鼻用减充血剂
- D.解热镇痛药
- E.祛痰剂

108.关于该患者咳嗽治疗的说法，错误的是

- A.若剧烈干咳伴胸痛，仅伴有少量白痰，可选用中枢性镇咳药
- B.单独使用抗组胺药物，对止咳无效
- C.若痰多而黏稠，应慎用镇咳药
- D.若使用含右美沙芬的药物，需告知服药期间应避免驾驶

E. 尽早使用抗菌药物治疗，能更有效地缓解咳嗽

109. 关于普通感冒患者教育的说法，错误的是(E)

- A. 目前尚无特效的抗病毒药物
- B. 治疗以对症治疗，缓解症状为主
- C. 注意休息，适当补充水分
- D. 首选口服药物，避免盲目输液
- E. 接种流感疫苗可预防普通感冒

110. 患者在花粉季过敏性鼻炎发作，使用鼻用糖皮质激素治疗后，鼻塞症状未缓解，可联合应用的药品是 (E)

- A. 泼尼松片
- B. 氯苯那敏片
- C. 色甘酸钠滴鼻剂
- D. 氯雷他定片
- E. 孟鲁司特钠片

多项选择题

III. 关于晚期癌症患者缓和医疗的说法，正确的有 (ABDE)

- A. 正视生命全过程 (生老病死)，尊重患者和家属的意愿
- B. 全面管理患者不适症状，提高患者生活质量
- C. 尽可能尝试现有治疗方法，对原发病进行积极治疗
- D. 总体原则是“尊重、有益、不伤害和公平”
- E. 提倡跨学科团队 (包括医疗、护理、营养、心理支持、志愿者服务) 提供“全人性化管理”服务

112. 患者，男，70岁，因抑郁症长期服用舍曲林。新诊断为帕金森病，宜选用的药物有 (BCDE)

- A. 司来吉兰
- B. 普拉克索
- C. 金刚烷胺
- D. 吡贝地尔
- E. 恩他卡朋

113. 关于胃食管反流病患者应用含铝抗酸药用教育的说法，正确的有 (ACE)

- A. 长期服用可能会引起低磷血症
- B. 易引起腹泻
- C. 可快速缓解症状，对溃疡愈合几乎无作用
- D. 可增加心血管事件发生风险
- E. 与其他药物合用，通常要间隔 2 小时

114. 咳嗽是机体的一种反射性防御动作，有利于清除呼吸道分泌物或异物，但频繁剧烈的咳嗽会影响患者的工作和生活。关于患者教育的说法，正确的有 (ABCD)

- A.对痰液较多的湿咳，应以祛痰为主
- B.过敏性鼻炎引起的鼻后滴漏所致咳嗽，应使用鼻用糖皮质激素
- C.有长期吸烟史的老年人，出现无明显诱因的刺激性干咳，应先排除肺癌
- D.感冒后的咳嗽常具自限性，通常可自行缓解
- E.ACEI类药物诱发的干咳，应使用右美沙芬

115.患者，女，38岁，因缺铁性贫血口服多糖铁复合物胶囊。关于该患者用药注意事项的说法，正确的有（ABD）

- A.在血红蛋白水平恢复正常后，仍需补充4~6个月铁剂
- B.铁剂可能会引起粪便颜色变黑
- C.服用铁剂期间应限制蛋白质的摄入
- D.多糖铁复合物的耐受性优于硫酸亚铁
- E.多糖铁复合物为无机铁，含铁量高

116.口服复方避孕药的禁忌证有（ABCE）

- A.哺乳期
- B.乳腺癌
- C.急性肝炎
- D.哮喘
- E.深静脉血栓病史

117.患者，女，47岁，因慢性阻塞性肺疾病使用布地奈德福莫特罗粉吸入剂，每天2次，每次1吸。患者用药时，自觉未吸入药物，于是重复操作十余次，之后出现心慌、手抖等不适症状。考虑是操作不当，误吸入过量福莫特罗所致。药师先请患者演示吸入器的使用方法，针对发现的问题给予用药指导，下列说法正确的有（BCD）

- A.在深吸气将药物吸入后，立即恢复正常呼吸
- B.因为药物颗粒非常小，以至于经常感觉不到，可以通过黑布试验证明药物是否被吸入
- C.用药时应有力且深长地吸气，确保药物被充分吸入肺中
- D.为避免口腔念珠菌感染，建议每次用药后用水漱口
- E.装置初始化后，每转动一次，听到“咔哒”声响，即表示单次装药完成，不应连续转动

118.能够降低心力衰竭死亡率和再住院率，改善患者长期预后的药物有（CDE）

- A.地高辛
- B.呋塞米
- C.比索洛尔
- D.依那普利
- E.沙库巴曲缬沙坦

119.患者，男，38岁，发热伴咽痛，体温38.3℃，诊断为急性细菌性扁桃体炎。给予阿莫西林胶囊口服0.59qd，青霉素皮肤过敏试（-）。关于该处方审核的说法，正确的有（ABCD）

- A.已注明过敏试验结果
- B.选用药物与诊断相符
- C.单次给药剂量合理



- 
- D. 给药途径适当
  - E. 给药频次合理

120. 审方时要关注中西药联用的情况，下列药品中含有西药成分的有（ABE）

- A. 鼻炎康片
- B. 珍菊降压片
- C. 防风通圣丸
- D. 蛇胆川贝液
- E. 消渴丸