

2022年 中西医执业 第二单元 核心押题卷

1. 《灵枢·决气》指出“一气化六气”，此“一气”指的是（ ）。

- A. 肾气
- B. 营气
- C. 卫气
- D. 水谷精微之气
- E. 元气

参考答案：D

参考解析：六气源于先天，又赖后天水谷精微不断充养。选项D正确当选。

2. 大青龙汤证中烦躁的机理是（ ）。

- A. 寒邪束于外，阳热郁于内而无从宣泄
- B. 无形邪热内扰心神
- C. 太阳中风，热邪内扰
- D. 浊邪上干，犯扰心神
- E. 少阴阳虚，心神浮越

参考答案：A

参考解析：大青龙汤证属表寒里热，证见脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁。治疗外散风寒，内清郁热。选项A正确当选。

3. 患者喘息咳唾，胸背痛，短气，右脉沉迟，左脉弦急，治宜（ ）。

- A. 栝蒌薤白白酒汤
- B. 栝蒌薤白半夏汤
- C. 枳实薤白桂枝汤
- D. 橘枳姜汤
- E. 薏苡附子散

参考答案：A

参考解析：胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短气，寸口脉沉而迟，关上小紧数，栝蒌薤白白酒汤主之。选项A正确当选。

4. 《温热论》所谓“水主之气不能上荣”中“水主之气”是指（ ）。

- A. 肾气
- B. 肾阴
- C. 肾精
- D. 水气
- E. 津液

参考答案：E

参考解析：水主之气：泛指人体的津液。选项E正确当选。

5. 以利益均衡作为价值判断标准来配置卫生资源，体现的卫生法基本原则是

- A. 患者自主原则
- B. 保护社会健康原则
- C. 预防为主原则
- D. 公平原则
- E. 卫生保护原则

参考答案：D

参考解析：公平原则就是以利益均衡作为价值判断标准来配置卫生资源，协调卫生保健活动，以便每个社会成员普遍能得到卫生保健。

6. 下列哪项不是我国刑法规定的刑罚

- A. 有期徒刑
- B. 撤职
- C. 管制
- D. 罚金
- E. 没收财产

参考答案：B

参考解析：我国刑法规定的刑罚包括主刑和附加刑。主刑有管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。附加刑有罚金、剥夺政治权利、没收财产。撤职属于卫生行政处分的种类。

7. 以不正当手段取得医师执业证书，由发给证书的卫生行政部门给予的行政处罚是

- A. 批评教育
- B. 停业整顿
- C. 吊销执业证书
- D. 降级、降职
- E. 警告、记过

参考答案：C

参考解析：以不正当手段取得医师执业证书的，由发给证书的卫生行政部门吊销执业证书；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人，依法给予行政处分。

8. 由县级以上人民政府报经上一级政府决定可以在传染病流行时采取的紧急措施是

- A. 隔离治疗
- B. 强制隔离
- C. 指定场所进行医学观察
- D. 停工、停业、停课
- E. 实施交通检疫

参考答案：D

参考解析：传染病暴发、流行时，县级以上地方人民政府应当立即组织力量，按照预防、控制预案进行防治，切断传染病的传播途径，必要时，报经上一级人民政府决定，可以采取下列紧急措施并予以公告：①限制或者停止集市、影剧院演出或者其他人群聚集的活动；②停工、停业、停课；③封闭或者封存被传染病病原体污染的公共饮用水源、食品以及相关物品；④控制或者扑杀染疫野生动物、家畜家禽；⑤封闭可能造成传染病扩散的场所。

9. 具有下列何种情形的药品应当按劣药论处

- A. 变质的药品
- B. 被污染的药品
- C. 未标明有效期或者更改有效期的药品
- D. 国务院药品监督管理部门规定禁止使用的药品
- E. 所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的药品

参考答案：C

参考解析：药品成分的含量不符合国家药品标准的为劣药。有下列情形之一的药品按劣药论处：①未标明有效期或者更改有效期的；②不注明或者更改生产批号的；③超过有效期的；④直接接触药品的包装材料和容器未经批准的；⑤擅自添加着色剂、防腐剂、香料、矫味剂及辅料的；⑥其他不符合药品标准规定的。

10. 医疗机构配制制剂，须经所在地哪个部门批准后方可配制

- A. 省级卫生行政部门
- B. 省级药品监督管理部门

- C. 县级卫生行政部门
- D. 地市级药品监督管理部门
- E. 省级工商行政管理部门

参考答案：B

参考解析：医疗机构配制的制剂应当按照规定进行质量检验；合格的，凭医师处方在本单位使用。经国务院药品监督管理部门或者省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准，医疗机构配制的制剂可以在指定的医疗机构之间调剂使用。

11. 被尊称为“万婴之母”的中国近代医家是

- A. 林巧稚
- B. 岳美中
- C. 张孝骞
- D. 王绍棠
- E. 施今墨

参考答案：D

参考解析：林巧稚被尊称为“万婴之母”。选项D正确当选。

12. 下列属于与患者沟通的原则的是

- A. 自律原则
- B. 平等原则
- C. 信任原则
- D. 无伤原则
- E. 和谐原则

参考答案：A

参考解析：与患者沟通的原则：1. 尊重原则；2. 自律原则；3. 科学原则。

13. 正确处理医务人员之间关系的道德原则，不包括

- A. 互相尊重
- B. 互相支持
- C. 互相爱护
- D. 互相监督
- E. 互相学习

参考答案：C

参考解析：正确处理医务人员之间关系的道德原则：1. 互相尊重。2. 互相支持。3. 互相监督。4. 互相学习。选项C正确当选。

14. 下列不符合人类辅助生殖技术道德原则的是

- A. 夫妻双方自愿和知情同意的原则
- B. 维护社会公益的原则
- C. 商品化的原则
- D. 确保后代健康的原则
- E. 互盲和保密的原则

参考答案：C

参考解析：实施人类辅助生殖技术的伦理原则：1. 有利于患者的原则。2. 夫妻双方自愿和知情同意的原则。3. 确保后代健康的原则。4. 维护社会公益的原则。5. 互盲和保密的原则。6. 严防精子、卵子商品化的原则。7. 伦理监督原则。选项C正确当选。

15. 下列关于人体试验中伦理审查与科学审查统一原则的叙述，不正确的是

- A. 保障受试者安全，维护受试者权益

- B. 在伦理审查中要注重对研究内容科学性的审查
- C. 在中医药研究伦理审查中，要在伦理审查中弘扬中医药文化
- D. 正确判定试验结果的客观性
- E. 在中医药研究伦理审查中，要注重对项目落实整体观念、辨证论治的审查

参考答案：D

参考解析：伦理审查与科学审查统一原则：保障受试者安全、维护受试者权益，必须注重对研究内容科学性的审查，强化对研究项目创新点、技术路线、试验设计的审查。在中医药研究伦理审查中，要注重审查项目的临床基础，注重对项目落实整体观念、辨证论治的审查，要在伦理审查中弘扬中医药文化。选项D正确当选。

16. 下列关于《中医药临床研究伦理审查管理规范》(2010)的叙述，错误的是

- A. 该文件对开展中医药临床研究的医疗机构、科研院所、高等院校的伦理委员会建设作出了规定
- B. 涉及人的中医药临床研究伦理审查工作按照本管理规范执行
- C. 该文件对在中药临床研究中尊重受试者权益、保护受试者安全作出了具体要求
- D. 该文件对受试者有直接受益前景的研究，预期受益与风险应当至少与目前可获得的替代治疗的受益与风险相当
- E. 该文件补充了伦理审查的原则、规程、标准和跟踪审查的相关内容

参考答案：E

参考解析：中华人民共和国国家中医药管理局《中医药临床研究伦理审查管理规范》：该文件对开展中医药临床研究的医疗机构、科研院所、高等院校的伦理委员会建设作出了规定，对在中药临床研究中尊重受试者权益、保护受试者安全作出了具体要求。选项E正确当选。

17. 热型呈稽留热的是

- A. 败血症
- B. 结核病
- C. 伤寒
- D. 霍奇金病
- E. 急性肾盂肾炎

参考答案：C

参考解析：稽留热是指体温持续于39~40℃以上，24小时波动范围不超过1℃，达数日或数周，见于肺炎链球菌肺炎、伤寒、斑疹伤寒等的发热极期。败血症见弛张热，结核病见不规则热，霍奇金病见回归热，急性肾盂肾炎见间歇热。选项C正确当选。

18. 下列可引起头痛伴剧烈眩晕的是

- A. 偏头痛
- B. 中暑
- C. 颅内高压症
- D. 小脑肿瘤
- E. 蛛网膜下腔出血

参考答案：D

参考解析：头痛伴随症状：①伴发热：见于脑炎、脑膜炎等感染，以及脑出血、脑外伤等。②伴呕吐：见于脑膜炎、脑炎、脑肿瘤等引起的颅内压增高等。③伴意识障碍：见于脑炎、脑膜炎、脑出血、蛛网膜下腔出血、脑肿瘤、脑外伤、一氧化碳中毒等。④眩晕：见于小脑肿瘤、椎-基底动脉供血不足等。选项D正确当选。

19. 下列各项，属百日咳咳嗽特点的是

- A. 犬吠样

- B. 鸡鸣样吼声
- C. 金属调
- D. 声音嘶哑
- E. 无声

参考答案：B

参考解析：鸡鸣样吼声是百日咳咳嗽的特点。A 多见于会厌、喉头疾患或气管受压，见于小儿，多为急性喉炎。C 见于主动脉瘤、纵隔肿瘤和肺癌压迫气管等。D 见于声带炎、喉结核、喉癌与喉返神经麻痹等。E 见于极度衰弱或声带麻痹。选项 B 正确当选。

20. 急性喉头水肿的主要临床表现是

- A. 体温 38℃ 以上
- B. 心率加快
- C. 烦躁不安
- D. 饮水呛咳
- E. 吸气时出现“三凹征”

参考答案：E

参考解析：吸气性呼吸困难表现为胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙在吸气时明显凹陷，称为“三凹征”，常伴有频繁干咳及高调的吸气性喘鸣音。见于急性喉炎、喉水肿、喉痉挛、白喉、喉癌、气管异物、支气管肿瘤或气管受压等。选项 E 正确当选。

21. 阻塞性黄疸的主要特点是

- A. 血中非结合胆红素增高
- B. 血中两种胆红素均增高
- C. 血中结合胆红素增高
- D. 尿胆红素阴性
- E. 尿胆原阳性

参考答案：C

参考解析：胆汁淤积性黄疸(阻塞性黄疸)实验室检查特点血清结合胆红素明显增多。尿胆原减少或阴性，尿胆红素阳性。选项 C 正确当选。

22. 不应写入现病史的是

- A. 慢性阻塞性肺疾病患者的历年发作及治疗情况
- B. 现患肺炎宜详细写入其数年前患肺炎情况
- C. 腹泻患者的体重减轻情况
- D. 心梗患者的类似上腹痛发作特点
- E. 慢性肝硬化患者有否出血倾向

参考答案：B

参考解析：B 项数年前患肺炎情况应写入既往史中。选项 B 正确当选。

23. 呼吸有烂苹果味最常见于

- A. 糖尿病酮症酸中毒
- B. 肝性脑病
- C. 尿毒症
- D. 酒精中毒
- E. 有机磷杀虫药中毒

参考答案：A

参考解析：烂苹果味见于糖尿病酮症酸中毒者。氨味见于尿毒症者。腥臭味见于肝性脑病者。浓烈的酒味见于酒后或醉酒者。刺激性蒜味见于有机磷杀虫药中毒者。选项 A 正确当选。

24. 触诊肠管或索条状包块最适用于

- A. 深压触诊法
- B. 浅部滑行触诊法
- C. 深部滑行触诊法
- D. 双手触诊法
- E. 冲击触诊法

参考答案：C

参考解析：深部滑行触诊主要适用于腹腔深部包块和胃肠病变的检查。

25. 长期服用肾上腺糖皮质激素的病人会出现

- A. 二尖瓣面容
- B. 满月面容
- C. 急性病容
- D. 无欲貌
- E. 贫血面容

参考答案：B

参考解析：满月面容：面圆如满月，皮肤发红，常伴痤疮和小须。见于库欣综合征及长期应用肾上腺皮质激素的患者。选项B正确当选。

26. 脑性瘫痪患者常采取的步态是

- A. 醉酒步态
- B. 慌张步态
- C. 剪刀步态
- D. 跨阈步态
- E. 共济失调步态

参考答案：C

参考解析：剪刀步态双下肢肌张力过高，行走时两腿交叉呈剪刀状。见于脑瘫或截瘫患者。

27. 鼻腔堵塞，鼻梁宽平如蛙状，应考虑的疾病是

- A. 鼻骨骨折
- B. 红斑狼疮
- C. 肥大鼻息肉
- D. 鼻骨发育不全
- E. 鼻中隔偏曲

参考答案：C

参考解析：鼻梁部皮肤出现红色斑块，病损处高出皮面且向两侧面颊扩展为蝶形红斑，见于红斑狼疮；鼻尖及鼻翼皮肤发红，并有毛细血管扩张、组织肥厚，见于酒糟鼻；鼻梁塌陷而致鼻外形似马鞍状，称为鞍鼻，见于鼻骨骨折、鼻骨发育不全和先天性梅毒；鼻腔完全堵塞，鼻梁宽平如蛙状，为蛙状鼻，见于肥大鼻息肉患者。选项C正确当选。

28. 关于语颤的描述，下列不正确的是

- A. 发音强、音调低、胸壁薄者语颤强
- B. 左胸上部较右胸上部强
- C. 前胸上部较下部强
- D. 后胸下部较上部强
- E. 男性较女性强

参考答案：B

参考解析：触觉语颤：正常情况下，前胸上部的语颤较下部强；后胸下部较上部强；右上胸

较左上胸强。

29. 检查发现某患者呼吸由浅慢逐渐变深快，然后由深快转为浅慢，随之出现短时暂停，周而复始。其呼吸变化是

- A. 间停呼吸
- B. 叹息样呼吸
- C. 潮式呼吸
- D. 库斯莫尔呼吸
- E. 抽泣样呼吸

参考答案：C

参考解析：潮式呼吸(Cheyne-Stokes呼吸)，特点是呼吸由浅慢逐渐变为深快，由深快逐渐变为浅慢，直至呼吸停止片刻(5~30秒)，再开始上述周期性呼吸，形成如潮水涨落的节律，见于脑炎、脑膜炎、颅内压增高、脑干损伤等。选项C正确当选。

30. 诊断主动脉瓣关闭不全最重要的体征是

- A. 靴形心
- B. 水冲脉
- C. 心尖区第一心音减弱
- D. 心尖部柔和收缩期杂音
- E. 主动脉瓣区舒张期杂音

参考答案：E

参考解析：主动脉瓣关闭不全有心悸、头晕或眩晕、心绞痛及左心衰竭的症状。体征有面色苍白，颈动脉搏动明显，在第二主动脉瓣区听到舒张期叹气样杂音是最重要的体征；主动脉瓣区第一心音减弱；心尖搏动向左下移位；脉压增大，并有周围血管征，如水冲脉、枪击音、毛细血管搏动等。选项E正确当选。

31. 深吸气时脾脏在左肋下4cm但未超过脐水平，临床的脾肿大分度为

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 重度
- D. 正常
- E. 无法确定

参考答案：B

参考解析：解析：脾肿大的分度方法：深吸气时脾脏在肋下不超过3cm者为轻度肿大；超过3cm但在脐水平线以上，为中度肿大；超过脐水平线或前正中线为高度肿大，又称巨脾。中度以上脾肿大时其右缘常可触及脾切迹，这一特征可与左肋下其他包块相区别。

32. 许多疾病均可引起中性粒细胞增多，但除了

- A. 糖尿病酮症酸中毒
- B. 类风湿关节炎
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 肺炎
- E. 急性心肌梗死

参考答案：C

参考解析：系统性红斑狼疮为中性粒细胞减少。

33. 急性肾炎患者尿中常出现的管型是

- A. 透明管型
- B. 蜡样管型

- C. 白细胞管型
- D. 红细胞管型
- E. 脂肪管型

参考答案：D

参考解析：红细胞管型见于急性肾炎、慢性肾炎急性发作、狼疮性肾炎、肾移植术后急性排斥反应等。透明管型偶见于健康人，少量出现见于剧烈运动、高热等，明显增多提示肾实质病变，如肾病综合征、慢性肾炎等。蜡样管型见于慢性肾炎晚期、慢性肾衰竭、肾淀粉样变性。白细胞管型见于肾盂肾炎、间质性肾炎。脂肪管型见于肾病综合征、慢性肾炎急性发作、中毒性肾病。选项D正确当选。

34. 前间壁心肌梗死特征性心电图改变出现的导联是

- A. V1-V3
- B. V1-V5
- C. V3-V2
- D. V3R-V7R
- E. II、III、aVF

参考答案：A

参考解析：前间壁心肌梗死时，V1-V3导联出现异常Q波或QS波。B为广泛前壁心肌梗死，C为前壁心肌梗死，D为右室心肌梗死，E为下壁心肌梗死。选项A正确当选。

35. 下列关于心电图价值的描述，错误的是

- A. 能反映心功能
- B. 能确诊心律失常
- C. 诊断心肌梗死
- D. 辅助诊断房室肥大
- E. 辅助诊断电解质紊乱

参考答案：A

参考解析：心电图是临床最常用的检查之一，应用广泛。应用范围包括：1. 记录人体正常心脏的电活动。2. 帮助诊断心律失常。3. 帮助诊断心肌缺血、心肌梗死及部位。4. 诊断心脏扩大、肥厚。5. 判断药物或电解质情况对心脏的影响。6. 判断人工心脏起搏状况。心电图无法反应心功能。选项A正确当选。

36. 后前位胸片显示左肺门肿块影约3cm×3cm大小，边缘有分叶征，伴有左肺上叶肺不张。首先考虑的诊断是

- A. 原发型肺结核
- B. 肺炎
- C. 浸润型肺结核
- D. 肺癌
- E. 肺脓肿

参考答案：D

参考解析：X线表现为肺门肿块影是肺癌的直接征象。CT可见分叶状或边缘不规则的肺门肿块，可同时伴有阻塞性肺炎、肺不张。选项D正确当选。

37. 慢性纤维空洞型肺结核X线主要表现为

- A. 可见渗出、增殖、播散、纤维和空洞
- B. 病变多在肺尖和锁骨下区
- C. 可见两肺大小、密度、分布都均匀一致的粟粒状阴影
- D. 两肺散在、多发性钙化

E. 两肺上部多发厚壁的慢性纤维病变及空洞

参考答案：E

参考解析：慢性纤维空洞型肺结核 X 线主要表现为两肺上部多发厚壁的慢性纤维病变及空洞，周围有广泛的纤维索条影及散在的新老病灶，常伴有明显的胸膜肥厚，病变的肺因纤维化而萎缩，出现肺不张征象，上叶萎缩使肺门影向上移位，下肺野血管纹理牵引向上及下肺叶的代偿性肺气肿，使膈肌下降、平坦，肺纹理被拉长呈垂柳状。

38. 下列各项，不引起血清总胆固醇增高的疾病是

- A. 阻塞性黄疸
- B. 肝硬化
- C. 高脂蛋白血症
- D. 肾病综合征
- E. 糖尿病

参考答案：B

参考解析：肝硬化会引起血清总胆固醇减低。选项 B 正确当选。

39. 病原体侵入人体后，局限在机体的某些部位，但机体免疫功能不足以将病原体清除，一旦机体免疫功能低下可发病。此种表现属于

- A. 病原携带状态
- B. 潜伏性感染
- C. 隐性感染
- D. 显性感染
- E. 机会性感染

参考答案：B

参考解析：潜伏性感染是指病原体侵入人体某些部位后，机体免疫系统将病原体局限化，但又不能清除病原体，机体免疫功能下降时潜伏的病原体才引起显性感染。

40. 复发是指

- A. 在染某种病原体基础上再次感染一种病原体
- B. 传染病患者进入恢复期后，已稳定退热一段时间，潜伏于组织内的病原体再度繁殖，使发热等初发症状再度出现
- C. 传染病患者在恢复期，体温未稳定下降至正常，又再度升高
- D. 人体同时感染两种或两种以上的病原体
- E. 传染病痊愈以后再次发病

参考答案：B

参考解析：有些传染病患者进入恢复期后，已稳定退热一段时间，由于潜伏于组织内的病原体再度繁殖至一定程度，使发热等初发症状再度出现，称为复发。

41. 丁型肝炎的潜伏期是

- A. 2~6 周
- B. 4~24 周
- C. 2~26 周
- D. 4~20 周
- E. 2~9 周

参考答案：D

参考解析：不同类型病毒引起的肝炎潜伏期不同，甲肝 2~6 周；乙肝 1~6 个月；丙肝 2 周~6 个月；丁肝 4~20 周；戊肝 2~9 周。选项 D 正确当选。

42. 下列 HBV 标志物，有保护作用的是

- A. HBsAg
- B. 抗-HBs
- C. HBeAg
- D. 抗-HBe
- E. 抗-HBc

参考答案：B

参考解析：抗-HBs 是一种保护性抗体，在急性感染后期，HBsAg 转阴后一段时间开始出现，在6~12个月内逐步上升至高峰，可持续多年，但滴度会逐步下降。约半数病例抗-HBs 在HBsAg 转阴后数月才可检出；少部分病例 HBsAg 转阴后始终不产生抗-HBs。抗-HBs 阳性表示对 HBV 有免疫力，见于乙型肝炎恢复期、既往感染及乙肝疫苗接种后。

43. 抗感染药物奥司他韦的作用机制是

- A. 抑制 RNA 聚合酶
- B. 阻滞离子通道 M2
- C. 抑制血凝素
- D. 抑制神经氨酸酶
- E. 激活神经氨酸酶

参考答案：D

参考解析：奥司他韦是目前最为理想的抗病毒药，发病初期使用，能特异性抑制甲、乙型流感病毒的神经氨酸酶，从而抑制病毒的释放。选项 D 正确当选。

44. 鉴别人禽流感与 SARS 的主要依据是

- A. 流行病学史
- B. 临床表现
- C. 血常规检查
- D. 病原学检查
- E. X 线胸片检查

参考答案：D

参考解析：人禽流感注意与流感、普通感冒、细菌性肺炎、传染性非典型肺炎（SARS）、传染性单核细胞增多症、巨细胞病毒感染、衣原体肺炎、支原体肺炎等疾病进行鉴别诊断，确诊需依据实验室检查，如病原体分离、血清学检查和核酸检测。

45. 一般认为不能传播 AIDS 的是

- A. 性传播
- B. 母婴传播
- C. 器官移植
- D. 输血
- E. 蚊虫叮咬

参考答案：E

参考解析：艾滋病主要传播途径是性接触、血液接触和母婴传播，目前无证据表明可经食物、水、昆虫或生活接触传播。选项 E 正确当选。

46. 下列各项，属于流行性出血热传播途径的是

- A. 性接触
- B. 输血
- C. 垂直传播
- D. 飞沫传播
- E. 日常生活接触

参考答案：C

参考解析：流行性出血热的传播途径：①呼吸道传播。②消化道传播。③接触传播。④垂直传播。⑤虫媒传播。选项C正确当选。

47. 重症患者胸部X线检查可呈“白肺”的疾病是

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 流感
- C. 人感染高致病性禽流感
- D. 霍乱
- E. 泄泻

参考答案：C

参考解析：人感染高致病性禽流感重症患者胸部X线检查可显示单侧或双侧肺炎，严重者呈“白肺”，少数可伴有胸腔积液等。选项C正确当选。

48. 流行性脑脊髓膜炎的主要传染源是

- A. 患者和带菌者
- B. 苍蝇
- C. 鼠类
- D. 污染水源
- E. 病毒

参考答案：A

参考解析：流行性脑脊髓膜炎传染源是带菌者和流脑患者，因脑膜炎球菌在外界生活力极弱，故间接传播极少。选项A正确当选。

49. 流脑最重要的传染源是

- A. 家畜
- B. 带菌者
- C. 现症病人
- D. 恢复期病人
- E. 病程极期病人

参考答案：B

参考解析：患者和带菌者是流脑唯一传染源。患者自潜伏期开始即从粪便中排菌，发病后2~4周排菌量最多，传染性最强。少数患者病后可成为长期带菌者，持续带菌超过3个月者称为慢性带菌者。

50. 典型伤寒出现玫瑰疹的时间是

- A. 第3~5天
- B. 第7~10天
- C. 第14~21天
- D. 第22~28天
- E. 第28天以后

参考答案：B

参考解析：伤寒部分患者于病程第7~14天皮肤出现暗红色斑丘疹，称为玫瑰疹，散在分布于前胸和上腹部，直径2~4mm，压之退色，分批出现，2~4天内消退。选项B正确当选。

51. 肥达反应阳性率最高的时期是

- A. 病前1周
- B. 病后第1周
- C. 病后第2周

D. 病后第 4 周

E. 病后第 8 周

参考答案: D

参考解析: 肥达反应对伤寒有辅助诊断价值, 常在病程第 1 周末出现阳性, 第 3~4 周阳性率可达 90%, 其效价随病程的演变而递增, 第 4~5 周达高峰, 至恢复期应有 4 倍以上升高。

52. 菌痢的确诊依据是

A. 粪培养阳性

B. 粪检有巨噬细胞

C. 粪便免疫学检查抗原阳性

D. 粪便镜检有大量脓细胞

E. 典型菌痢临床症状

参考答案: A

参考解析: 粪便培养出志贺菌是确诊菌痢的主要依据。

53. 导致霍乱特征性剧烈水样腹泻的是

A. 肠毒素

B. 细胞毒素

C. 神经毒素

D. 内毒素

E. 类毒素

参考答案: A

参考解析: 霍乱肠毒素是引起霍乱症状的主要物质。细胞内环磷酸腺苷浓度升高, 刺激肠黏膜隐窝细胞过度分泌水、氯化物及碳酸氢盐, 同时抑制肠绒毛细胞对钠的正常吸收, 以致出现大量水分和电解质聚集在肠腔, 形成剧烈水样腹泻。选项 A 正确当选。

54. 结核病诊断的“金指标”是

A. 痰涂片抗酸染色阳性

B. 痰分离培养检出结核杆菌

C. X 线胸片见斑点状、密度较高、边缘清楚的结节影

D. 结核菌素试验阳性

E. 特异性结合抗原试验阳性

参考答案: B

参考解析: 痰结核杆菌检测是确诊肺结核最特异性的方法。

55. 下列关于结核病临床表现的叙述, 错误的是

A. 全身中毒症状

B. 长期低热、盗汗

C. 咳嗽轻微, 干咳或仅有少量黏液痰

D. 支气管结核患者可闻及局限性哮鸣音, 于吸气末较明显

E. 粟粒性肺结核偶可并发急性呼吸窘迫综合征

参考答案: D

参考解析: 支气管结核患者可闻及局限性哮鸣音, 于呼气或咳嗽末较为明显。选项 D 正确当选。

56. 空洞性肺结核有巨大空洞时的听诊表现是

A. 带金属调的空瓮音

B. 支气管呼吸音

C. 细湿啰音

- D. 呼吸音降低
- E. 局限性哮鸣音

参考答案：A

参考解析：空洞性肺结核病变位置浅表而引流支气管通畅时有支气管呼吸音或伴湿啰音；巨大空洞可闻及带金属调的空瓮音；选项A正确当选。

57. 关于布鲁菌病感染途径的描述，错误的是

- A. 经呼吸道吸入传播
- B. 经消化道食入传播
- C. 经体表皮肤黏膜接触传播
- D. 人与人之间相互传播
- E. 蚊虫叮咬传播

参考答案：D

参考解析：布鲁菌病感染途径：1. 经皮肤及黏膜接触传染。2. 经消化道传染。3. 经呼吸道传染。4. 其他：如苍蝇携带、蜱虫叮咬也可传播本病。人与人之间罕有传播。选项D正确当选。

58. 下列对于布鲁菌病易感人群的说法，正确的是

- A. 老人和儿童易感染
- B. 男性易感染
- C. 身体衰弱或有慢性疾病的人易感染
- D. 人群普遍易感
- E. 女性易感染

参考答案：D

参考解析：布鲁菌病人群普遍易感，病后可获较强免疫力，因此再次感染者很少。疫区居民可因隐性感染而获免疫。

59. 体温正常，有布鲁菌病症状、体征，发病多久可以诊断为慢性感染

- A. 5个月
- B. 1个月
- C. 2周
- D. 6个月
- E. 1年

参考答案：D

参考解析：临床上可分为急性感染和慢性感染，病程6个月以内为急性感染，超过6个月则为慢性感染。选项D正确当选。

60. 下列关于脑膜炎球菌的叙述，错误的是

- A. 又称为脑膜炎奈瑟菌
- B. 为革兰阳性双球菌
- C. 体外能形成自溶酶
- D. 为专性需氧菌
- E. 可在带菌者鼻咽部及患者的血液、脑脊液和皮肤瘀点中发现

参考答案：B

参考解析：脑膜炎奈瑟菌属奈瑟菌属，革兰染色阴性双球菌。

61. 发热患者肥达反应结果为“O”1:80、“H”1:160，正确解释是

- A. 注射伤寒菌苗的反应
- B. 健康人群的基础效价
- C. 其他沙门菌属的交叉免疫反应

D. 对伤寒有辅助诊断意义

E. 无任何意义

参考答案：D

参考解析：正常人血清中可能有低效价凝集抗体存在，肥达反应“O”效价 $\geq 1:80$ ，“H”效价 $\geq 1:160$ ，对伤寒有辅助诊断意义。仅有“H”抗体效价增高，而“O”抗体效价不高，可能是患过伤寒，或接种过伤寒、副伤寒菌苗的回忆反应。

62. 长期发热的患者，诊断伤寒最可靠的依据是

A. 玫瑰疹

B. 脾肿大

C. 肥达反应阳性

D. 血嗜酸粒细胞减少

E. 血培养阳性

参考答案：E

参考解析：细菌培养是确诊伤寒的主要手段。包括血培养，骨髓培养，粪便培养和尿培养。血培养：病程第1周阳性率最高，可达80%，以后阳性率逐渐下降，至第4周常转为阴性，复发或再燃时可又呈阳性。

63. 细菌性痢疾慢性期X线钡灌肠可见的肠道变化是

A. 肠道痉挛，结肠袋消失

B. 肠道痉挛，结肠袋出现

C. 肠腔增宽

D. 肠黏膜变薄

E. 肠道动力增强

参考答案：A

参考解析：慢性菌痢X线钡剂可见肠道痉挛，动力改变，结肠袋消失，肠腔狭窄，肠黏膜增厚，肠动力减弱。选项A正确当选。

64. 下列各项中，被称为“同源三歧”的是

A. 带脉、督脉、带脉

B. 任脉、督脉、冲脉

C. 任脉、冲脉、带脉

D. 任脉、督脉、阴脉

E. 任脉、督脉、阴维脉

参考答案：B

参考解析：督脉、任脉、冲脉皆起于胞中，同出会阴，称为“同源三歧”。选项B正确当选。

65. 既能治疗局部病症，又能治疗本经循行所属远隔部位病症的是

A. 躯干部腧穴

B. 头面部腧穴

C. 十二经脉肘、膝关节以下的腧穴

D. 全身所有腧穴

E. 四肢部腧穴

参考答案：C

参考解析：远治作用指某些腧穴不仅能治局部病证，而且能治本经循行所到达的远隔部位的脏腑、组织、器官的病证。具有远治作用的腧穴，主要是十二经脉在四肢肘、膝关节以下的经穴，即“经脉所过，主治所及”。如合谷穴，不仅能治上肢病证，而且能治颈部和头面部病证等。选项C正确当选。

66. 八脉交会穴中通于阴维脉的腧穴是

- A. 列缺
- B. 内关
- C. 照海
- D. 公孙
- E. 大陵

参考答案：B

参考解析：八脉交会穴中通于阴维脉的腧穴是：内关。

67. 具有主治心胸、胃腑、神志病证功效的经脉是

- A. 足少阴肾经
- B. 足阳明胃经
- C. 手太阴肺经
- D. 足太阴脾经
- E. 手厥阴心包经

参考答案：E

参考解析：手厥阴心包经主治心胸病证、神志病、胃腑病证及经脉循行部位的其他病证。选项E正确当选。

68. 功用为清热解毒、杀虫的灸法是

- A. 瘢痕灸
- B. 隔盐灸
- C. 隔姜灸
- D. 隔附子饼灸
- E. 隔蒜灸

参考答案：E

参考解析：隔蒜灸有清热解毒、杀虫的作用，多用于治疗瘰疬、肺癆及肿疡初起等病证。选项E正确当选。

69. 下述各类药物中不属于佐药范畴的是

- A. 配合君臣药加强治疗作用的药物
- B. 引导诸药至病所的药物
- C. 用以消除或减低君臣药毒性的药物
- D. 用以制约君臣药峻烈之性的药物
- E. 针对次要兼证、兼病或某一症状发挥治疗作用的药物

参考答案：B

参考解析：佐药有三种意义。①佐助药，即配合君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要兼证或针对某一症状发挥治疗作用的药物；②佐制药，即用以消除或减弱君、臣药物的毒性，或能制约君、臣药物峻烈之性的药物；③反佐药，即病重邪甚，可能拒药时，配伍与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物。选项B正确当选。

70. 主治外感风寒湿邪，内有蕴热证的方剂是

- A. 败毒散
- B. 九味羌活汤
- C. 羌活胜湿汤
- D. 柴葛解肌汤
- E. 麻黄杏仁甘草石膏汤

参考答案：B

参考解析：九味羌活汤以羌活为君，散表寒，祛风湿，利关节，止痹痛，为治太阳风寒湿邪在表之要药。以苍术、防风解表除湿为臣。细辛、白芷、川芎“分经论治”头痛，生地、黄芩清泄里热，以上五味俱为佐药。甘草调和为使，诸药配伍，既兼治内外，又属六经，协调表里而成发汗祛湿，兼清里热之剂。选项B正确当选。

71. 胃肠燥热，津液不足，大便硬而小便数者，治宜选用

- A. 济川煎
- B. 增液汤
- C. 五仁丸
- D. 麻子仁丸
- E. 小承气汤

参考答案：D

参考解析：麻子仁丸主治脾约证，症见大便干结，小便频数，脘腹胀痛，舌红苔黄，脉数。选项D正确当选。

72. 四逆散配伍中体现“一升一降，升清降浊”作用的药物是

- A. 柴胡、芍药
- B. 甘草、枳实
- C. 枳实、芍药
- D. 柴胡、甘草
- E. 柴胡、枳实

参考答案：E

参考解析：四逆散中柴胡入肝胆经，升发阳气，疏肝解郁，透邪外出，为君药。佐以枳实理气解郁，泄热破结，与柴胡为伍，一升一降，加强舒畅气机之功，并奏调和肝脾之效。选项E正确当选。

73. 白虎汤中石膏与知母相伍之意为

- A. 清营凉血，滋阴养血
- B. 益胃生津，凉血宽胸
- C. 清热生津，除烦止渴
- D. 清热凉血，养阴润燥
- E. 泻火除湿，滋阴凉血

参考答案：C

参考解析：白虎汤中石膏与知母相须为用，石膏辛甘大寒入肺胃二经，清解透热，除阳明气分之热；知母苦寒质润，助石膏清肺胃之热，并可滋阴润燥，救已伤之阴津。二药合用，清热生津，除烦止渴之功效益强。选项C正确当选。

74. 芍药汤中大黄苦寒沉降，其泻下通腑可导湿热积滞从大便而去，此法为

- A. 塞因塞用
- B. 通因通用
- C. 热因热用
- D. 火郁发之
- E. 逆流挽舟

参考答案：B

参考解析：芍药汤中大黄苦寒沉降，合芩、连则清热燥湿之功著，合归、芍则活血行气之力彰，其泻下通腑可导湿热积滞从大便而去，乃“通因通用”之法。选项B正确当选。

75. 清暑益气汤的功用是

- A. 益气养阴，清透暑热

- B. 清暑除烦，益气和胃
- C. 清暑利湿，益气和胃
- D. 清暑益气，养阴生津
- E. 清暑益气，和胃止呕

参考答案：D

参考解析：清暑益气汤的功用是清暑益气、养阴生津。选项D正确当选。

76. 吴茱萸汤和理中丸二方组成中均含有的药物是

- A. 大枣
- B. 干姜
- C. 白术
- D. 人参
- E. 吴茱萸

参考答案：D

参考解析：吴茱萸汤的组成是吴茱萸、人参、生姜、大枣。理中丸的组成是人参、干姜、炙甘草、白术。选项D正确当选。

77. 参苓白术散中除人参、茯苓、白术、甘草和桔梗外，尚有

- A. 黄芪 当归 陈皮 升麻 柴胡
- B. 莲子肉 薏苡仁 砂仁 白扁豆 山药
- C. 莲子肉 薏苡仁 砂仁 当归 陈皮
- D. 黄芪 当归 砂仁 白扁豆 山药
- E. 黄芪 当归 陈皮 白扁豆 山药

参考答案：B

参考解析：参苓白术散的组成：莲子肉、薏苡仁、砂仁、桔梗、白扁豆、茯苓、人参、炒甘草、白术、山药。选项B正确当选。

78. 下列关于六味地黄丸的说法中错误的是

- A. 重用熟地黄为君
- B. 功用是填精滋阴补肾
- C. 症见腰膝酸软，头晕目眩
- D. 主治肾阴精不足
- E. 药物组成为肾气丸去附子、肉桂

参考答案：E

参考解析：六味地黄丸的功用为填精滋阴补肾；主治肾阴精不足证；症见腰膝酸软，头晕目眩，视物昏花，耳鸣耳聋，盗汗，遗精，消渴，骨蒸潮热，手足心热，舌燥咽痛，牙齿动摇，足跟作痛，以及小儿囟门不合，舌红少苔，脉沉细数。排除B、C、D。方中重用熟地黄为君药，填精益髓，滋补阴精，排除A。药物组成为肾气丸减去桂枝、附子而成。选项E正确当选。

79. 下列方剂具有益气固表，敛阴止汗功效的是

- A. 生脉散
- B. 玉屏风散
- C. 参苓白术散
- D. 桑螵蛸散
- E. 牡蛎散

参考答案：E

参考解析：生脉散益气生津，敛阴止汗；玉屏风散益气固表止汗。此二方止汗之功重在益气。

牡蛎散敛阴止汗，益气固表，止汗之功重在敛阴。参苓白术散益气健脾，渗湿止泻。桑螵蛸散调补心肾，固精止遗。选项 E 正确当选。

80. 朱砂安神丸中配伍黄连的意义是

- A. 泻火解毒
- B. 清热燥湿
- C. 清心泻火
- D. 清热解毒
- E. 清胃泻火

参考答案：C

参考解析：朱砂安神丸中黄连为臣药，苦寒，入心经，清心泻火，以除烦热。选项 C 正确当选。

81. 大便干结如羊屎，形体消瘦，头晕耳鸣，两颧红赤，心烦，潮热盗汗，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数。治疗首选

- A. 增液汤
- B. 润肠丸
- C. 济川煎
- D. 黄芪汤
- E. 温脾汤

参考答案：A

参考解析：增液汤主治：阳明温病，津亏便秘证。大便秘结，口渴，舌干红，脉细数或沉而无力。选项 A 正确当选。

82. 羚角钩藤汤中配伍霜桑叶和滁菊花的用意是

- A. 清肝明目
- B. 疏肝解郁
- C. 清热平肝
- D. 祛风解痉
- E. 息风止痉

参考答案：C

参考解析：羚角钩藤汤方中桑叶、菊花既能清热平肝，又兼疏散风热，使肝热从外疏散，共为臣药。选项 C 正确当选。

83. 下列病症可用乌梅丸治疗的是

- A. 寒热错杂，痰热互结，症见心下疼痛、按之石硬者
- B. 寒热错杂，虚实夹杂，肠道失间，症见久泻久痢者
- C. 寒热错杂，痰湿交阻，症见心下痞满、恶食懒倦者
- D. 寒热错杂，气机阻滞，症见心下满、呕吐泻利者
- E. 胃虚痰阻，气机阻滞，症见心下痞硬、噎气不除者

参考答案：B

参考解析：乌梅丸主治：蛔厥证。脘腹阵痛，烦闷呕吐，时发时止，得食则吐，甚则吐蛔，手足厥冷；或久泻久痢。选项 B 正确当选。

84. 杨某，女，26 岁。患者突然烦躁不安，谵妄，腹泻水样便数次，并高烧，口渴喜饮，大汗不止。舌红少津，苔黄，脉数而虚大无力。应选何方（ ）。

- A. 理中汤
- B. 黄芩汤
- C. 白虎加人参汤

- D. 白虎汤
- E. 以上都不是

参考答案：C

参考解析：白虎加人参汤证以高热不退，汗出不止，烦渴不解，时时恶风或微恶寒，气短神疲，甚则微喘鼻扇，舌苔黄燥，脉浮充或洪大无力，甚则散大。选项C正确当选。

85. 腹泻患者，粪便以黏液和脓血为主，镜检发现大量白细胞。最可能的诊断是

- A. 急性胃肠炎
- B. 阿米巴痢疾
- C. 细菌性痢疾
- D. 急性阑尾炎
- E. 甲状腺功能亢进症

参考答案：C

参考解析：细菌性痢疾的粪便以黏液脓样或脓血便为主。白细胞大量出现见于细菌性痢疾、溃疡性结肠炎。选项C正确当选。

86. 患者，男，68岁。急性心肌梗死，突发昏厥，心电图电活动无可辨认的QRS波群、ST段及T波，频率400~450次/分。其诊断是

- A. 心室扑动
- B. 室性心动过速
- C. 心室颤动
- D. 窦性停搏
- E. 心房纤颤

参考答案：C

参考解析：心室颤动的心电图表现：①QRS-T波群消失，出现形状不一、大小不等。极不规则的心室颤动波。②频率为200~500次/分。选项C正确当选。

87. 患者，女，41岁。肩关节疼痛，抬举困难，夜间痛甚，劳遇累加剧。治疗应首选

- A. 循经取穴
- B. 近取穴与远取穴相结合
- C. 手阳明经穴
- D. 近取穴为主
- E. 手太阳经穴

参考答案：B

参考解析：此患者所患之病为漏肩风，疼痛以肩前外部为主者为手阳明经证，以肩外侧为主者为手少阳经证，以肩后部为主者为手太阳经证，以肩前部为主者为手太阴经证。漏肩风的治疗法通经活络，舒筋止痛。取局部穴位为主，配合循经远端取穴。选项B正确当选。

88. 某女，50岁。头部空痛10年，头痛隐隐，遇劳发作，兼头晕，神疲乏力，面色不华，舌淡，脉细弱。其辨证为

- A. 肾虚头痛
- B. 血虚头痛
- C. 痰浊头痛
- D. 瘀血头痛
- E. 肝阳上亢头痛

参考答案：B

参考解析：内伤头痛主症头痛反复发作，时轻时重，常伴头晕，遇劳或情志刺激而发作、加重。头空痛、昏痛，兼神疲无力，面色不华，舌淡苔白，脉细弱者为血虚头痛。

89. 患者腰痛隐隐，酸多痛少，绵绵不已，腰腿酸软无力，劳则更甚，舌红，脉细。治疗除主穴外，还应选取的配穴是

- A. 后溪、申脉
- B. 肾俞、太溪
- C. 外关、志室
- D. 命门、大椎
- E. 百会、志室

参考答案：B

参考解析：根据患者的临床表现可诊断为肾虚腰痛。治法为通经止痛。取局部阿是穴及足太阳经穴为主。主穴为大肠俞、阿是穴、委中。肾虚腰痛配肾俞、太溪。选项B正确当选。

90. 某女，53岁。2小时前突然发现右半身麻木，口角歪斜，言语不利。现神志清，头晕目眩，苔白腻，脉弦滑。其诊断是

- A. 中经络，风痰阻络证
- B. 中经络，肝阳暴亢证
- C. 中经络，阴虚风动证
- D. 中脏腑，气虚血瘀证
- E. 中脏腑，阴虚风动证

参考答案：A

参考解析：中风中经络，主症：意识清楚，半身不遂，口角歪斜，语言不利。兼肢体麻木或手足拘急，头晕目眩，苔腻，脉弦滑者为风痰阻络证。

91. 某男，63岁，头晕目眩，甚则昏眩欲仆，伴耳鸣，腰膝酸软，遗精，舌淡，脉沉细。除风池、百会外，应加用

- A. 内关、太冲、行间、侠溪、太溪
- B. 内关、太冲、头维、丰隆、中脘
- C. 肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞
- D. 肝俞、肾俞、足三里、太溪、悬钟、三阴交
- E. 头维、血海、膈俞、内关、足三里、太溪

参考答案：D

参考解析：根据题干症状诊断为：眩晕虚证之肾精不足证。主穴：百会 风池 肝俞 肾俞 足三里。配穴：肾精不足配太溪、悬钟、三阴交。

92. 患者，男，45岁。经常不易入睡，寐而易醒，头晕，疲乏，舌淡苔薄，脉细。针刺照海、申脉，宜选用的毫针操作方法是

- A. 毫针刺，泻法，强刺激
- B. 申脉、照海均用泻法
- C. 申脉、照海均用补法
- D. 泻申脉，补照海
- E. 补申脉，泻照海

参考答案：D

参考解析：根据患者的临床表现可诊断为不寐。不寐的治疗操作：毫针平补平泻，照海用补法，申脉用泻法。配穴则虚补实泻，心胆气虚者可配合灸法。选项D正确当选。

93. 某女，26岁。每至经期出现腹痛，痛势绵绵，月经色淡，量少，伴面色苍白，倦怠无力，舌淡，脉细弱。治疗除三阴交、关元、足三里、十七椎外，宜选取

- A. 太冲、血海
- B. 关元、归来



- C. 太冲、气海
- D. 太溪、肾俞
- E. 气海、脾俞

参考答案：E

参考解析：痛经之气血虚弱：小腹隐痛喜按，月经量少色淡，面色无华，舌淡，脉细无力者。配穴为气海、脾俞。选项E正确当选。

94. 患者，男。18岁。感受风寒后出现肩部疼痛，以肩前外部为主，针刺应选

- A. 手少阳经
- B. 手太阳经
- C. 手阳明经
- D. 足少阳经
- E. 足阳明经

参考答案：C

参考解析：漏肩风病位在肩部经筋，与手三阳、手太阴经密切相关。疼痛以肩前外部为主者为手阳明经证，以肩外侧为主者为手少阳经证，以肩后部为主者为手太阳经证，以肩前部为主者为手太阴经证。选项C正确当选。

95. 患者咽喉肿痛，咽干，口渴，便秘，尿黄，舌红，苔黄，脉洪大。除少商、合谷、尺泽、关冲外，应加取

- A. 内庭、关冲
- B. 厉兑、天突
- C. 内庭、鱼际
- D. 列缺、照海
- E. 曲池、鱼际

参考答案：C

参考解析：咽喉肿痛的主症咽喉部红肿疼痛、吞咽不适。兼吞咽困难，高热，口渴喜饮，大便秘结，小便黄赤，舌红，苔黄，脉数有力者为肺胃热盛。肺胃热盛配内庭、鱼际。选项C正确当选。

96. 某女，45岁。突然头晕乏力，泛泛欲吐，昏倒不省人事，牙关紧闭，脉沉弦。治疗宜选用的是

- A. 手厥阴经穴
- B. 手少阴经穴
- C. 足厥阴经穴
- D. 督脉穴
- E. 任脉穴

参考答案：D

参考解析：晕厥的治法：苏厥醒神。以督脉穴为主。选项D正确当选。

配伍选择题

- A. 炙甘草、阿胶、麦门冬、人参、生地黄、桂枝、生姜、麻仁、大枣
- B. 附子、芍药、生姜、白术、茯苓
- C. 干姜、茯苓、人参、附子、甘草
- D. 桂枝、甘草、白术、人参、干姜
- E. 饴糖、桂枝、甘草、芍药、生姜、大枣

97. 小建中汤的方药组成是

参考答案：E

参考解析：小建中汤是桂枝汤倍用芍药加饴糖而成。方中用饴糖甘温补中，配大枣、炙甘草补益中焦，倍用芍药敛阴和营，桂枝配生姜温中散寒，辛散止呕，炙甘草配桂枝辛甘化阳，配芍药酸甘化阴，调和诸药。选项E正确当选。

98. 炙甘草汤的方药组成是（ ）。

参考答案：A

参考解析：炙甘草汤由炙甘草、人参、大枣、生地、阿胶、麦冬、麻仁、桂枝、生姜、清酒十味药组成。选项A正确当选。

配伍选择题

- A. 玉女煎
- B. 梨皮、蔗浆
- C. 金汁
- D. 化斑汤
- E. 知母、阿胶、龟板

99. 叶天士《温热论》中指出，若斑出热不解，因为胃津亡，轻者治疗可选用（ ）。

参考答案：B

参考解析：若斑出热不解者，胃津亡也，主以甘寒，重则如玉女煎，轻则如梨皮、蔗浆之类。选项B正确当选。

100. 叶天士《温热论》中指出，若斑出热不解，因为胃津亡，重者治疗可选用（ ）。

参考答案：A

参考解析：若斑出热不解者，胃津亡也，主以甘寒，重则如玉女煎，轻则如梨皮、蔗浆之类。选项A正确当选。

配伍选择题

- A. 行政处罚
- B. 行政处分
- C. 吊销执业证书
- D. 追究刑事责任
- E. 承担赔偿责任

101. 医师在执业活动中违反了《执业医师法》规定，违法行为构成犯罪的应给予

参考答案：D

参考解析：违反《执业医师法》规定，有第三十七条规定所列12项违法行为之一，情节严重，造成严重后果，构成犯罪的，依照《刑法》第335条、第383条、第385条追究刑事责任。

102. 医师在执业活动中违反了《执业医师法》规定，违反行为严重的应给予

参考答案：C

参考解析：医师在执业活动中违反《执业医师法》规定内容，由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停六个月以上一年以下执业活动；情节严重的，吊销其医师执业证书。

配伍选择题

- A. 医疗机构设置规划
- B. 中医药专业技术职务任职资格评审

- C. 中医药人员培训计划
- D. 与中医药有关的评审或鉴定活动
- E. 获得定点资格的中医医疗机构

103. 县级以上人民政府应当将中医医疗机构建设纳入

参考答案: A

参考解析: 县级以上人民政府应当将中医医疗机构建设纳入医疗机构设置规划, 举办规模适宜的中医医疗机构, 扶持有中医药特色和优势的医疗机构发展。合并、撤销政府举办的中医医疗机构或者改变其中医医疗性质, 应当征求上一级人民政府中医药主管部门的意见。

104. 应当按照规定向参保人员提供基本医疗服务的是

参考答案: E

参考解析: 获得定点资格的中医医疗机构应当按照规定向参保人员提供基本医疗服务。

配伍选择题

- A. 临终关怀的道德要求
- B. 药物治疗的道德要求
- C. 诊治急症病人的道德要求
- D. 手术治疗的道德要求
- E. 中医治疗的道德要求

105. 争分夺秒, 全力抢救, 体现的是

参考答案: C

参考解析: 诊治急症患者的道德要求有: ①随机性强, 时间性强, 协作性强。②争分夺秒, 全力抢救; 及时与家属沟通, 敢于承担风险; 与相关科室医务人员密切配合。选项 C 正确当选。

106. 照护为主, 缓解患者的疼痛, 体现的是

参考答案: A

参考解析: 临终关怀的道德要求有: ①尊重患者的人格、权利。②照护为主, 缓解患者的疼痛。③给患者以心理支持。④给患者家属以安慰。选项 A 正确当选。

配伍选择题

- A. 经济标准
- B. 疗效标准
- C. 社会标准
- D. 行为标准
- E. 科学标准

107. 评价医务人员医疗行为善恶标准的出发点和根本标准是

参考答案: B

参考解析: 疗效标准是指医疗行为是否有利于病人疾病的缓解、痊愈和保障生命的安全。这是评价和衡量医务人员医疗行为是否符合道德及道德水平高低的重要标志。

108. 评价医疗行为是否有利于人类生存和改善, 是否有利于人类健康符合

参考答案: C

参考解析: 社会标准指医疗行为是否有利于人类生存环境的保护和改善。

配伍选择题

- A. 加强水源管理

- B. 保持居室空气流通
- C. 灭蚊
- D. 防止虫类叮咬
- E. 勤换和洗晒衣物及床单

109. 针对切断消化道传染病传播途径应采取的措施是

参考答案: A

参考解析: 对消化道传染病应搞好个人及环境卫生, 加强饮食、水源和粪便管理。选项 A 正确当选。

110. 针对切断呼吸道传染病传播途径应采取的措施是

参考答案: B

参考解析: 对呼吸道传染病应搞好居室卫生并保持空气流通, 必要时进行空气消毒, 通常以戴口罩为简便的预防方法。选项 B 正确当选。

配伍选择题

- A. 10 年以上
- B. 6~8 年
- C. 12~18 个月
- D. 6~12 个月
- E. 7~14 天

111. 艾滋病急性感染期持续时间通常为

参考答案: E

参考解析: 急性 HIV 感染期, 少数平均 2~4 周者有临床症状, 通常持续数日到数周后自然消失, 平均为 1~2 周, 以发热最为常见, 可伴有头痛、咽痛、恶心、呕吐、腹泻、皮疹、关节痛、淋巴结肿大以及神经系统症状。选项 E 正确当选。

112. 艾滋病的无症状感染期持续时间一般为

参考答案: B

参考解析: 无症状感染期可由原发感染或急性感染症状消失后延伸而来, 持续时间一般为 6~8 年, 短可数月, 长可达 15 年, 临床无明显症状。选项 B 正确当选。

配伍选择题

- A. 肾
- B. 肺
- C. 脑
- D. 肝
- E. 心

113. 人禽流感病理改变最明显的脏器是

参考答案: B

参考解析: 人禽流感病理改变以肺部最明显, 可见到肺泡和支气管黏膜损伤严重, 肺实质出血和坏死, 肺泡内大量淋巴细胞浸润, 肺泡内有透明膜形成, 有严重的弥漫性损伤, 并伴有间隔纤维形成。

114. 流行性出血热病理改变最明显的脏器是

参考答案: A

参考解析: 流行性出血热的基本病理变化为全身小血管和毛细血管变性、坏死。以肾脏病变最明显, 其次是心、肝、脑等脏器。

配伍选择题

- A. 高热、头痛、皮肤黏膜瘀斑、脑膜刺激征
- B. 高热、惊厥、循环衰竭、呼吸衰竭
- C. 头痛、腰痛、眼眶痛
- D. 眼红、腿痛、淋巴结肿大
- E. 高热、相对缓脉、脾大

115. 流脑表现为

参考答案：A

参考解析：流脑，是由脑膜炎奈瑟菌引起的一种急性化脓性脑膜炎，以突发高热、头痛、呕吐、皮肤黏膜瘀点和脑膜刺激征为主要临床表现。

116. 流行性出血热早期表现为

参考答案：C

参考解析：流行性出血热发热期起病急骤，突然畏寒、发热，体温在1~2日内可达39℃~40℃，热型多为弛张热或稽留热，一般持续3~7日。同时出现全身中毒症状，高度乏力，周身酸痛，常有典型的“三痛”：头痛、腰痛、眼眶痛，常伴较突出的胃肠道症状。

配伍选择题

- A. 过滤除菌
- B. 热力消毒法
- C. 光照消毒法
- D. 电离辐射灭菌法
- E. 微波消毒灭菌法

117. 应用最早、效果可靠、使用最广泛的物理消毒法是

参考答案：B

参考解析：热力消毒法：利用热力破坏微生物的蛋白质、核酸、细胞壁和细胞膜，从而导致其死亡，是应用最早、效果可靠、使用最广泛的方法。选项B正确当选。

118. 设备昂贵，对人及物品有一定的损害的是

参考答案：D

参考解析：电离辐射灭菌法：利用放射性核素⁶⁰Co发射高能γ射线或电子加速器产生的高能电子束进行辐射灭菌。适用于不耐热的物品灭菌。其设备昂贵，对人及物品有一定的损害。选项D正确当选。

配伍选择题

- A. 偏头痛
- B. 三叉神经痛
- C. 神经衰弱
- D. 癔症
- E. 中暑

119. 头痛病因中属颅内疾病的是

参考答案：A

参考解析：颅内病变见于脑出血、蛛网膜下腔出血、脑肿瘤、颅脑外伤、流行性脑脊髓膜炎、偏头痛等。选项A正确当选。

120. 头痛病因中属颅外疾病的是

参考答案：B

参考解析：颅外病变见于颈椎病、三叉神经痛，眼、耳、鼻和齿等疾病所致的头痛。选项B正确当选。

121. 头痛病因中属全身疾病的是

参考答案：E

参考解析：全身性疾病见于各种感染发热、高血压病、中毒、中暑、月经期及绝经期头痛等。选项E正确当选。

配伍选择题

- A. 带状疱疹
- B. 自发性气胸
- C. 非化脓性肋软骨炎
- D. 食道疾患
- E. 流行性胸痛

122. 胸痛常位于胸骨后的是

参考答案：D

参考解析：食管、膈和纵隔肿瘤也位于胸骨后疼痛，常伴进食或吞咽时加重。选项D正确当选。

123. 多侵犯第1、2肋软骨的疾病是

参考答案：C

参考解析：非化脓性肋软骨炎，多侵犯第1、2肋软骨。选项C正确当选。

124. 可引起患侧剧烈胸痛的是

参考答案：B

参考解析：自发性气胸、急性胸膜炎的胸痛，多位于患侧的腋前线及腋中线附近。选项B正确当选。

配伍选择题

- A. 肝癌
- B. 肝硬化
- C. 疟疾
- D. 蚕豆病
- E. 胰头癌

125. 可见肝外梗阻性黄疸的是

参考答案：E

参考解析：肝外梗阻性黄疸多由胆道结石、胆管癌、胰头癌、胆道炎症水肿、胆道蛔虫、胆管狭窄等引起的梗阻造成。选项E正确当选。

126. 可见溶血性黄疸的是

参考答案：D

参考解析：溶血性黄疸的病因：①先天性溶血性贫血：如遗传性球形红细胞增多症、珠蛋白生成障碍性贫血、蚕豆病等。②后天获得性溶血性贫血：自身免疫性溶血性贫血。同种免疫性溶血性贫血，如误输异型血、新生儿溶血。非免疫性溶血性贫血，如败血症、疟疾、毒蛇咬伤、毒蕈中毒、阵发性睡眠性血红蛋白尿等。选项D正确当选。

配伍选择题

- A. 不规则斑点状或片状高密度出血灶影
- B. 呈三角形或扇形，边界不清
- C. 呈圆形、椭圆形或不规则形均匀密度增高影
- D. 有不同程度的脑萎缩
- E. 典型者可见小片状密度减低影，边缘模糊

127. 出血性脑梗死可见

参考答案：A

参考解析：出血性脑梗死：在密度减低的脑梗死灶内，见到不规则斑点状或片状高密度出血灶影；由于占位，脑室轻度受压，中线轻度移位；2~3周后，病变处密度逐渐变低。

128. 腔隙性脑梗死可见

参考答案：E

参考解析：腔隙性脑梗死：发病12~24小时之内，CT无异常所见；典型者可见小片状密度减低影，边缘模糊；无占位效应。

配伍选择题

- A. 中性粒细胞
- B. 嗜酸性粒细胞
- C. 嗜碱性粒细胞
- D. 淋巴细胞
- E. 单核细胞

129. 脾功能亢进时主要减少的细胞是

参考答案：A

参考解析：中性粒细胞病理性减少可见于单核-巨噬细胞系统功能亢进：如脾功能亢进，见于各种原因引起的脾脏肿大（如肝硬化等）。选项A正确当选。

130. 支气管哮喘时增多的细胞是

参考答案：B

参考解析：嗜酸性粒细胞增多可见于变态反应性疾病：如支气管哮喘、血管神经性水肿、荨麻疹、药物过敏反应、血清病等。选项B正确当选。

配伍选择题

- A. 睛明治眼病
- B. 下脘治胃痛
- C. 大椎退热
- D. 合谷治五官病
- E. 听宫治耳鸣

131. 属于腧穴特殊作用的是

参考答案：C

参考解析：大椎退热、至阴矫正胎位等，都属于腧穴特殊治疗作用。

132. 属于腧穴远治作用的是

参考答案：D

参考解析：具有远治作用的腧穴，主要指十二经脉在四肢肘、膝关节以下的经穴，即“经脉所过，主治所及”。如合谷穴，不仅能治上肢病证，而且能治颈部和头面部病证等。

配伍选择题

- A. 6 寸
- B. 8 寸
- C. 9 寸
- D. 12 寸
- E. 13 寸

133. 胫骨内侧髁下方至内踝尖的骨度分寸是

参考答案：E

参考解析：胫骨内侧髁下方至内踝尖的骨度分寸是：13 寸。

134. 肘横纹（平肘尖）至腕掌（背）侧横纹的骨度分寸是

参考答案：D

参考解析：肘横纹（平肘尖）至腕掌（背）侧横纹的骨度分寸是：12 寸。

配伍选择题

- A. 足三里
- B. 上巨虚
- C. 下巨虚
- D. 条口
- E. 丰隆

135. 强壮保健要穴是

参考答案：A

参考解析：强壮保健要穴是：足三里。

136. 治疗痰饮病证的要穴是

参考答案：E

参考解析：治疗痰饮病证的要穴是：丰隆。

配伍选择题

- A. 手少阳三焦经
- B. 手太阳小肠经
- C. 足太阳膀胱经
- D. 足阳明胃经
- E. 足少阳胆经

137. 支沟所属的经脉是

参考答案：A

参考解析：支沟穴归属于手少阳三焦经。定位：在前臂后区，腕背横纹上 3 寸，尺骨与桡骨间隙中点。选项 A 正确当选。

138. 脾俞所属的经脉是

参考答案：C

参考解析：脾俞穴归属于足太阳膀胱经。定位：在脊柱区，第 11 胸椎棘突下，后正中线旁开 1.5 寸。选项 C 正确当选。

配伍选择题

- A. 肾俞、关元
- B. 膈俞、血海
- C. 阴陵泉、足三里

- D. 大椎、曲池
- E. 阴陵泉、血海

139. 治疗着痹宜配

参考答案：C

参考解析：痹证的治法为通络止痛，以局部穴位为主，配合循经取穴及辨证选穴。主穴为阿是穴、局部经穴。着痹配阴陵泉、足三里。选项C正确当选。

140. 治疗热痹宜配

参考答案：D

参考解析：热痹配大椎、曲池。选项D正确当选。

配伍选择题

- A. 四逆散
- B. 柴胡疏肝散
- C. 逍遥散
- D. 一贯煎
- E. 痛泻要方

141. 两胁作痛，头痛目眩，月经不调，乳房作胀，神疲食少，脉弦而虚者。治宜选用

参考答案：C

参考解析：逍遥散主治：肝郁血虚脾弱证。两胁作痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，或月经不调，乳房胀痛，脉弦而虚。选项C正确当选。

142. 胁肋胀闷，脘腹疼痛，手足不温，脉弦者。治宜选用

参考答案：A

参考解析：四逆散主治肝脾不和证。胁肋胀闷，脘腹疼痛，脉弦。选项A正确当选。

配伍选择题

- A. 白术、茯苓
- B. 人参、白术
- C. 甘草、生姜
- D. 茯苓、干姜
- E. 干姜、甘草

143. 理中丸和四君子汤组成中均含有的药物是

参考答案：B

参考解析：理中丸的组成是人参、干姜、炙甘草、白术。四君子汤的组成是人参、白术、茯苓、甘草。选项B正确当选。

144. 理中丸和四逆汤组成中均含有的药物是

参考答案：E

参考解析：理中丸的组成是人参、干姜、炙甘草、白术。四逆汤的组成是炙甘草、干姜、生附子。选项E正确当选。

配伍选择题

- A. 一贯煎
- B. 四神丸
- C. 九仙散
- D. 右归丸

E. 止嗽散

145. 功能敛肺止咳的方剂是

参考答案：C

参考解析：九仙散敛肺止咳、益气养阴，治疗久咳伤肺，气阴两伤证。选项C正确当选。

146. 功能固肠止泻的方剂是

参考答案：B

参考解析：四神丸主治脾肾阳虚之肾泄证，有温补脾肾，固肠止泻之功。选项B正确当选。

配伍选择题

A. 十灰散

B. 止嗽散

C. 咳血方

D. 四生丸

E. 小蓟饮子

147. 治疗肝火犯肺所致之咳痰带血，宜选用

参考答案：C

参考解析：因肝火犯肺，灼伤肺络所致的咳血证，治疗宜选用擅长清肝宁肺，凉血止血的咳血方。选项C正确当选。

148. 治疗下焦瘀热所致之血淋尿血，宜选用

参考答案：E

参考解析：血淋尿血由下焦瘀热损伤膀胱血络，气化失司所致者，治宜凉血止血，利水通淋，选用小蓟饮子。选项E正确当选。

配伍选择题

A. 燥湿化痰，理气和中

B. 理气化痰，清胆和胃

C. 清热化痰，理气止咳

D. 清热化痰，宽胸散结

E. 燥湿行气，软坚化痰

149. 小陷胸汤的功用是

参考答案：D

参考解析：小陷胸汤的功用是清热化痰，宽胸散结。选项D正确当选。

150. 清气化痰丸的功用是

参考答案：C

参考解析：清气化痰丸的功用是清热化痰，理气止咳。选项C正确当选。

