

2022 年 中西医执业 第三单元 核心押题卷

1.慢性肺心病患者出现视网膜血管扩张、视乳头水肿等颅内压升高的表现,表明该患者处于

- A.急性发作期
- B.慢性缓解期
- C.病例诊断期
- D.迁延期
- E.进展期

参考答案: A

参考解析: 该患者出现了急性发作期呼吸衰竭的体征。(1)症状呼吸困难加重,夜间为甚,常有头痛、失眠、食欲下降,但白天嗜睡,甚至出现表情淡漠、神志恍惚、谵妄等肺性脑病的表现。(2)体征明显发绀,球结膜充血、水肿,严重时可有视网膜血管扩张、视乳头水肿等颅内压升高的表现。腱反射减弱或消失,出现病理反射;因高碳酸血症出现周围血管扩张的表现,如皮肤潮红、多汗。

2.补肺汤合参蛤散治疗的慢性呼吸衰竭的症候为

- A.痰蒙神窍
- B.脾肾阳虚
- C.阳微欲脱
- D.肺肾气虚
- E.痰浊阻肺

参考答案: D

参考解析: 肺肾气虚证:呼吸短浅难续,甚则张口抬肩,不能平卧,胸满气短,心悸,咳嗽,痰白如沫,咳吐不利,形寒汗出,舌淡或暗紫,苔白润,脉沉细无力或结代。治法:补益肺肾,纳气平喘。方药:补肺汤合参蛤散加减。选项 D 正确当选。

3.急性心肌梗死或急性心肌缺血病人发生的心搏骤停,绝大多数为

- A.房早
- B.室早
- C.房扑
- D.房颤
- E.室颤

参考答案: E

参考解析: 急性心肌梗死或急性心肌缺血病人发生的心搏骤停,绝大多数为心室颤动。

4.风湿性心瓣膜疾病最常见的并发症是

- A.呼吸道感染
- B.心力衰竭
- C.亚急性感染性心内膜炎
- D.心律失常
- E.肺栓塞

参考答案: B

参考解析: 心力衰竭是风心病最常见的并发症和致死原因,约发生于 70%的患者。选项 B 正确当选。

5.治疗慢性胃炎胃阴不足证的代表方剂是

- A.柴胡疏肝散
- B.四君子汤
- C.益胃汤

- D.三仁汤
- E.失笑散合丹参饮

参考答案：C

参考解析：慢性胃炎胃阴不足证的治法为养阴益胃，和中止痛，代表方为益胃汤加减。选项C正确当选。

6.溃疡病病人并发消化道大出血时，下述症状不常出现的是

- A.呕血或黑粪
- B.贫血
- C.氮质血症
- D.高热
- E.失血性周围循环衰竭

参考答案：D

参考解析：除了选项D外，其余选项是在溃疡病人并发消化道大出血时均会出现的症状。出血是消化性溃疡最常见的并发症，DU较GU更多并发出血，尤以十二指肠球部后壁和球后溃疡更多见；出血常因溃疡侵蚀周围血管所致，是上消化道大出血最常见的病因。临床表现取决于出血量的多少，轻者只表现为黑便，重者出现呕血和循环衰竭表现，如休克等。出血前常有上腹疼痛加重现象，出血后疼痛反减轻；少数病人（尤其是老年病人）并发出血前可无症状。

7.下列关于急性肾衰竭少尿期或无尿期出现水中毒的原因，不正确的是

- A.肾脏排尿减少
- B.输入大量液体
- C.抗利尿激素增多
- D.内生水过多
- E.饮食摄水过多

参考答案：C

参考解析：急性肾衰竭少尿期或无尿期出现水中毒的原因为肾脏排尿减少、输入大量液体、患者饮食摄水过多以及机体内生水过多。选项C正确当选。

8.肾病综合征患者，浮肿，按之凹陷不易恢复，腹胀纳少，面色萎黄，神疲乏力，尿少色清，大便溏，舌质淡，苔白腻，脉沉缓。治疗应首选的方剂是

- A.疏凿饮子
- B.越婢加术汤
- C.参苓白术散
- D.真武汤
- E.实脾饮

参考答案：E

参考解析：肾病综合征脾虚湿困证，证候：浮肿，按之凹陷不易回复，腹胀纳少，面色萎黄，神疲乏力，尿少色清，大便或溏，舌质淡，苔白腻或白滑，脉沉缓或沉弱。治法：温运脾阳，利水消肿。方药：实脾饮加减。选项E正确当选。

9.粒细胞缺乏症是指外周血中性粒细胞绝对值持续低于

- A. $5.0 \times 10^9/L$
- B. $3.0 \times 10^9/L$
- C. $4.0 \times 10^9/L$
- D. $0.5 \times 10^9/L$
- E. $1.5 \times 10^9/L$

参考答案：D

参考解析：当中性粒细胞绝对数低于  $2.0 \times 10^9/L$  时称为粒细胞减少症；低于  $0.5 \times 10^9/L$  时称为粒细胞缺乏症。选项 D 正确当选。

10. 急性原发免疫性血小板减少症多见于

- A. 老人
- B. 儿童
- C. 青年
- D. 壮年
- E. 婴儿

参考答案：B

参考解析：原发免疫性血小板减少症急性型常见于儿童。

11. 金匱肾气丸适用于治疗糖尿病的证型是

- A. 胃热炽盛
- B. 气阴两虚
- C. 肺热津伤
- D. 阴阳两虚
- E. 肾阴亏虚

参考答案：D

参考解析：糖尿病阴阳两虚证的治法为滋肾温阳，补肾固涩，代表方为金匱肾气丸加减。选项 D 正确当选。

12. 等渗性失水的患者，大量输入生理盐水可导致

- A. 高钙血症
- B. 高氯血症
- C. 高钾血症
- D. 低钾血症
- E. 低氯血症

参考答案：B

参考解析：生理盐水为等渗盐水，含  $Na^+$  和  $Cl^-$  各  $154mmol/L$ 。当等渗性缺水时，因肾血流减少，排氯功能受阻，静脉大量输入等渗盐水有导致高氯性酸中毒的危险。选项 B 正确当选。

13. 下列不属于系统性红斑狼疮诊断依据的是

- A. 溶血性贫血或白细胞减少
- B. 蛋白尿或细胞管型
- C. 血沉加快
- D. 非侵蚀性关节炎
- E. 颧部红斑

参考答案：C

参考解析：美国风湿病学会(ACR)1997年推荐的SLE分类标准：(1)颧部红斑。(2)盘状红斑。(3)光过敏。(4)口腔溃疡。(5)关节炎。(6)浆膜炎。(7)肾脏病变。(8)神经系统病变，癫痫发作或精神症状。(9)血液系统异常。(10)免疫学异常。(11)抗核抗体阳性。选项 C 正确当选。

14. 短暂性脑缺血发作(TIA)的持续时间一般不超过

- A. 30 分钟
- B. 40 分钟

C.50 分钟

D.8 小时

E.24 小时

参考答案：E

参考解析：TIA 每次发作历时短暂，持续数分钟至 1 小时，在 24 小时内即完全恢复，约占同期缺血性脑血管病的 7%~45%。选项 E 正确当选。

15.急性脑出血有脑疝形成征象，最急需的措施是

A.脑 CT 检查

B.脑 MRI 检查

C.腰椎穿刺

D.可快速静脉推注利尿剂

E.脑血管造影

参考答案：D

参考解析：结合题干要求，其他选项均为操作检查的内容，因此，对于治疗上最佳的选项是 D。

16.诊断有机磷杀虫药中毒时，全血胆碱酯酶活性应

A.<100%

B.≤90%

C.≤80%

D.≤75%

E.≤70%

参考答案：E

参考解析：血液胆碱酯酶活性可作为有机磷杀虫药中毒的参考指标。轻度中毒，ChE 活力为 50%~70%。中度中毒，ChE 活力为 30%~50%。重度中毒全血或红细胞 ChE 活力<30%。

17.严重热衰竭病人，应在 3~6 小时内紧急采取的措施，正确的是

A.口服 10%葡萄糖溶液 500~800ml

B.静脉滴注 5%葡萄糖氯化钠溶液 2000~3000ml

C.静脉滴注 10%葡萄糖溶液 1000~1500ml

D.静脉滴注 5%葡萄糖氯化钠溶液 1000~1500ml

E.静脉滴注 5%葡萄糖氯化钠溶液 500~800ml

参考答案：B

参考解析：热衰竭应该脱离热环境，纠正脱水和电解质紊乱，监测生命体征，计出入量。可物理降温。轻症者口服 0.1%等渗氯化钠溶液即可。严重病例则需快速静脉滴注含 5%葡萄糖氯化钠注射液 2000~3000mL。选项 B 正确当选。

18.五磨饮子适用于喘证之

A.上实下虚证

B.痰浊阻肺证

C.肺气郁痹证

D.表寒里热证

E.痰热郁肺证

参考答案：C

参考解析：喘证肺气郁痹证，证候：每遇情志刺激而诱发，发时突然呼吸短促，息粗气憋，胸闷胸痛，咽中如室，但喉中痰鸣不著，或无痰声。平素常多忧思抑郁，失眠，心悸。苔薄，脉弦。治法：开郁降气平喘。方药：五磨饮子加减。选项 C 正确当选。

19.心烦不寐，胸闷脘痞，泛恶暖气，伴口苦，头重，目眩，舌红，苔黄腻，脉滑数。其中应首选方剂是

- A.龙胆泻肝汤
- B.黄连温胆汤
- C.归脾汤
- D.六味地黄丸合黄连阿胶汤
- E.安神定志丸合酸枣仁汤

参考答案：B

参考解析：不寐痰热扰心证，证候：心烦不寐，胸闷脘痞，泛恶暖气，伴口苦，头重，目眩，舌偏红，苔黄腻，脉滑数。治法：清化痰热，和中安神。方药：黄连温胆汤加减。选项B正确当选。

20.腹痛拒按，大便溏滞不爽，小便短赤，舌红苔黄腻，应辨为

- A.寒邪内阻证
- B.湿热壅滞证
- C.中虚脏寒证
- D.气滞血瘀证
- E.饮食积滞证

参考答案：B

参考解析：腹痛湿热壅滞证证候：腹痛拒按，烦渴引饮，大便秘结，或溏滞不爽，潮热汗出，小便短黄，舌质红，苔黄燥或黄腻，脉滑数。治法：泄热通腑，行气导滞。方药：大承气汤加减。

21.鼓胀之水湿困脾证，其治疗首选方剂为

- A.柴胡疏肝散
- B.胃苓汤
- C.实脾饮
- D.中满分消丸
- E.茵陈蒿汤

参考答案：C

参考解析：鼓胀水湿困脾证，治法：温中健脾，行气利水。方药：实脾饮加减。选项C正确当选。

22.患者胁肋刺痛，痛有定处，痛处拒按，入夜痛甚，胁肋下见有癥块，舌质紫暗，脉沉涩。其诊断为

- A.积证
- B.聚证
- C.胁痛
- D.腹痛
- E.胸痹

参考答案：C

参考解析：患者胁肋刺痛，可诊断为胁痛。痛有定处，痛处拒按，入夜痛甚，胁肋下见有癥块，舌质紫暗，脉沉涩为瘀血阻络证。选项C正确当选。

23.下列不是阳水证的临床表现的是

- A.起病急，病程短
- B.水肿先从头面肿起
- C.上半身肿甚

D.水肿皮薄光亮

E.肢冷、腰酸痛

参考答案：E

参考解析：阳水证的临床表现：起病急、病程短，水肿先从头面肿起、上半身肿甚，水肿皮薄光亮，按之凹陷即起。兼有寒热表证。而肢冷、腰酸痛属于阴水的范畴。选项E正确当选。

24.皮肤出现青紫斑点伴有鼻衄，口渴，便秘，舌质红，苔黄，脉弦数。首选的方剂是

A.泻白散合黛蛤散

B.百合固金汤

C.杏苏散

D.玉女煎

E.犀角地黄汤

参考答案：E

参考解析：紫斑血热妄行证，证候：皮肤出现青紫斑点或斑块，或伴有鼻衄、齿衄、便血、尿血，或有发热，口渴，便秘，舌质红，苔黄，脉弦数。治法：清热解毒，凉血止血。方药：犀角地黄汤加减。选项E正确当选。

25.溃疡性结肠炎的腹痛特点是

A.疼痛-便意-便后缓解

B.转移性右下腹痛

C.膈下钻顶样腹痛

D.夜间隐痛，阵发性加剧

E.腹痛-餐后缓解

参考答案：A

参考解析：溃疡性结肠炎消化系统的表现：①腹泻和黏液脓血便。②腹痛有疼痛-便意-便后缓解的规律，可伴腹胀、食欲不振、恶心及呕吐。选项A正确当选。

26.心脏排血功能减退，心排血量减少引起脑部缺血，发生短暂的意识丧失称为

A.心源性昏厥（阿-斯综合征）

B.心源性休克

C.心脏骤停

D.低氧血症

E.昏迷

参考答案：A

参考解析：心脏排血功能减退，心排血量减少引起脑部缺血，发生短暂的意识丧失，称为心源性昏厥（阿-斯综合征）。发作持续数秒时可有四肢抽搐、呼吸暂停、发绀等表现，主要见于急性心排血量受阻或严重心律失常患者。选项A正确当选。

27.前间壁心肌梗死的特征性心电图改变见于

A.V3~V5

B.V1~V6

C.V1~V3

D. I、aVL

E. II、III、aVF

参考答案：C

参考解析：前间壁心肌梗死特征性心电图改变常表现在V1~V3导联。V3~V5见于前壁梗死。V1~V6见于广泛前壁梗死。I、aVL见于高侧壁梗死。II、III、aVF见于下壁梗死。选项C正确当选。

28.克雷白杆菌肺炎痰液的颜色是

- A.铁锈色痰
- B.粉红色泡沫痰
- C.砖红色胶冻状痰
- D.脓性痰
- E.粉红色乳状痰

参考答案：C

参考解析：克雷白杆菌肺炎痰液常呈砖红色胶冻状或灰绿色。粉红色泡沫痰见于急性肺水肿，脓性痰见于支气管扩张症、肺脓肿，粉红色乳状痰见于葡萄球菌肺炎。铁锈色痰见于肺炎球菌肺炎。选项C正确当选。

29.下列各项中，符合白血病诊断描述的是

- A.发热，贫血，出血，外周血象正常，骨髓象增生不活跃
- B.发热，贫血，胸骨压痛，外周血幼稚细胞增多，骨髓有核细胞增生活跃
- C.发热，贫血，出血，骨髓象增生良好
- D.发热，贫血，骨髓象增生活跃
- E.发热，淋巴结肿大，血象中出现异型淋巴细胞

参考答案：B

参考解析：急性白血病(AL)是造血干细胞的恶性克隆性疾病，发病时骨髓中异常的原始细胞(白血病细胞)大量增殖并浸润各种器官、组织，使正常造血受抑制。主要表现为肝脾和淋巴结肿大、贫血、出血及继发感染等。多数病例骨髓象有核细胞显著增生，以原始细胞为主，而较成熟中间阶段细胞缺如，并残留少量成熟粒细胞，形成所谓“裂孔”现象。选项B正确当选。

30.以病灶对侧完全性偏瘫、偏身感觉障碍及向病灶对侧的凝视麻痹为特点，可有头痛和意识障碍，并呈进行性加重的脑梗死为

- A.分水岭脑梗死
- B.多发性脑梗死
- C.腔隙性脑梗死
- D.出血性脑梗死
- E.颈内动脉主干、大脑中动脉主干或皮层支的完全性卒中

参考答案：E

参考解析：大面积脑梗死通常是颈内动脉主干、大脑中动脉主干或皮层支的完全性卒中，患者表现为病灶对侧完全性偏瘫、偏身感觉障碍及向病灶对侧的凝视麻痹，可有头痛和意识障碍，并呈进行性加重。选项E正确当选。

31.某患者，咳嗽，喘逆不得卧，咳吐清稀白沫痰，量多，遇冷空气刺激加重，面浮肢肿，恶寒肢冷，小便不利，舌苔白滑，脉弦紧。其中医证型是

- A.风寒犯肺证
- B.寒饮伏肺证
- C.风热犯肺证
- D.痰浊阻肺证
- E.痰热郁肺证

参考答案：B

参考解析：慢性支气管炎寒饮伏肺证，证候：咳嗽，喘逆不得卧，咳吐清稀白沫痰，量多，遇冷空气刺激加重，甚至面浮肢肿，常兼恶寒肢冷，微热，小便不利，舌苔白滑或白腻，脉弦紧。选项B正确当选。

32.患者，男，32岁，患肺炎，现突发咳嗽，咳痰黄稠，进而咳铁锈色痰，呼吸气促，高热不退，胸膈痞满，按之疼痛，口渴烦躁，小便黄赤，大便干燥，舌红苔黄，脉洪数。其治法宜选

- A.疏风清热，宣肺止咳
- B.清热化痰，宽胸止咳
- C.清热解毒，化痰开窍
- D.益气养阴，润肺化痰
- E.解表散寒，清泄里热

参考答案：B

参考解析：肺炎痰热壅肺证，证候：咳嗽，咳痰黄稠或咳铁锈色痰，呼吸气促，高热不退，胸膈痞满，按之疼痛，口渴烦躁，小便黄赤，大便干燥，舌红苔黄，脉洪数或滑数。治法：清热化痰，宽胸止咳。方药：麻杏石甘汤合千金苇茎汤加减。

33.患者男性，60岁。急性前壁心肌梗死2天，晕厥2次，心室率40次/分，律齐，心电图示III度房室传导阻滞。首选治疗是

- A.麻黄素
- B.人工心脏起搏
- C.异丙肾上腺素
- D.阿托品
- E.溴苯辛

参考答案：B

参考解析：人工心脏起搏适应证：①伴有临床症状的任何水平的完全或高度房室传导阻滞。②束支-分支水平传导阻滞，间歇发生II度II型房室传导阻滞，有症状者；在观察过程中虽无症状，但阻滞程度进展、H-V间期>100ms者。③病窦综合征或房室传导阻滞，心室率经常低于50次/分，有明确的临床症状，或间歇发生心室率<40次/分；或虽无症状，但有长达3秒的R-R间隔。④由于颈动脉窦过敏引起的心率减慢，心率或R-R间隔达到上述标准，伴有明确症状者。⑤有窦房结功能障碍和/或房室传导阻滞的患者，因其他情况必须采用具有减慢心率作用的药物治疗时，为保证适当的心室率，应植入起搏器。

34.男性，25岁。发现高血压2年，血压最高160/120mmHg。尿蛋白++，血尿素氮28.6mmol/L，血清肌酐442μmol/L，红细胞 $2.6 \times 10^{12}/L$ 。最可能的诊断是

- A.高血压病III期
- B.高血压危象
- C.急进型高血压病
- D.嗜铬细胞瘤
- E.肾性高血压

参考答案：E

参考解析：结合患者的年龄及高血压病史以及肾脏实验室检查指标可以做出诊断。

35.患者男性，68岁。胸闷痛反复发作10年，加重1小时，现患者胸闷痛彻背，心慌，大汗出，四肢厥冷，面色唇甲青紫，脉沉微欲绝，应首先考虑的病证结合诊断是

- A.急性心肌梗死+气阴两虚证
- B.心绞痛+寒凝心脉证
- C.急性心肌梗死+心阳欲脱证
- D.心绞痛+心肾阳虚证
- E.急性心肌梗死+寒凝心脉证

参考答案：C



参考解析：根据患者胸痛病史及证候表现可考虑为急性心肌梗死之心阳欲脱证。心阳欲脱证证候：胸闷憋气，心痛频发，四肢厥逆，大汗淋漓，面色苍白，口唇发绀，手足青至节，虚烦不安，甚至神志淡漠或突然昏厥，舌质青紫，脉微欲绝。选项 C 正确当选。

36.患者男性，28岁。上腹痛8个月，与饮食无明显关系，吐酸水，常腹泻，制酸药效果不佳。X线钡餐造影发现食管、胃及十二指肠球部均有溃疡。应首先考虑的诊断是

- A.多发性溃疡
- B.恶性淋巴瘤
- C.复合性溃疡
- D.胰腺p细胞腺瘤
- E.胃泌素瘤

参考答案：E

参考解析：胃泌素瘤其特点为多发性溃疡、不典型部位溃疡、难治、易穿孔和/或出血。血清胃泌素常 $>500\text{pg/mL}$ ；超声、CT等检查有助于病位诊断。选项 E 正确当选。

37.男性，56岁，肝硬化腹水患者。1周来发热，腹痛，体温 $38^{\circ}\text{C}$ ，脉搏100次/分，呼吸26次/分，踝部可凹性水肿。腹水检查：微黄色，微浑，比重：1.016，细胞数 $0.8\times 10^9/\text{L}$ ，白细胞数 $0.5\times 10^9/\text{L}$ ，分类：中性粒细胞0.70，淋巴细胞0.30。可能诊断是

- A.肝硬化顽固性腹水
- B.肝硬化合并肝癌
- C.肝硬化合并结核性腹膜炎
- D.肝硬化合并自发性腹膜炎
- E.肝肾综合征

参考答案：D

参考解析：肝硬化腹腔积液为漏出液，合并自发性腹膜炎为渗出液，以中性粒细胞增多为主；结核性腹膜炎为渗出液，腺苷脱氢酶（ADA）增高；肿瘤性腹腔积液比重介于渗出液和漏出液之间，腹腔积液LDH/血液LDH $>1$ ，可找到肿瘤细胞。

38.患者，女，35岁。有胃溃疡病史，症见吐血，色暗淡，大便黑，面色苍白，头晕心悸，神疲乏力，纳少，舌淡红，苔薄白，脉细弱。其证型是

- A.肝气郁结
- B.脾不统血
- C.气随血脱
- D.胃中积热
- E.肝火犯胃

参考答案：B

参考解析：根据患者有胃溃疡病史，吐血，大便黑，头晕心悸，乏力及面色苍白，舌淡苔白等贫血症状，可诊断为上消化道出血之脾不统血证。选项 B 正确当选。

39.王某，男，6岁。1月前出现眼睑浮肿，尿常规检查为蛋白尿，24小时定量为4.5g，血浆总蛋白为25g/L，B超提示腹水。临床上最可能诊断为

- A.急性肾炎
- B.慢性肾炎
- C.肾病综合征
- D.肝硬化腹水
- E.以上均不是

参考答案：C

参考解析：肾病综合征临床特征为：①大量蛋白尿（ $\geq 3.5\text{g}/24\text{h}$ ）；②低白蛋白血症（ $\leq 30\text{g/L}$ ）；

③水肿；④高脂血症。

40. 刘某，男，57岁，慢性肾衰竭5年。现头晕头痛，耳鸣眼花，两目干涩，口干咽燥，腰膝酸软，大便易干，尿少色黄，舌淡红少津，苔薄白，脉弦。血压升高达160/92mmHg。治疗应首选的方剂是

- A. 六味地黄丸
- B. 金匱肾气丸
- C. 杞菊地黄汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 全鹿丸

参考答案：C

参考解析：慢性肾衰肝肾阴虚证，证候：头晕头痛，耳鸣眼花，两目干涩或视物模糊，口干咽燥，渴而喜饮或饮水不多，腰膝酸软，大便易干，尿少色黄，舌淡红少津，苔薄白或少苔，脉弦或弦细，常伴血压升高。治法：滋肾平肝。方药：杞菊地黄汤加减。选项C正确当选。

41. 患者，男，62岁，小便淋沥不已，时作时止，每于劳累后发作或加重，尿热，时有尿痛，面色无华，神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，食欲不振，口干不欲饮水，舌质淡，苔薄白，脉沉细。治疗宜选用

- A. 八正散加减
- B. 丹栀逍遥散加减
- C. 无比山药丸加减
- D. 知柏地黄丸加减
- E. 补中益气汤加减

参考答案：C

参考解析：尿路感染脾肾亏虚，湿热屡犯证，证候：小便淋沥不已，时作时止，每于劳累后发作或加重，尿热，或有尿痛，面色无华，神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，食欲不振，口干不欲饮水，舌质淡，苔薄白，脉沉细。治法：健脾补肾。方药：无比山药丸加减。

42. 6岁女童，喜食泥块，面色萎黄，血红蛋白92g/L，应给下列何种药物治疗

- A. 抗生素
- B. 葡萄糖
- C. 维生素类
- D. 铁剂
- E. 钙剂

参考答案：D

参考解析：结合患者异食癖，面色萎黄及实验室检查可以考虑患者为缺铁性贫血，口服铁剂为首选。选项D正确当选。

43. 患者高热2周，伴乏力气短。血象检查：网织红细胞绝对值 $12 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 $0.4 \times 10^9/L$ ，血小板 $18 \times 10^9/L$ ；骨髓象示：骨髓增生广泛重度减低。应考虑的诊断是

- A. 骨髓增生异常综合征
- B. 非重型再障
- C. 白血病
- D. 恶性贫血
- E. 重型再障

参考答案：E

参考解析：重型再障(SAA)的诊断要点：(1)临床表现发病急，贫血呈进行性加剧，常伴严重感染及内脏出血。(2)血象具备下述三项中两项：①网织红细胞绝对值 $< 15 \times 10^9/L$ 。②中性

粒细胞 $<0.5 \times 10^9/L$ 。③血小板 $<20 \times 10^9/L$ 。(3)骨髓增生广泛重度减低。选项 E 正确当选。

44.某骨髓增生异常综合征患者，面色萎黄，唇甲色淡，头晕目眩，失眠多梦，耳鸣眼花，气短懒言，疲乏无力，胸闷心悸，动则尤甚，肋下癥积，舌体胖大，舌质淡红，舌苔薄白，脉虚无力。治疗应首选的方剂是

- A.大补元煎加减
- B.清骨散加减
- C.右归丸加减
- D.八珍汤加减
- E.血府逐瘀汤加减

参考答案：D

参考解析：骨髓增生异常综合征气血两虚证，证候：面色萎黄，唇甲色淡，失眠多梦，气短懒言，疲乏无力，胸闷心悸，动则尤甚，舌体胖大，舌质淡红，舌苔薄白，脉虚无力。治法：益气补血。方剂：八珍汤加减。选项 D 正确当选。

45.李某，女性，60岁，服丙基硫氧嘧啶治疗1.5年后，甲状腺较前缩小，T3抑制试验3小时 $>50\%$ ，24小时 $<50\%$ ，TT3、TT4正常。对此病人采取

- A.改用手术治疗
- B.停用丙基硫氧嘧啶
- C.继续用丙基硫氧嘧啶
- D.加大丙基硫氧嘧啶剂量
- E.放射性 $^{131}I$ 治疗

参考答案：C

参考解析：继续用丙基硫氧嘧啶抑制T4在周围组织中转化为T3。

46.患者女，39岁。现患者自觉颈前肿胀并伴有疼痛，发热多汗、急躁、心悸半月。左侧甲状腺轻度肿大。心率100次/分，律齐。应首先考虑的诊断是

- A.Graves病
- B.桥本病
- C.单纯性甲状腺肿
- D.甲状腺腺瘤
- E.亚急性甲状腺炎

参考答案：E

参考解析：结合患者的性别、年龄以及患者的症状可以初步考虑为亚急性甲状腺炎。选项 E 正确当选。

47.患者剧烈呕吐两天，嗜睡，感觉迟钝，呼吸深快。查体：脉搏110次/分，呼吸32次/分，血压95/60mmHg。应首选的检查项目是

- A.血清钙测定
- B.血气分析
- C.血清钠测定
- D.血清钾测定
- E.血CO<sub>2</sub>CP测定

参考答案：B

参考解析：患者剧烈呕吐，呼吸深快，考虑代谢性酸中毒，可根据血气分析做出诊断。选项 B 正确当选。

48.患者，女，30岁。患系统性红斑狼疮。现低热，口苦纳呆，两肋胀痛，黄疸，肝大，烦躁易怒，皮肤红斑，舌紫暗，脉弦。其证型是

- A.瘀热痹阻
- B.气血两亏
- C.阴虚内热
- D.瘀热伤肝
- E.热郁积饮

参考答案：D

参考解析：热毒内盛，瘀血阻滞，伤及肝脏，则低热，口苦纳呆，两胁胀痛，黄疸，肝大，烦躁易怒，皮肤红斑。舌紫暗，脉弦为瘀血内结之象。辨证为瘀热伤肝证。选项D正确当选。

49.患者，女，38岁。患类风湿关节炎1年多。现午后发热，盗汗，口干咽燥，手足心热，关节肿胀疼痛，小便赤涩，大便秘结，舌红少苔，脉细数。其中医治法是

- A.清热利湿，祛风通络
- B.养阴清热，祛风通络
- C.祛风散寒，清热化湿
- D.活血化瘀，祛痰通络
- E.益肝肾，补气血，祛风湿，通经络

参考答案：B

参考解析：根据症状辨证为阴虚内热证，治法为养阴清热，祛风通络，代表方为丁氏清络饮加减。选项B正确当选。

50.患者痲病久发，头晕目眩，两目干涩，心烦失眠，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A.醒脾汤
- B.黄连温胆汤
- C.龙胆泻肝汤合涤痰汤
- D.左归丸
- E.定痫丸

参考答案：D

参考解析：痲病肝肾阴虚证，证候：痲病日久，头晕目眩，两目干涩，心烦失眠，腰膝酸软，舌质红少苔，脉细数。治法：补益肝肾，育阴息风。方药：左归丸加减。选项D正确当选。

51.患者，女，68岁。既往有高血压病史。今晨起床时发现右侧偏瘫，口眼歪斜，言语不利，头晕，手足麻木，肌肤不仁，舌暗，舌苔薄白，脉浮数。查体：血压170/80mmHg。头颅CT检查未见异常。应首先考虑的诊断是

- A.高血压。痰热腑实，风痰上扰证
- B.高血压。阴虚风动证
- C.高血压，脑出血。痰热腑实，风痰上扰证
- D.高血压，脑梗死。风痰瘀血，痹阻脉络证
- E.高血压，脑梗死。肝阳暴亢，风火上扰证

参考答案：D

参考解析：患者既往有高血压病史，血压170/80mmHg，诊断为高血压。未出现头痛症状，因此排除脑出血。右侧偏瘫，口眼歪斜，言语不利，头晕，手足麻木，肌肤不仁为中风（脑梗死）的表现。辨证为风痰瘀血，痹阻脉络证。选项D正确当选。

52.患者，男，25岁。因昏迷而送来急诊。查体：深昏迷状态，呼吸有轻度大蒜味，疑为有机磷杀虫药中毒。下列哪项对诊断最有帮助

- A.瞳孔缩小

- B. 呕吐物有大蒜臭味
- C. 大小便失禁
- D. 肌肉抽动
- E. 全血胆碱酯酶活力降低

参考答案：E

参考解析：全血胆碱酯酶活力降低是对有机磷杀虫药中毒诊断最有帮助的辅助检查。瞳孔缩小、大小便失禁是由于副交感神经末梢过度兴奋，产生的毒蕈碱样症状。选项E正确当选。

53. 患者，男，20岁。肌注青霉素后突然晕倒，血压测不到。应首先采取的抢救措施是

- A. 立即静脉点滴呋塞米（速尿）
- B. 静脉点滴5%碳酸氢钠
- C. 立即皮下注射肾上腺素
- D. 静脉注射间羟胺
- E. 静脉点滴20%甘露醇

参考答案：C

参考解析：对于过敏性休克的紧急治疗应首先采取的抢救措施是立即皮下注射肾上腺素加强心肌收缩，提高心功能。选项C正确当选。

54. 患者，女，55岁。喘息，气粗，胁胀，喉中痰鸣，咳痰色黄，黏稠，口苦，身热，面赤，舌红苔黄厚，脉弦滑。应选用的方剂是

- A. 小青龙汤
- B. 麻黄汤
- C. 桑白皮汤
- D. 六君子汤
- E. 三子养亲汤

参考答案：C

参考解析：根据患者临床表现诊断为喘证之痰热郁肺证，治法为清热化痰，宣肺平喘，代表方为桑白皮汤加减。选项C正确当选。

55. 患者，女，68岁。心烦少寐，入睡困难，多梦，头晕目眩，手足心热，盗汗，耳鸣，舌红，少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 黄连阿胶汤
- B. 黄连阿胶汤合六味地黄丸
- C. 归脾汤
- D. 安神定志丸
- E. 六味地黄丸

参考答案：B

参考解析：患者心烦少寐，入睡困难，可诊断为不寐。多梦，头晕目眩，手足心热，盗汗，耳鸣，舌红，少苔，脉细数，辨证为心肾不交证。治法为滋阴降火，交通心肾。方选六味地黄丸合黄连阿胶汤加减。选项B正确当选。

56. 患者，男，52岁，大便干，排出困难，小便清长，面色㿔白，四肢不温，腹中冷痛，腰膝酸冷，舌淡苔白，脉沉迟，其中医治法为

- A. 益气通便
- B. 温阳通便
- C. 补火助阳
- D. 回阳救逆
- E. 润肠通便

参考答案：B

参考解析：阳虚秘，证候：大便干或不干，排出困难，小便清长，面色白，四肢不温，腹中冷痛，或腰膝酸冷，舌淡苔白，脉沉迟。治法：温阳通便。方药：济川煎加减。选项B正确当选。

57.朱某，男，62岁，患鼓胀病多年，现腹大胀满，或见青筋暴露，面色晦滞，唇紫，口干而燥，心烦失眠，时或鼻衄，牙龈出血，小便短少，舌质红绛少津、苔少，脉弦细数。治法宜用

- A.活血化瘀，行气利水
- B.滋肾柔肝，养阴利水
- C.温中健脾，行气利水
- D.温补脾肾，化气行水
- E.以上都不是

参考答案：B

参考解析：鼓胀阴虚水停证，证候：腹大胀满，或见青筋暴露，面色晦滞，唇紫，口干而燥，心烦失眠，时或鼻衄，牙龈出血，小便短少，舌质红绛少津，苔少或光剥，脉弦细数。治法：滋肾柔肝，养阴利水。方药：六味地黄丸合一贯煎加减。选项B正确当选。

58.患者女性，40岁，现症见胁肋胀痛，口苦口黏，胸闷纳呆，恶心呕吐，小便黄赤，大便不爽，身目发黄，舌红苔黄腻，脉弦滑数。其中医辨证为

- A.肝郁气滞证
- B.肝胆湿热证
- C.肝阴不足证
- D.肝胃不和证
- E.胆郁脾虚证

参考答案：B

参考解析：胁痛肝胆湿热证，证候：胁肋胀痛或灼热疼痛，口苦口黏，胸闷纳呆，恶心呕吐，小便黄赤，大便不爽，或兼有身热恶寒，身目发黄，舌红苔黄腻，脉弦滑数。治法：清热利湿。方药：龙胆泻肝汤加减。选项B正确当选。

59.患者，女，41岁。水肿多年，腰以下为甚，按之不易复起，脘腹胀闷，纳呆便溏，面色萎黄，神倦肢冷，小便短少。舌淡胖，边有齿痕，舌苔白腻，脉沉弱，根据辨证论治应该选的治疗方剂为

- A.实脾饮
- B.济生肾气丸合真武汤
- C.胃苓汤合五皮饮
- D.参苓白术散
- E.越婢加术汤

参考答案：A

参考解析：水肿脾阳虚衰证：水肿日久，腰以下为甚，按之凹陷不易恢复，脘腹胀闷，纳呆便溏，面色萎黄，神疲乏力，四肢倦怠，小便短少，舌质淡，苔白腻或白滑，脉沉缓或沉弱。治法：温运脾阳，以利水湿。方药：实脾饮加减。选项A正确当选。

60.患者，女，26岁。因产后大出血，突然昏厥，面色苍白，口唇无华，四肢震颤，自汗肢冷，目陷口张，呼吸微弱，舌质淡，脉芤。其治法是

- A.补养气血
- B.补气，回阳，醒神
- C.平肝潜阳，理气通瘀

D.益气养血，化瘀通络

E.平肝潜阳，理气通瘀

参考答案：A

参考解析：血厥虚证，证候：多见于吐衄、便血或崩漏之后，突然昏厥，面色苍白，呼吸低微，口唇无华，四肢震颤，自汗肢冷，舌质淡，脉充或细数无力。治法：补益气血。方药：先服独参汤以固脱，继服人参养荣汤或当归补血汤加减。选项A正确当选。

61.患者，女，35岁，头痛，眩晕，耳鸣，目干畏光，视物不明，急躁易怒，舌红少津，脉弦细数。治疗应首选的方剂是

A.补肝汤

B.丹栀逍遥散

C.天王补心丹

D.知柏地黄丸

E.左归丸

参考答案：A

参考解析：虚劳肝阴虚证。证候：头痛，眩晕，耳鸣，目干畏光，视物不明，急躁易怒，或肢体麻木，筋惕肉，面潮红，舌红少津，脉弦细数。治法：滋养肝阴。方药：补肝汤加减。

62.患者咳逆喘息不得卧，咳吐白沫量多，受寒后加重，腰背痛，舌苔白腻，脉弦紧。其中医诊断是

A.喘证，痰浊阻肺证

B.喘证，风寒壅肺证

C.支饮，寒饮伏肺证

D.痰饮，脾阳虚弱证

E.悬饮，邪犯胸肺证

参考答案：C

参考解析：患者咳逆喘息不得卧，咳吐白沫量多，可诊断为支饮。寒饮伏肺，遇寒引动，肺失宣降，故见咳逆，咳吐白沫，腰背痛，苔白腻，脉弦紧。辨证为寒饮伏肺证。选项C正确当选。

63.患者，男，65岁。慢性肺源性心脏病史5年。近日受凉后发热，喘息气粗，痰黄，黏稠难咯，溲黄便干，舌红苔黄腻，脉滑数。其证型是

A.痰浊阻肺

B.痰热郁肺

C.寒饮内停

D.阴竭阳脱

E.痰蒙神窍

参考答案：B

参考解析：外邪犯肺，肺热炽盛，炼液成痰，壅塞肺气则发热，喘息气粗，痰黄，黏稠难咯。里热炽盛，则溲黄便干。舌红苔黄腻，脉滑数，均为内有痰热之象。辨证为痰热郁肺。选项B正确当选。

64.患者，男，72岁。有急性心肌梗死病史。近1周来出现呼吸困难，卧则加重，伴咳嗽、咳痰、咯血、乏力、食欲不振、恶心、呕吐，心率120次/分。查体：颈静脉怒张，黄疸，肝大伴压痛，腹水。心脏听诊闻及三尖瓣收缩期杂音。应首先考虑的诊断是

A.左心衰竭

B.右心衰竭

C.全心衰竭



D.阵发性室上性心动过速

E.心房纤颤

参考答案：C

参考解析：患者症状表现为呼吸困难，卧则加重，咳嗽、咳痰、咯血，伴乏力、食欲不振、恶心、呕吐、心率增快，为左心衰表现。查体颈静脉怒张，黄疸，肝大伴压痛，腹水，为右心衰表现。故此患者诊断为全心衰竭。选项C正确当选。

65.患者男性，持续性上腹隐痛3个月，食欲不振，消瘦。查体：面色苍白，上腹部有压痛，未触及包块，肝、脾肋下未及。对确诊有帮助的检查是

A.纤维胃镜加活检

B.肝放射性核素扫描

C.B型超声检查

D.血清胃泌素测定

E.胃酸测定

参考答案：A

参考解析：胃镜及组织学检查胃镜及组织学检查是慢性胃炎诊断的最可靠方法。选项A正确当选。

66.患者男性，35岁。现脘膈痞闷，呕吐痰涎，进食发噎不利，口淡纳呆，大便时结时溏，舌体胖大，有齿痕，苔白厚腻，脉滑。其治疗方法为

A.疏肝和胃，降逆止痛

B.理气化痰，消食散结

C.燥湿健脾，消痰和胃

D.理气活血，软坚消积

E.清热燥湿，消痰和胃

参考答案：C

参考解析：该患者为胃癌的痰湿阻胃证。痰湿阻胃证证候：脘膈痞闷，呕吐痰涎，进食发噎不利，口淡纳呆，大便时结时溏，舌体胖大有齿痕，苔白厚腻，脉滑。治法：燥湿健脾，消痰和胃。方药：开郁二陈汤加减。

67.男性，30岁。腹泻3~5次/日，便稀时带黏液及血，两年来时重时轻。近3个月来低热，腹泻，8~10次/日，时有便血，左下腹有压痛。曾用磷霉素钙治疗无效。应首先考虑的诊断是

A.结肠癌

B.细菌性痢疾

C.肠结核

D.小肠吸收不良综合征

E.溃疡性结肠炎

参考答案：E

参考解析：患者腹泻，便稀时带黏液及血，低热，左下腹有压痛。考虑为溃疡性结肠炎。选项E正确当选。

68.患者刘某，男性，34岁。因身体不适就诊，全身浮肿，面色苍白，畏寒肢冷，腰脊冷痛，神疲，纳少，便溏，舌嫩淡胖，有齿痕，脉沉。尿常规检查见蛋白尿，血压160/90mmHg。应诊为慢性肾炎哪一型

A.肺肾气虚证

B.脾肾阳虚证

C.脾肾气虚证



D.肝肾阴虚证

E.气阴两虚证

参考答案：B

参考解析：慢性肾小球肾炎脾肾阳虚证，证候：全身浮肿，面色苍白，畏寒肢冷，腰脊冷痛，神疲，纳少，便溏，遗精，阳痿，早泄，或月经失调，舌质嫩淡胖，边有齿痕，脉沉细或沉迟无力。治法：温补脾肾。方药：附子理中丸或济生肾气丸加减。

69.孙某，因发热就诊，血常规示白细胞  $70 \times 10^9/L$ ，见大量幼稚细胞，骨髓象提示有核细胞增生活跃，原始细胞占 35%。患者表现为壮热，口渴多汗，烦躁，头痛面赤，咽喉肿痛，面颊肿胀疼痛，牙龈出血，舌质红绛，苔黄，脉大。应首先考虑的病证结合诊断是

A.白血病+痰热瘀阻证

B.再障+痰热瘀阻证

C.再障+热毒炽盛证

D.骨髓增生异常综合征+热毒炽盛证

E.白血病+热毒炽盛证

参考答案：E

参考解析：根据患者血常规及骨髓象考虑为白血病，壮热，口渴多汗，烦躁，头痛面赤，咽喉肿痛，面颊肿胀疼痛，牙龈出血，舌质红绛，苔黄，脉大。为热毒炽盛的证候表现。选项 E 正确当选。

70.罗某，男性，21 岁，患慢性髓细胞性白血病，现采用周期特异性抑制。DNA 合成的药物羟基脲，为控制疾病，拟采用中西医结合方法。患者面色萎黄，头晕眼花，心悸，心慌，疲乏无力，气短懒言，自汗，食欲减退，舌质淡，苔薄白，脉细弱。应如何辨证，采用何方治疗

A.阴虚内热证，青蒿鳖甲汤加减

B.气血两虚证，膈下逐瘀汤加减

C.气血两虚证，八珍汤加减

D.热毒壅盛证，犀角地黄汤加减

E.阴虚内热证，犀角地黄汤加减

参考答案：C

参考解析：气血两虚证证候：面色萎黄或苍白，头晕眼花，心悸，疲乏无力，气短懒言，自汗，食欲减退，舌质淡，苔薄白，脉细弱。治法：补益气血。方药：八珍汤加减。

71.患者，男，40 岁。既往有糖尿病病史。小便频数，混浊如膏，甚至饮一溲一，耳轮干枯，腰膝酸软，四肢欠温，畏寒怕冷，阳痿，舌淡苔白，脉沉细无力。其证型是

A.痰瘀互结

B.气阴两虚

C.阴虚燥热

D.阴阳两虚

E.脉络瘀阻

参考答案：D

参考解析：患者肾阳亏虚，温煦不足而见四肢欠温、畏寒怕冷、阳痿；肾虚下元固摄无力而见小便频数；气化不足而见小便混浊如膏；肾开窍于耳，肾精不足见耳轮干枯。舌淡苔白、脉沉细无力均为阳虚之象。辨证为阴阳两虚证。选项 D 正确当选。

72.某女，35 岁，两手指间和掌指关节强直不舒 2 年，近 2 周病情加重，关节疼痛，肿大变形，伴活动受限。查血沉 45mm/h，类风湿因子(++)。当诊断为

A.痛风



- B.风湿性关节炎
- C.类风湿关节炎
- D.系统性红斑狼疮
- E.骨性关节炎

参考答案：C

参考解析：结合患者的关节症状以及实验室检查血沉升高，类风湿因子阳性，考虑该患者为类风湿关节炎。

73.患者，男，51岁。高血压病史20年。平素头晕目眩，头重如蒙，肢体麻木，胸脘痞闷。现症：突然出现短暂性神经功能缺失，彩色经颅多普勒（TCD）可见血管狭窄、动脉粥样硬化斑块。应首先考虑的诊断是

- A.腔隙性梗死
- B.TIA
- C.蛛网膜下腔出血
- D.脑栓塞
- E.癫痫

参考答案：B

参考解析：TIA多数在50岁以上发病，有高血压、高脂血症、糖尿病等病史，突然局灶性神经功能缺失发作，彩色经颅多普勒（TCD）可见血管狭窄、动脉粥样硬化斑块。选项B正确当选。

74.某男，35岁，被人发现时躺在公园一角落，呈半昏迷状态，便急送医院。体检：体温、血压正常，神志不清，两侧瞳孔针尖大小，口角流涎，口唇紫绀，呼吸急促，两肺满布水泡音，心率60次/分钟，肌肉有震颤。迅速洗胃，洗出液有大蒜味。可能的诊断是

- A.有机磷杀虫药中毒
- B.酒精中毒
- C.CO中毒
- D.中暑
- E.安定中毒

参考答案：A

参考解析：患者躺在公园，以及结合患者其他中毒症状以及洗出液的气味儿考虑患者为有机磷杀虫药中毒。

75.某女，咳嗽咽痒，声重气急，痰稀色白，头痛鼻塞，流清涕，骨节酸痛，恶寒，发热，无汗，舌苔薄白，脉浮或浮紧。其中医治法是

- A.疏风清热，宣肺止咳
- B.疏风散寒，宣肺止咳
- C.疏风清肺，润燥止咳
- D.轻宣凉燥，润肺止咳
- E.温肺化饮，散寒止咳

参考答案：B

参考解析：急性支气管炎风寒袭肺证，证候：咳嗽初起，声重气急，咽痒，痰稀色白，多伴有头痛鼻塞，流清涕，骨节酸痛，恶寒，或有发热，无汗等表证，舌苔薄白，脉浮或浮紧。治法：疏风散寒，宣肺止咳。方药：三拗汤合止嗽散加减。选项B正确当选。

#### 综合分析题

某女，35岁，一周因跑步吸入冷空气后出现干咳气促、伴少量黏液痰，现咳嗽加剧，

咳痰白稀，气促明显，伴头痛鼻塞、骨节酸痛、恶寒。查体：体温 38.8℃，两肺闻及散在干、湿啰音，部位不固定，咳嗽后啰音消失，余未查及异常。舌淡红，苔薄白。脉浮紧。血常规：白细胞  $10.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.68。

76.应首先考虑的病证诊断是

- A.普通感冒（风寒束表证）
- B.支原体肺炎（风热犯肺证）
- C.急性上呼吸道感染（外寒内饮证）
- D.大叶性肺炎（痰热郁肺证）
- E.急性支气管炎（风寒袭肺证）

参考答案：E

参考解析：患者“一周内吸入冷空气，干咳气促、伴少量黏液痰，现咳嗽加剧，咳痰白稀，气促明显，伴头痛鼻塞、骨节酸痛、恶寒。两肺闻及散在干、湿啰音，部位不固定，咳嗽后啰音消失。舌淡红，苔薄白。脉浮紧。”可考虑为急性支气管炎风寒袭肺证。选项 E 正确当选。

77.以下哪种治疗措施是不恰当的

- A.适当休息，注意保暖，多饮暖水
- B.应用解热镇痛药复方阿司匹林
- C.选用茶碱类平喘药
- D.应用抗生素治疗
- E.注意保暖，避免吸入冷空气

参考答案：D

参考解析：一般不主张应用抗生素治疗急性支气管炎，但有细菌感染证据时应及时使用。选项 D 正确当选。

78.治疗此证应首选的方剂是

- A.三拗汤合止嗽散加减
- B.杏苏散加减
- C.二陈汤合三子养亲汤加减
- D.小青龙汤加减
- E.麻杏石甘汤加减

参考答案：A

参考解析：急性支气管炎风寒袭肺证，治法：疏风散寒，宣肺止咳。方药：三拗汤合止嗽散加减。选项 A 正确当选。

79.若患者肺热内郁，咳痰渐黄，可酌情加

- A.生石膏、黄芩
- B.半夏、厚朴
- C.桔梗、甘草
- D.百部、紫菀
- E.前胡、瓜蒌

参考答案：A

参考解析：若夹痰湿，咳而痰黏，胸闷，加半夏、厚朴、茯苓以燥湿化痰；若风寒外束，肺热内郁，加生石膏、桑白皮、黄芩以解表清里。选项 A 正确当选。

#### 综合分析题

患者，男，65岁。支气管哮喘史30余年，近1年咳嗽、咳痰、喘息、憋闷，夜间憋喘

加剧，常出现夜间阵发性呼吸困难伴咳嗽，不能平卧。现呼吸困难，咳嗽，咳痰，形冷畏寒，神情淡漠，食欲不振，小便不利。查体：口唇发绀，颈静脉怒张，下肢水肿，心音遥远，三尖瓣区收缩期杂音，心率 95 次/分，律不齐，双肺哮鸣音及肺底湿性啰音。舌胖质暗，苔白滑，脉沉细。

80. 首先考虑的病证诊断是

- A. 肺源性心脏病（气虚血瘀证）
- B. 慢性阻塞性肺病（痰热郁肺证）
- C. 肺源性心脏病（阳虚水泛证）
- D. 支气管扩张（痰浊壅肺证）
- E. 支气管哮喘（阳虚水泛证）

参考答案：C

参考解析：根据该患者病史及证候表现可考虑为肺源性心脏病阳虚水泛证。选项 C 正确当选。

81. 以下哪项不是可能出现的并发症

- A. 肺纤维化
- B. 心律失常
- C. 消化道出血
- D. 肺性脑病
- E. 酸碱平衡失调及电解质紊乱

参考答案：A

参考解析：慢性肺源性心脏病的并发症：1. 肺性脑病。2. 酸碱平衡失调及电解质紊乱。3. 心律失常。4. 休克。5. 消化道出血。6. 其他：功能性肾衰竭、弥散性血管内凝血（DIC）等。选项 A 正确当选。

82. 以下哪项是不恰当的处理方式

- A. 使用抗生素控制感染
- B. 使用  $\beta$  受体阻滞剂控制心律失常
- C. 使用氧疗纠正缺氧和二氧化碳潴留
- D. 使用肝素预防肺内小动脉栓塞
- E. 使用利尿剂控制心力衰竭

参考答案：B

参考解析：慢性肺心病一般经过治疗，感染控制、缺氧纠正后，心律失常可自行消失。如果持续存在可根据心律失常的类型选用药物，但应避免使用  $\beta$  受体阻滞剂，以免引起支气管痉挛。选项 B 正确当选。

83. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 补肺汤加减
- B. 真武汤合五苓散加减
- C. 涤痰汤加减
- D. 越婢加半夏汤加减
- E. 苏子降气汤加减

参考答案：B

参考解析：肺心病阳虚水泛证，方药：真武汤合五苓散加减。选项 B 正确当选。

84. 血瘀甚，发绀明显者，可用

- A. 泽兰、红花
- B. 汉防己、川椒目
- C. 赤芍、牛膝

D.葶苈子、茯苓

E.钩藤、全蝎

参考答案：A

参考解析：发绀明显者，加泽兰、红花、北五加皮以活血利水；水肿较剧，上凌心肺者，加汉防己、川椒目、葶苈子以泻肺逐水。选项A正确当选。

#### 综合分析题

女，58岁，既往患有冠心病8年，近3月来时感心悸、胸闷、头晕、乏力，活动后气促明显。查体：面色无华，心率160次/分，心律不齐，第一心音强弱不等，脉率80次/分。舌质淡，苔薄白，脉细弱。心电图检查：P波消失，f波频率450次/分，QRS波宽大畸形，心室率160次/分。

85.首先考虑的诊断是

A.房颤

B.房扑

C.早搏

D.室上性心动过速

E.室性心动过速

参考答案：A

参考解析：根据患者的临床表现及心电图检查可考虑为房颤。选项A正确当选。

86.以下处理措施不恰当的是

A.若合并瓣膜病变，需应用华法林抗凝

B.使用β受体阻滞剂控制心室率

C.监测凝血功能，使INR维持在1.0~2.0

D.使用地高辛控制心室率

E.若心功能不全的患者首选胺碘酮进行心律转复

参考答案：C

参考解析：华法林是房颤抗凝治疗的有效药物。口服华法林，使凝血酶原时间国际标准化比值(INR)维持在2.0-3.0，能安全而有效地预防脑卒中发生。选项C正确当选。

87.中医治法是

A.活血化瘀，理气通络

B.补血养心，益气安神

C.镇惊定志，养心安神

D.益气养阴，养心安神

E.温补心阳，安神定悸

参考答案：B

参考解析：快速心律失常心血不足证，证候：心悸气短，活动尤甚，眩晕乏力，面色无华，舌质淡，苔薄白，脉细弱。治法：补血养心，益气安神。选项B正确当选。

88.治疗此证应首选的方剂是

A.天王补心丹加减

B.归脾汤加减

C.生脉散加减

D.参附汤合桂枝甘草龙骨牡蛎汤加减

E.黄连温胆汤加减

参考答案：B

参考解析：快速心律失常心血不足证，方药：归脾汤加减。选项 B 正确当选。

89.若气虚血少，血不养心，宜

- A.加麦冬、玉竹、五味子
- B.用炙甘草汤
- C.合用知柏地黄丸养阴清热
- D.加生地黄、麦冬、玉竹
- E.加丹参、三七

参考答案：B

参考解析：气虚血少，血不养心，宜用炙甘草汤益气养血，滋阴复脉。选项 B 正确当选。

#### 综合分析题

患者，男，65岁，发现高血压10余年，近半年来自感疲乏无力，1月前出现活动后喘憋、夜间呼吸困难，不能平卧，偶有憋醒，伴咳嗽，胸闷，气短，心悸，自汗，少尿。查体：面色暗淡，口唇青紫，颈动脉怒张，踝部水肿，双肺可闻及散在的湿啰音。舌质紫暗，有瘀斑，脉虚涩。心电图检查：陈旧性前壁心肌梗死。X线检查：心影增大。

90.首先考虑的诊断是

- A.慢性心力衰竭
- B.急性心力衰竭
- C.肺源性心脏病
- D.心肌梗死
- E.肺动脉栓塞

参考答案：A

参考解析：根据患者的症状表现可考虑为慢性心力衰竭。选项 A 正确当选。

91.针对该患者，以下实验室检查结果不合理的是

- A.心电图：ST段抬高
- B.心脏射血分数：40%
- C.BNP：86pg/mL
- D.血浆 NT-pro-BNP：500pg/mL
- E.X线检查：肺门影呈蝴蝶状

参考答案：C

参考解析：BNP：有助于 CHF 诊断和预后判断。症状性和无症状性左室功能障碍患者血浆 BNP 水平均升高；大多数因心衰(HF)而呼吸困难的患者  $BNP > 400pg/mL$ ， $BNP < 100pg/mL$  时不支持 HF 诊断，BNP 在  $100 \sim 400pg/mL$  之间还应考虑其他原因，如肺栓塞、慢性阻塞性肺部疾病(COPD)、HF 代偿期等。选项 C 正确当选。

92.中医治法是

- A.补益心肺，活血化瘀
- B.益气养阴，活血化瘀
- C.健脾化湿，温阳利水
- D.降气化痰，活血化瘀
- E.益气养血，温通心脉

参考答案：A

参考解析：慢性心衰气虚血瘀证，证候：心悸怔忡，胸闷气短，甚则喘咳，动则尤甚，神疲乏力，面白或暗淡，自汗，口唇青紫，甚者胁痛积块，颈动脉怒张，舌质紫暗或有瘀斑，脉虚涩或结代。治法：补益心肺，活血化瘀。选项 A 正确当选。

93.治疗此证应首选的方剂是

- A.参附汤合五苓散加减
- B.葶苈大枣泻肺汤合丹参饮加减
- C.生脉饮合血府逐瘀汤加减
- D.保元汤合血府逐瘀汤加减
- E.苓桂术甘汤合保元汤加减

参考答案：D

参考解析：慢性心衰气虚血瘀证，方药：保元汤合血府逐瘀汤加减。选项D正确当选。

94.若出现饮停咳喘者，可以合用

- A.葶苈大枣泻肺汤
- B.苇茎汤合温胆汤
- C.金匱肾气丸
- D.炙甘草汤
- E.桂枝加厚朴杏子汤

参考答案：A

参考解析：若饮停喘咳者，合用葶苈大枣泻肺汤。选项A正确当选。

综合分析题

患者男性，56岁。风湿性心脏病20年。现喘促气急，痰涎上涌，咳嗽，咯粉红色泡沫痰，颜面灰白，口唇青紫，汗出肢冷，烦躁不安，舌质暗红，苔白腻，脉细促。

95.治疗方剂是

- A.生脉散
- B.肾气丸
- C.参附汤
- D.真武汤
- E.人参养荣汤

参考答案：D

参考解析：喘促气急，痰涎上涌，咳嗽，咯粉红色泡沫痰，颜面灰白，口唇青紫，汗出肢冷，烦躁不安，舌质暗红，苔白腻，脉细促。治法：温肾助阳，泻肺行水。方药：真武汤合葶苈大枣泻肺汤加减。选项D正确当选。

96.梨形心是哪个瓣膜病变

- A.二尖瓣狭窄
- B.二尖瓣关闭不全
- C.主动脉瓣狭窄
- D.主动脉瓣关闭不全
- E.三尖瓣狭窄

参考答案：A

参考解析：二尖瓣狭窄梨形心，左心房增大，后前位见于左心缘变直，右心缘有双心房影。选项A正确当选。

97.其证型是

- A.气阴两虚证
- B.气虚血瘀证
- C.阳虚水泛证
- D.心阳虚脱证

E.心肾阳虚证

参考答案：C

参考解析：阳虚水泛证：喘促气急，痰涎上涌，咳嗽，咯粉红色泡沫痰，颜面灰白，口唇青紫，汗出肢冷，烦躁不安，舌质暗红，苔白腻，脉细促。选项C正确当选。

综合分析题

患者，男，63岁。胃溃疡病史7年，近半年来上腹疼痛发作频繁，腹痛无规律，体重减轻，消瘦乏力，少气懒言。查体：消瘦，贫血貌，左侧锁骨上淋巴结肿大，上腹部振水音，可扪及上腹部肿块，质坚而不规则，可有压痛。舌淡白，苔薄白，边有齿痕。脉沉细无力。X线钡餐检查：胃窦部胃壁僵硬、皱襞中断，充盈缺损，边缘不整齐，半月征。

98.首先考虑的诊断是

- A.胃窦胃癌
- B.慢性萎缩性胃炎
- C.胰头癌
- D.慢性胆囊炎
- E.慢性胰腺炎

参考答案：A

参考解析：根据患者“63岁。胃溃疡病史7年，近半年来上腹疼痛发作频繁，腹痛无规律，体重减轻”，“消瘦，贫血貌，左侧锁骨上淋巴结肿大，上腹部振水音，可扪及上腹部肿块，质坚而不规则，可有压痛”可考虑为胃癌。根据X线检查可知为胃窦胃癌。选项A正确当选。

99.进一步确诊检查首选

- A.幽门螺杆菌检测
- B.胃液分析
- C.血清胃泌素测定
- D.胃镜结合胃黏膜活检
- E.癌胚抗原检查

参考答案：D

参考解析：胃镜结合黏膜活检是诊断胃癌最可靠的手段。选项D正确当选。

100.中医治法是

- A.益气养血，健脾和营
- B.理气活血，软坚消积
- C.温中散寒，健脾益气
- D.理气化痰，消食散结
- E.疏肝和胃，降逆止痛

参考答案：A

参考解析：根据“体重减轻，消瘦乏力，少气懒言”，“舌淡白，苔薄白，边有齿痕。脉沉细无力”可辨证为气血两虚证，治法为益气养血，健脾和营。选项A正确当选。

101.治疗此证应首选的方剂是

- A.柴胡疏肝散加减
- B.海藻玉壶汤加减
- C.理中汤合四君子汤加减
- D.膈下逐瘀汤加减
- E.八珍汤加减



参考答案：E

参考解析：气血两虚证方药选用八珍汤加减。选项E正确当选。

#### 综合分析题

患者，女，22岁。寒战高热，腰痛，尿频、尿急、灼热刺痛，舌红苔黄腻，脉滑数。查体：体温39℃，双肾区叩击痛。实验室检查：血白细胞 $19.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞90%，尿白细胞20个/高倍视野。

102.应首先考虑的病证结合诊断是

- A.急性肾盂肾炎，膀胱湿热证
- B.急性肾盂肾炎，肝胆郁热证
- C.急性膀胱炎，膀胱湿热证
- D.急性膀胱炎，肝胆郁热证
- E.尿路感染，膀胱湿热证

参考答案：A

参考解析：由患者的症状以及实验室检查可知，该患者为尿路感染膀胱湿热证。选项A正确当选。

103.治疗应首选的方剂是

- A.八正散
- B.丹栀逍遥散合石韦散
- C.无比山药丸
- D.知柏地黄汤
- E.金匱肾气丸

参考答案：A

参考解析：尿路感染膀胱湿热证，治法：清热利湿通淋。方药：八正散加减。选项A正确当选。

#### 综合分析题

患者，女，32岁。5日前突发畏寒、高热，3日前热退。今日再现高热，伴头痛、乏力、口渴欲饮、出汗、口腔溃疡、咽喉肿痛。查体：体温40T，面色潮红，心率110次/分。舌质红绛，苔黄，脉滑数。血常规检查：血红蛋白110g/L，中性粒细胞 $0.46 \times 10^9/L$ ，血小板 $300 \times 10^9/L$ 。

104.首先考虑的诊断是

- A.急性白血病
- B.急性再生障碍性贫血
- C.骨髓增生异常综合征
- D.白细胞减少症
- E.粒细胞缺乏症

参考答案：E

参考解析：根据患者中性粒细胞 $0.46 \times 10^9/L$ ，考虑为粒细胞缺乏症。选项E正确当选。

105.中医证型是

- A.气血两虚证
- B.脾肾亏虚证
- C.气阴两虚证
- D.肝肾阴虚证

E.外感温热证

参考答案：E

参考解析：外感温热证，证候：发热不退，口渴欲饮，面赤咽痛，头晕乏力，舌质红绛，苔黄，脉滑数或细数。选项E正确当选。

106.中医治法是

A.益气养阴

B.温补脾肾

C.滋补肝肾

D.清热解毒，滋阴凉血

E.益气养血

参考答案：D

参考解析：治法：清热解毒，滋阴凉血。选项D正确当选。

107.治疗此证应首选的方剂是

A.犀角地黄汤合玉女煎加减

B.黄芪建中汤合右归丸加减

C.生脉散加减

D.六味地黄丸加减

E.归脾汤加减

参考答案：A

参考解析：方药：犀角地黄汤合玉女煎加减。选项A正确当选。

综合分析题

患者，女，40岁。半年来自觉疲乏无力，不欲饮食，泛泛欲吐，并伴记忆力减退。查体：双侧甲状腺弥漫性对称性肿大，质韧，表面光滑，无触痛，可扪及锥体叶。舌质暗，有瘀斑瘀点，苔白腻，脉细涩。甲状腺功能检查：血清TPOAb升高，TgAb升高。

108.首先考虑的诊断是

A.甲状腺癌

B.桥本甲状腺炎

C.甲亢

D.甲减

E.单纯性甲状腺肿

参考答案：B

参考解析：桥本甲状腺炎凡中年妇女，出现甲状腺弥漫性对称性肿大，特别是伴锥体叶肿大者，质地较坚实，无论甲状腺功能是否正常，均应疑为本病；如血清中TPOAb及TgAb明显增高，确诊可成立。选项B正确当选。

109.其中医证型是

A.肝郁脾虚证

B.痰瘀凝结证

C.肝肾阴虚证

D.脾肾阳虚证

E.脾胃虚弱证

参考答案：B

参考解析：痰瘀凝结证，证候：甲状腺肿大，质地较硬，或有疼痛，疲倦乏力，纳呆欲吐，舌质暗，或有瘀斑瘀点，苔白腻，脉细涩。选项B正确当选。

110.其中医治疗是

- A.疏肝健脾，行气化痰
- B.滋补肝肾，软坚消瘿
- C.温补脾肾，化气行水
- D.行气化痰，活血消瘿
- E.益气健脾，温中补虚

参考答案：D

参考解析：治法：行气化痰，活血消瘿。选项D正确当选。

111.治疗此证应首选的方剂是

- A.逍遥散
- B.黄芪建中汤
- C.杞菊地黄丸加减
- D.四逆汤合五苓散加减
- E.二陈汤合桃红四物汤加减

参考答案：E

参考解析：方药：二陈汤合桃红四物汤加减。选项E正确当选。

综合分析题

患者，女，23岁。面部蝶形红斑，关节肌肉酸痛，皮肤紫斑，烦躁口渴，神昏谵语，手足抽搐，大便秘结，小便短赤，舌红绛苔黄腻，脉洪数。

112.本病的治法是

- A.清热祛风通络
- B.滋阴降火凉血
- C.清热活血熄风
- D.清热解毒凉血
- E.养肝熄风化瘀

参考答案：D

参考解析：根据题干所述，本病当属热毒炽盛、热入营血之证，治宜清热解毒凉血。选项D正确当选。

113.治疗系统性红斑狼疮气营热盛，应首选

- A.济生肾气丸
- B.清瘟败毒饮
- C.玉女煎
- D.八珍汤
- E.犀角地黄汤

参考答案：B

参考解析：系统性红斑狼疮气营热盛证，治法：清热解毒，凉血化斑。方药：清瘟败毒饮加减。选项B正确当选。

114.狼疮肾炎SLE最常见的病变是

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肾
- E.肺



参考答案：D

参考解析：狼疮肾炎是SLE最常见和严重的临床表现。肾衰竭是SLE死亡的常见原因。选项D正确当选。

#### 综合分析题

患者，男，15岁。因晚上房间内烧炭取暖，晨起被发现时昏睡不醒，面色潮红，口唇呈樱桃红色。查体：呼吸浅快，四肢肌张力增高。血液COHB.50%。

115.首先考虑的诊断是

- A.急性一氧化碳中毒
- B.糖尿病酮症酸中毒
- C.脑出血
- D.流行性脑脊髓膜炎
- E.脑血栓形成

参考答案：A

参考解析：患者房间烧炭，面色潮红，口唇呈樱桃红色，血液COHB.50%。考虑为急性一氧化碳中毒。选项A正确当选。

116.该患者属于

- A.轻度中毒
- B.单纯中毒
- C.中度中毒
- D.重度中毒
- E.闪电样中毒

参考答案：D

参考解析：血液COHB.50%，为重度中毒。选项D正确当选。

117.以下治疗措施不恰当的是

- A.高压氧纠正脑缺氧
- B.静脉滴注甘露醇防治脑水肿
- C.选用ATP、辅酶细胞色素大剂量维生素胞磷胆碱等
- D.保持呼吸道通畅
- E.血液透析

参考答案：E

参考解析：一氧化碳中毒治疗原则：迅速将病人搬离中毒现场，积极纠正缺氧，防治脑水肿，促进脑细胞恢复，对症治疗。E选项不属于一氧化碳中毒的治疗。选项E正确当选。

#### 综合分析题

郭某，男，59岁。连日来大便干结，伴见面色无华，心悸气短，头晕目眩，健忘，口唇色淡，舌质淡，苔白，脉细。

118.其证候是

- A.阳虚秘
- B.阴虚秘
- C.血虚秘
- D.冷秘
- E.热秘

参考答案：C

参考解析：血虚秘,证候：大便干结，面色无华，头晕目眩，心悸气短，健忘，口唇色淡，舌淡苔白，脉细。选项 C 正确当选。

119.此证的治法是

- A.泻热导滞，润肠通便
- B.温里散寒，通便止痛
- C.益气润肠
- D.温阳通便
- E.养血润燥

参考答案：E

参考解析：治法：养血润燥。选项 E 正确当选。

120.治疗此证应首选的方剂是

- A.麻子仁丸加减
- B.温脾汤加减
- C.黄芪汤加减
- D.润肠丸加减
- E.济川煎加减

参考答案：D

参考解析：方药：润肠丸加减。选项 D 正确当选。

配伍选择题

- A.射干麻黄汤
- B.定喘汤
- C.荆防败毒散加减
- D.银翘散加减
- E.新加香薷饮加减

121.某男，身热较著，微恶风寒，汗出不畅，头胀痛，目胀，鼻塞，流浊涕，口干而渴，咳嗽，痰黄黏稠，咽喉肿痛，舌苔薄白微，边尖红，脉浮数。治疗应首选的方剂是

参考答案：D

参考解析：急性上呼吸道感染风热犯表证，证候：身热较著，微恶风寒，汗出不畅，头胀痛，目胀，鼻塞，流浊涕，口干而渴，咳嗽，痰黄黏稠，咽燥，或咽喉肿痛，舌苔薄白微黄,边尖红，脉浮数。治法：辛凉解表。方药：银翘散或葱豉桔梗汤加减。选项 D 正确当选。

122.某女，恶寒重，发热轻，无汗，头痛，肢体酸痛，鼻塞声重喷嚏，时流清涕，咽痒，咳嗽，口不渴，舌苔薄白而润，脉浮或浮紧。治疗应首选的方剂是

参考答案：C

参考解析：急性上呼吸道感染风寒束表证，证候：恶寒重，发热轻，无汗，头痛，肢体酸痛，鼻塞声重，喷嚏，时流清涕，咽痒，咳嗽，口不渴或喜热饮，舌苔薄白而润，脉浮或浮紧。治法：辛温解表。方药：荆防败毒散加减。选项 C 正确当选。

配伍选择题

- A.一度房室传导阻滞
- B.二度 II 型房室传导阻滞
- C.二度 I 型房室传导阻滞
- D.三度房室传导阻滞
- E.窦房传导阻滞

123.P波与QRS波群无固定关系，可见室性自主心律的心电图表现是

参考答案：D

参考解析：三度房室传导阻滞时，心电图表现为窦性P波，PP间隔一般规则。P波与QRS波群无固定关系。心房速率快于心室率。心室率由交接区或心室自主起搏点维持。选项D正确当选。

124.PR间期固定，QRS波群有脱漏的心电图表现是

参考答案：B

参考解析：二度II型房室传导阻滞心电图可表现为PR间期固定。P波突然不能下传而QRS波群脱漏。选项B正确当选。

配伍选择题

- A.多为上腹正中或偏右节律性疼痛
- B.多为剑突下正中或偏左节律性疼痛
- C.上腹疼痛无典型节律性，呕吐多见
- D.上腹持续性剧烈疼痛
- E.右上腹节律性疼痛，夜间痛和背痛多见且突出

125.十二指肠球部溃疡的临床表现

参考答案：A

参考解析：十二指肠可以多位于上腹，可偏左或偏右。典型节律性。选项A正确当选。

126.幽门管溃疡的临床表现

参考答案：C

参考解析：幽门管溃疡常伴胃酸过多，缺乏典型溃疡的周期性和节律性疼痛，餐后即出现剧烈疼痛，制酸剂疗效差，易出现呕吐或幽门梗阻，易穿孔或出血。选项C正确当选。

配伍选择题

- A.血尿，高血压，蛋白尿，浮肿
- B.浮肿，贫血，高血压
- C.浮肿，大量蛋白尿，低蛋白血症
- D.血尿，蛋白尿
- E.少尿，浮肿，蛋白尿

127.以上为肾病综合征临床特征的是

参考答案：C

参考解析：原发性NS常无明显病史，部分病人有上呼吸道感染等病史；继发性NS常有明显的原发病史。临床常见“三高一低”（高度水肿、大量蛋白尿、高脂血症、低蛋白血症）经典的NS症状。选项C正确当选。

128.以上为慢性肾小球肾炎临床特征的是

参考答案：A

参考解析：慢性肾小球肾炎是由多种原因引起的、不同病理类型组成的原发于肾小球的一组疾病。以蛋白尿、血尿、水肿及高血压为基本临床表现，常伴有不同程度的肾功能损害。选项A正确当选。

配伍选择题

- A.桃红四物汤
- B.玉屏风散



C.补阳还五汤

D.玉女煎

E.犀角地黄汤

129.治疗原发免疫性血小板减少症阴虚火旺证应首选的方剂是

参考答案：D

参考解析：阴虚火旺证，治法：滋阴降火，清热止血。方药：茜根散或玉女煎。选项D正确当选。

130.治疗原发免疫性血小板减少症血热妄行证应首选的方剂是

参考答案：E

参考解析：血热妄行证，治法：清热凉血。方药：犀角地黄汤。选项E正确当选。

131.原发免疫性血小板减少症瘀血内阻证治宜选用

参考答案：D

参考解析：瘀血内阻证。证候：肌衄、斑色青紫，鼻衄、吐血、便血，血色紫暗，月经有血块，毛发枯黄无泽，面色黧黑，下睑色青，舌质紫暗或有瘀斑、瘀点，脉细涩或弦。治法：活血化瘀止血。方药：桃红四物汤加减。

配伍选择题

A.平胃散合桃红四物汤加减

B.血府逐瘀汤加减

C.肾气丸加减

D.七味白术散加减

E.杞菊地黄丸加减

132.治疗消渴气阴两虚证宜用

参考答案：D

参考解析：气阴两虚证，证候：口渴引饮，能食与便溏并见，或饮食减少，精神不振，四肢乏力，体瘦，舌质淡红，苔白而干，脉弱。治法：益气健脾，生津止渴。方药：七味白术散加减。

133.治疗消渴痰瘀互结证宜用

参考答案：A

参考解析：痰瘀互结证，证候：“三多”症状不明显，形体肥胖，胸脘腹胀，肌肉酸胀，四肢沉重或刺痛，舌暗或有瘀斑，苔厚腻，脉滑。治法：活血化瘀祛痰。方药：平胃散合桃红四物汤加减。

134.治疗消渴脉络瘀阻证宜用

参考答案：B

参考解析：脉络瘀阻证，证候：面色晦暗，消瘦乏力，胸中闷痛，肢体麻木或刺痛，夜间加重，唇紫，舌暗或有瘀斑，或舌下青筋紫暗怒张，苔薄白或少苔，脉弦或沉涩。治法：活血通络。方药：血府逐瘀汤加减。

配伍选择题

A.血沉增快

B.类风湿因子阳性

C.补体C3增高

D.白细胞计数减少

E.血常规正常

135.诊断类风湿关节炎最有价值的检查是

参考答案：B

参考解析：70%患者 IgM 型类风湿因子 RF 阳性，其滴度一般与本病的活动性和严重性呈比例。选项 B 正确当选。

136.诊断风湿活动期最有价值的检查是

参考答案：A

参考解析：血沉和 C 反应蛋白（CRP）为炎性标志物，常升高，并且与疾病的活动度相关。选项 A 正确当选。

配伍选择题

A.脑栓塞

B.脑血栓形成

C.脑出血

D.短暂性脑缺血发作

E.蛛网膜下腔出血

137.某青年男性，原有风湿性心脏病，突然出现中风，首先应考虑的是

参考答案：A

参考解析：在青年人中，风湿性心脏病仍是并发脑栓塞的重要原因。

138.患者，男，55 岁，因在剧烈运动时，突然出现剧烈头痛，呕吐，口舌歪斜，首先应考虑的是

参考答案：C

参考解析：脑出血多在活动或情绪激动时发病，主要表现为头痛、头晕、呕吐、意识障碍、肢体瘫痪、失语、大小便失禁等。

139.前晚迟睡，晨起发现口舌歪斜，半身不遂，语言不利，首先应考虑的是

参考答案：B

参考解析：脑血栓形成常在安静或休息状态下发病。

配伍选择题

A.毒蕈碱样症状

B.烟碱样症状

C.休克

D.心衰

E.呼吸衰竭

140.阿托品是对抗有机磷杀虫药中毒的

参考答案：A

参考解析：胆碱受体阻断药：阿托品为代表药物，主要作用于外周 M 胆碱能受体，缓解 M 样症状。选项 A 正确当选。

141.胆碱酯酶复活剂是解除有机磷杀虫药中毒的

参考答案：B

参考解析：胆碱酯酶复能药尚能对抗外周 N<sub>2</sub> 受体，控制肌纤维颤动等 N 样症状。选项 B 正确当选。

配伍选择题

A.肾上腺素



B.糖皮质激素

C.抑肽酶

D.多巴胺

E.维生素 C

142.感染性休克，治疗应首选的药物是

参考答案：B

参考解析：感染性休克治疗时可首选糖皮质激素。选项 B 正确当选。

143.过敏性休克，治疗应首选的药物是

参考答案：A

参考解析：肾上腺素主要用于过敏性休克，但对其他类型的休克，如果患者对其他升压药物无反应时可试用肾上腺素。选项 A 正确当选。

配伍选择题

A.荆防达表汤

B.五磨饮子

C.生脉散合补肺汤

D.参苏饮

E.加减葶苈汤

144.喘证肺气虚耗证，治疗应首选的方剂是

参考答案：C

参考解析：喘证肺气虚耗证，治法：补肺益气养阴。方药：生脉散合补肺汤加减。选项 C 正确当选。

145.喘证肺气郁痹证，治疗应首选的方剂是

参考答案：B

参考解析：喘证肺气郁痹证，治法：开郁降气平喘。方药：五磨饮子加减。选项 B 正确当选。

配伍选择题

A.大便清稀，完谷不化，腹部喜温

B.大便色黄褐而臭，泻下急迫，肛门灼热

C.泻下腹痛，痛势急迫拒按，泻后痛减

D.大便时溏时泻，腹痛不甚，喜温喜按

E.每因抑郁恼怒或情绪紧张之时，即发生腹痛泄泻

146.虚证泄泻的特点是

参考答案：D

参考解析：虚证泄泻的特点是大便时溏时泻，腹痛不甚，喜温喜按。

147.实证泄泻的特点是

参考答案：C

参考解析：实证泄泻的特点是泻下腹痛，痛势急迫拒按，泻后痛减。

148.热证泄泻的特点是

参考答案：B

参考解析：热证泄泻的特点是大便色黄褐而臭，泻下急迫，肛门灼热。

配伍选择题

A.清骨散

B.黄连温胆汤

C.补中益气汤

D.丹栀逍遥散

E.归脾汤

149.治疗痰湿郁热证应首选的方剂是

参考答案：B

参考解析：内伤发热之痰湿郁热证，治法：燥湿化痰，清热和中。方药：黄连温胆汤合中和汤加减。选项B正确当选。

150.治疗气郁发热证应首选的方剂是

参考答案：D

参考解析：内伤发热之气郁发热证，治法：疏肝理气，解郁泄热。方药：丹栀逍遥散加减。选项D正确当选。

