

# 2023 年护士执业资格考试

## 入学测试卷



考生姓名：\_\_\_\_\_

准考证号：\_\_\_\_\_

考场号：\_\_\_\_\_

金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

## 导读

2018年起,护士执业资格考试全面实行护士人机对话模式,顺利通过护士执业资格考试,除了学习专业的知识外,更要对这个考试系统有充分的了解和准备。

人机对话考试突破了传统考试方法表达试题形式的限制,利用声音、录像、图形等多媒体形式,真正做到视觉和听觉相结合、文字和画面相结合,借助典型病例和各种生动的画面(如典型体征、X线检查、心电图、超声心动图等)营造接近临床实际的环境,通过计算机显示,考生边观察、边分析、边判断、边回答问题,能较全面、真实地反映出考生解决临床问题的能力 and 水平。

人机对话的考试方式还可以准确地控制考试时间,设定的时间一旦用尽后,计算机将自动收卷,任何考生无法继续作答,确保了考试时间对所有考生的公平性。在人机对话考试整个过程中,计算机屏幕下方会显示答题进度和考试剩余时间,方便考生控制答题速度和掌握时间。对于参加考试的医学考生而言,除掌握专业知识和实践能力外,还应掌握计算机的基本操作,熟悉人机对话考试形式、题型和特点,方能取得好成绩。

### 注意事项:

考试进程的单向性:在进行“专业实务”科目考试时,在某一题型(如“单选题”)的测试过程中,考生是可以随时查看、修改此题型内任何一题的选择答案的,而一旦确认完成作答、进入新的题型时(如结束“单选题”,进入“不定项选择题”),考生将不能退回到前一测试题型(“单选题”)进行查看和修改答案。在进行“实践能力”科目考试时,针对每道案例分析题,只有完成前一个问题才能看到下一个问题,并且在确定进入下一个问题后是无法对前面问题的作答进行查看和修改的(如当确

认完成“第1问”,进入“第2问”后,考生无法查看或修改其“第1问”的选择)。因此考生须谨慎、认真作答。

操作提示部分位于屏幕下方,提示考试剩余时间、题量、当前答题进度,采用两条移动线条的形式,一条表示答题进度(答题进度条),另一条表示时间进度(时间进度条)。通过比较两者长短或完成百分率,形象地反映答题与时间使用的情况,在实际考试中注意两线的进展速度,若时间进度条的进展速度快于答题进度条时反映考生的答题速度较慢。

## 专业实务测试题

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E，五个备选答案，请从中选择一个最佳的答案。

- 在炎症早期用冷疗法的原理是
  - 加快细胞新陈代谢，增加白细胞的吞噬功能
  - 降低细胞的新陈代谢和微生物的活力
  - 通过传导降低体温
  - 降低神经末梢的敏感性
  - 收缩血管，减少渗出
- 以下属于医护合作性的健康问题是
  - 母乳喂养有效
  - 潜在并发症：心律失常
  - 有皮肤完整性受损的危险
  - 儿童缺乏照顾
  - 与血红蛋白降低有关
- 护士对 75 岁的老年患者进行皮肤状况的评估，下列信息中，表明患者的皮肤存在潜在问题的是
  - 皮肤弹性减弱
  - 皮肤色素沉着增多
  - 皮肤皱纹增多
  - 皮肤表面干燥粗糙
  - 皮肤存在硬结
- 慢性胃炎患者服用多潘立酮的最佳时间是
  - 晨起空腹
  - 餐前
  - 餐中
  - 餐后
  - 睡前
- 护士在工作中的坐姿，错误的是
  - 坐在椅子的前部 1/3~1/2 处
  - 上半身挺直，抬头
  - 目视前方，下颌微收
  - 双手交叉相握于腹前
  - 两膝并拢，两脚并拢
- 使用静脉留置针输液完毕并使用肝素液封管，但第 2 日仍然发生血液反流堵塞导管，不是导致堵管的可能原因是
  - 封管的肝素液量不够
  - 封管的肝素液浓度过大
  - 患者穿刺侧肢体活动过度
  - 患者静脉压过高
  - 推注封管液速度过快
- 属于开放式提问的是
  - 您昨天呕吐了几次
  - 您早餐后服过药了吗
  - 现在您头还晕吗
  - 您今天感觉怎么样
  - 您昨晚睡了几个小时
- 对类风湿关节炎的描述不正确的是
  - 基本病变是滑膜炎
  - 发病与自身免疫有关
  - 有皮下结节示病情活动
  - 类风湿因子为阳性
  - 不引起脏器损害
- 预防、医疗、保健机构发现艾滋病病毒感染者时，以下措施不正确的是
  - 身体约束
  - 留观
  - 给予宣教
  - 医学观察
  - 定期和不定期访视
- 对儿童生长发育规律的描述，错误的是
  - 生长发育是一个连续的过程
  - 生长发育遵循一定的顺序
  - 有一定的个体差异性
  - 各系统器官发育的速度一致
  - 生长发育是由低级到高级
- 脑死亡的诊断标准除外
  - 不可逆的深度昏迷
  - 自发呼吸停止

- C. 脑干反射消失
- D. 瞳孔散大而固定
- E. 脑电波平直

12. 医生 7:00 pm 下达医嘱 s. o. s, 其失效时间为

- A. 今天 12:00 pm
- B. 次日 12:00 pm
- C. 次日 7:00 am
- D. 次日 7:00 pm
- E. 次日 12:00 nm

13. 心肌梗死最常见的部位是

- A. 右心房
- B. 左心室前壁
- C. 左心室正后壁
- D. 右心室侧壁
- E. 左心房

14. 测量血压的方法, 错误的是

- A. 测量前安静休息 20~30 分钟
- B. 测量时将肱动脉、心脏处于同一水平
- C. 打气至 240 mmHg
- D. 袖带松紧以一指为宜
- E. 放气速度以 4 mmHg/s 为宜

15. 三凹征是指

- A. 胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷
- B. 胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在呼气时明显下陷
- C. 胸骨上窝、剑突下和肋间隙在吸气时明显下陷
- D. 胸骨上窝、剑突下和肋间隙在呼气时明显下陷
- E. 胸骨上窝、腹部和肋间隙在呼气时明显下陷

16. 给婴儿口服脊髓灰质炎减毒活疫苗时, 正确的做法是

- A. 用温热水送服
- B. 用热开水送服
- C. 冷开水送服或含服
- D. 热开水溶解后服用

E. 服后半小时可饮用热牛奶

17. 护士对抑郁症患者进行健康宣教时, 患者表示不耐烦, 此时护士的最佳反应是

- A. “你该认真听讲, 不然你的病会更重的。”
- B. “如果你不想听, 我陪您坐一会儿吧。”
- C. “你这样孤独对你没有好处, 这是为你好。”
- D. “不听可不行, 护士长会来检查的。”
- E. “不想听也行, 我把宣传材料放在这里, 您一会儿自己看吧。”

18. 流感传染期可达 1 周, 传染性最强的是在发病

- A. 5 天内
- B. 7 天内
- C. 4 天内
- D. 6 天内
- E. 3 天内

19. 某膀胱癌患者行保留膀胱术, 术后应用膀胱灌注法预防肿瘤复发。常用的灌注药物为

- A. 苯扎溴铵
- B. 硼酸水
- C. 抗菌药
- D. 干扰素
- E. 卡介苗

20. 影响正常排尿的因素中, 错误的是

- A. 老年人因膀胱肌张力下降, 有尿频症状
- B. 咖啡、含乙醇的饮料有利尿作用
- C. 气温高时大量出汗, 尿量减少
- D. 钠盐含量高的食物有利尿作用
- E. 大量饮水可增加尿量

21. HIV 感染后对免疫系统造成损害, 主要的机理是损害哪类细胞

- A. 中性粒细胞
- B. B 淋巴细胞
- C. CD4+T 淋巴细胞
- D. CD8+T 淋巴细胞
- E. 自然杀伤 (NK) 细胞

22. 以下属于护士权利的是
- A. 遵守法律、法规、规章和诊疗技术规范的规定
  - B. 保护患者隐私
  - C. 对医疗卫生机构和卫生主管部门的工作提出意见和建议
  - D. 发现患者病情危急，立即通知医生
  - E. 能力不足时不能参加病人的抢救
23. 治疗厌氧菌感染的急性盆腔炎最常使用的抗生素是
- A. 四环素
  - B. 克拉霉素
  - C. 万古霉素
  - D. 甲硝唑
  - E. 阿奇霉素
24. 对于滴虫阴道炎的治疗措施，错误的是
- A. 无症状带虫者应予以治疗
  - B. 哺乳期者用药 6 小时内可哺乳
  - C. 用酸性溶液阴道冲洗效果好
  - D. 未婚者可口服甲硝唑
  - E. 性伴侣同时治疗
25. 下列属于侵犯患者隐私权的是
- A. 未经患者许可对其体检时让医学生观摩
  - B. 对疑难病例进行科室内讨论
  - C. 在征得患者同意后其资料用于科研
  - D. 在患者病历上标注患有传染性疾病
  - E. 对患有淋病的患者询问其性生活史
26. 最易并发阻塞性肺气肿的疾病是
- A. 慢性支气管炎
  - B. 支气管哮喘
  - C. 慢性肺脓肿
  - D. 支气管扩张
  - E. 肺结核
27. 《献血法》规定，负责组织献血工作的机构是
- A. 地方各级人民政府
  - B. 地方各级采供血机构
  - C. 地方各级卫生行政部门
  - D. 县级以上人民政府
  - E. 行业协会
28. 正常妊娠 32 周末时宫底高度应为
- A. 脐上 3 横指
  - B. 脐与剑突之间
  - C. 耻骨联合上刚能触及
  - D. 脐耻之间
  - E. 剑突下 2 横指
29. 按照中医理论，开窍于舌的脏腑是
- A. 肺
  - B. 心
  - C. 脾
  - D. 肾
  - E. 肝
30. 在输血前要做血型鉴定和交叉配血试验的血制品是
- A. 全血
  - B. 血浆
  - C. 代血浆
  - D. 自体血
  - E. 冰冻血浆
31. 人体正常情况下，胰液进入十二指肠，在肠激酶的作用下首先激活的是
- A. 糜蛋白酶原
  - B. 胰蛋白酶原
  - C. 前磷脂酶
  - D. 前弹力蛋白酶
  - E. 激肽释放酶原
32. 慢性肺源性心脏病患者肺、心功能失代偿期最突出的表现是
- A. 呼吸困难加重，夜间更甚
  - B. 疲倦乏力，头晕心悸
  - C. 贫血
  - D. 多食、多饮
  - E. 多尿
33. 再生障碍性贫血产生的主要原因是
- A. 造血原料缺乏
  - B. 红细胞破坏过多
  - C. 红细胞丢失过多
  - D. 骨髓造血功能低下

- E. 幼红细胞代偿性增生
34. 非语言沟通的特点是
- A. 持续性
  - B. 局限性
  - C. 专业性
  - D. 生动性
  - E. 多变性
35. 医嘱：去痛片 0.5 g, q. 6h, p. r. n., 下述处理错误的是
- A. 抄写在长期医嘱栏内
  - B. 每次执行即在临时医嘱栏内记录
  - C. 两次使用间隔可小于 6 h
  - D. 需要停止医嘱方可取消
  - E. 停止医嘱时应写明停止日期
36. 给予某肝性脑病早期的患者口服乳果糖, 其药理作用是
- A. 补充膳食纤维
  - B. 减少氨的形成和吸收
  - C. 作为肝性脑病治疗的主要能量来源
  - D. 纠正氨基酸代谢比例失调
  - E. 抑制肠道细菌生长
37. 判断颅底骨折最有价值的临床表现是
- A. 眼睑淤血
  - B. 眼结膜下出血
  - C. 鼻孔流血
  - D. 脑脊液漏
  - E. 严重头痛
38. 水痘患者出疹的顺序是
- A. 斑疹、丘疹、疱疹、脓疱、结痂
  - B. 丘疹、斑疹、疱疹、脓疱、结痂
  - C. 疱疹、斑疹、丘疹、脓疱、结痂
  - D. 丘疹、疱疹、斑疹、脓疱、结痂
  - E. 斑疹、疱疹、丘疹、脓疱、结痂
39. 接种卡介苗患者结核菌素反应硬结的特点是
- A. 直径 10~15 mm
  - B. 颜色呈深红色
  - C. 质地较硬
  - D. 边缘不清楚
  - E. 反应持续 7~10 天
40. 正常人体体温在 24 小时内呈周期性波动, 体温最高出现在
- A. 上午 9~11 点
  - B. 中午 12 点左右
  - C. 午后 13~18 点
  - D. 清晨 2~6 点
  - E. 上午 7~8 点
41. 患者, 男, 63 岁。自感全身不适, 腹痛剧烈, 前来就诊。门诊护士巡视时发现他面色花白、出冷汗、呼吸急促。门诊护士应采取的措施是
- A. 安慰患者, 仔细观察
  - B. 让患者就地平卧休息
  - C. 为患者测量脉搏、血压
  - D. 安排患者提前就诊
  - E. 让医生加快诊治速度
42. 患者, 女, 30 岁。妊娠 10 个月急诊入院, 经产科医生检查已进入第二产程, 其标志是
- A. 宫口开全
  - B. 胎头拨露
  - C. 产妇屏气, 肛门放松
  - D. 宫缩时会阴膨出, 肛门放松
  - E. 胎先露降至坐骨棘水平
43. 患者, 女, 43 岁。因子宫肌瘤行子宫全切术, 术后第 2 天可将患者安置为
- A. 截石位
  - B. 头高足低位
  - C. 去枕仰卧位
  - D. 头低足高位
  - E. 半坐卧位
44. 对急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 的病情判断最有意义的检查是
- A. X 线胸片
  - B. 动脉血气分析
  - C. 血常规检查
  - D. 胸部 CT 检查
  - E. 肺功能检查
45. 患者, 男, 58 岁。行走时突感心前区压

榨样疼痛，放射到左肩，不得不停下站立休息，该患者的体位属于

- A. 自动体位
- B. 被动体位
- C. 被迫俯卧位
- D. 被迫患侧卧位
- E. 被迫站立位

46. 患者，男，33岁。肛门附近皮肤反复破溃、溢脓2年余。局部检查：肛周右侧距肛门约4cm处有乳头状隆起，挤压后有少许脓液排出。首先考虑的疾病是

- A. 内痔
- B. 外痔
- C. 盆腔脓肿
- D. 肛瘘
- E. 肛门周围脓肿

47. 患者，男，39岁。脑外伤术后，意识模糊，躁动，护士对其使用约束带，此时应重点观察的是

- A. 约束部位远端、肤色和皮温
- B. 神志是否清楚
- C. 衬垫是否垫好
- D. 卧位是否舒适
- E. 约束带是否松动

48. 患者，男，32岁。乙型肝炎，“大三阳”，护士为其进行治疗、护理后回到值班室，脱下的隔离衣悬挂正确的是

- A. 挂在值班室，清洁面朝外
- B. 挂在值班室，清洁面朝内
- C. 挂在病区走廊，清洁面朝外
- D. 挂在病室，清洁面朝外
- E. 挂在办公室，清洁面朝内

49. 患者，男，47岁。上消化道出血，重度营养不良，拟为其进行中心静脉穿刺补充营养，穿刺过程中不符合原则的是

- A. 中心静脉穿刺包须有标记和有效期（或失效期）
- B. 穿刺过程中手臂位于腰部水平以上
- C. 无菌物品与非无菌物品分别放置
- D. 导管穿刺前用无菌生理盐水冲洗

E. 穿刺包中多余的无菌物品可以为其他患者使用

50. 患者，男，48岁。车祸后下身瘫痪，白天依靠轮椅活动。对于该患者，压疮好发部位是

- A. 肘部
- B. 髌部
- C. 足趾
- D. 足跟
- E. 坐骨结节

51. 患者，男，26岁。因上呼吸道感染，遵医嘱服用磺胺类药物，护士嘱多饮水的主要目的是

- A. 降低药物毒性
- B. 减少对胃的刺激
- C. 减少对肾脏损害
- D. 提高疗效
- E. 减少对肝脏损害

52. 患者，男，42岁。病毒性脑炎，昏迷，为其进行床上擦浴时，操作错误的是

- A. 调节室温至24℃左右
- B. 遮挡患者，按需要给予便盆
- C. 脱衣应先脱对侧，后脱近侧
- D. 为外伤者先脱健侧，后脱患侧
- E. 擦浴后骨突处用50%乙醇做按摩

53. 患者，男，67岁。因严重肝病导致昏迷，呼吸微弱，浅而慢。护士为其测量呼吸的正确方法是

- A. 以1/4脉率计算
- B. 测脉率后观察胸腹起伏次数
- C. 计算所听到的呼吸音的次数
- D. 用手感觉呼吸气流通过的次数
- E. 用少许棉花置患者鼻孔，观察棉花飘动次数

54. 患者，女，38岁。上呼吸道感染，T 39.6℃，P 120次/min，R 24次/min，BP 110/70 mmHg。该患者的体温属于

- A. 低热
- B. 中度热
- C. 高热

- D. 超高热
- E. 正常

55. 患者，男性，33岁。活动后呼吸困难、心悸1年，在起立或运动时可出现眩晕，收住院，初步诊断为肥厚型心肌病。下列最有意义的检查是

- A. X线检查
- B. 心脏三位像
- C. 超声心动图
- D. 心电图
- E. 平板负荷试验

56. 患者，男，53岁。因下肢挤压伤致血清钾升高，出现心动过缓，心律不齐，应选用的药物是

- A. 毛花昔丙（西地兰）
- B. 普萘洛尔（心得安）
- C. 利多卡因
- D. 5%碳酸氢钠
- E. 10%葡萄糖酸钙

57. 患者，女，60岁。因胃溃疡出血行毕Ⅱ式手术，术后7日患者出现切口不完全裂开，经非手术处理后患者康复出院。今后可能发生的疝是

- A. 腹股沟斜疝
- B. 腹股沟脐疝
- C. 脑疝
- D. 腹股沟直疝
- E. 切口疝

58. 患者，女，45岁。患有宫颈癌，拟行经腹全子宫切除术，术前护士为其行阴道准备，正确的是

- A. 术前4天每日冲洗1次
- B. 术前5天每日冲洗1次
- C. 术前3天每日冲洗2次
- D. 术前2天每日冲洗2次
- E. 术前1天每日冲洗2次

59. 患者，男，70岁。输血10分钟后突发腰酸背痛、四肢麻木。护士紧急予以停止输血操作，并给予一系列治疗措施，其中正确的

是

- A. 加压吸氧
- B. 静脉注射碳酸氢钠
- C. 皮下注射肾上腺素
- D. 静脉注射10%葡萄糖酸钙
- E. 头低足高位

60. 患者，女，29岁。1年前被诊断为HIV阳性，此时患者肺部机会性感染最常见的病原体是

- A. 结核杆菌
- B. 肺孢子虫
- C. 疱疹病毒
- D. 巨细胞病毒
- E. 白色念珠菌

61. 患者，男，70岁。因呼吸衰竭行呼吸机辅助呼吸。提示患者出现了过度通气的体征是

- A. 烦躁不安
- B. 抽搐、昏迷
- C. 皮肤潮红、多汗
- D. 表浅静脉充盈消失
- E. 血压升高、脉搏加快

62. 患儿，男，2岁。因白血病、肺部感染入院。上午10时体温39.8℃。给予该患儿的降温方式应是

- A. 冰槽
- B. 冰帽
- C. 冰袋
- D. 乙醇拭浴
- E. 温水拭浴

63. 患者，男，14岁。因高热40.1℃入院。为尽快降温，医嘱乙醇拭浴。下述操作不正确的是

- A. 室温调节到21~24℃
- B. 置冰袋于足底
- C. 擦浴时禁擦心前区、腹部、后颈
- D. 擦浴后半小时测体温
- E. 擦浴时间不超过20分钟

64. 患者，男，25岁。感觉头晕不适，有发



热感。测口温 39.2 °C，口服安乃近 0.5 g，半小时后，大量出汗，此阶段易出现

- A. 低温
- B. 虚脱
- C. 皮肤潮红
- D. 呼吸加快
- E. 畏寒

65. 患者，女，26 岁。患血友病。护士发现该患者排出尿液呈现浓茶色，以下原因最可能的是

- A. 青霉素过敏反应
- B. 溶血反应
- C. 肺水肿
- D. 空气栓塞
- E. 尿路感染

66. 患者，女，46 岁。左下肢静脉曲张 8 年，拟行手术治疗。下列哪项试验可决定能否做大隐静脉剥脱术或结扎术

- A. 浅静脉瓣膜功能试验
- B. 深静脉瓣膜功能试验
- C. 交通支瓣膜功能试验
- D. 深静脉通畅试验
- E. 浅静脉通畅试验

67. 患者，女，35 岁。以绒毛膜癌入院，为确保化疗药物剂量，护士应在何时测量患者体重

- A. 每疗程用药前
- B. 每疗程用药中
- C. 每疗程用药后
- D. 每疗程用药前和用药中
- E. 每疗程用药前、用药中和用药后

68. 患者，女，62 岁。因“油腻饮食后腹痛半年”入院，今晨行“经皮肝穿刺胆道造影（PTC）术”术后患者最容易发生下列哪项并发症

- A. 呼吸困难
- B. 内出血
- C. 胰腺炎
- D. 感染性休克
- E. 肝性脑病

69. 患儿，男，4 岁。误食灭鼠药磷化锌中毒后用什么溶液洗胃

- A. 0.02%高锰酸钾
- B. 生理盐水
- C. 0.5%硫酸铜
- D. 5%醋酸
- E. 2%碳酸氢钠

70. 患儿，女，2 岁。因上呼吸道感染高热惊厥入院。住院过程中，护士为患者制定了个性化的护理方案，并积极对家长进行相关护理知识的讲解和指导，让家长参与到护理工作过程中来。此时护患关系的主要任务是

- A. 与患者建立互相信任的关系
- B. 为患者日后的健康保健制定计划
- C. 采取措施解决患者健康问题
- D. 对整个护患关系进行评价
- E. 了解患者对其健康状况和护患关系的满意程度

71. 患儿，女，6 岁。右胫骨近端剧痛，伴高热寒战 1 天。查体：右下肢活动受限，右胫骨近端有深压痛。诊断为右下肢急性血源性骨髓炎。下列哪项不能作为早期诊断的依据

- A. X 线
- B. 症状
- C. 体征
- D. 血常规
- E. 局部穿刺

72. 患者，男，20 岁。因急性肾小球肾炎反复出现血尿、高血压、水肿、蛋白尿。遵医嘱为患者测定血中尿素氮。护士应选择标本及试管是

- A. 全血标本，抗凝试管
- B. 血清标本，抗凝试管
- C. 血培养标本，抗凝试管
- D. 血清标本，干燥试管
- E. 全血标本，干燥试管

73. 患者，男，40 岁。因车祸致腹腔脏器破裂，失血性休克。需要紧急进行股静脉加压输液，穿刺点位于

- A. 股动脉内侧 0.5 cm 处
- B. 股动脉内侧 1 cm 处
- C. 股神经外侧 0.5 cm 处
- D. 股动脉外侧 0.5 cm 处
- E. 股动脉外侧 1 cm 处

74. 由于科室效益不佳，护士长要求护士节约使用耗材，其中特别强调在为患者进行换药过程中不必要戴手套。护士长的做法侵犯了护士的哪项权利

- A. 获得物质报酬的权利
- B. 安全执业的权利
- C. 进修学习的权利
- D. 获得奖励的权利
- E. 人格尊严不受侵犯的权利

75. 患者，女，41 岁。车祸颅内血肿，神志不清，呕吐数次。为预防脑疝形成，术前应采取的措施是

- A. 持续给氧
- B. 静脉滴注甘露醇
- C. 冬眠低温疗法
- D. 静脉注射地塞米松
- E. 避免剧烈咳嗽和便秘

76. 患者，女，36 岁。因乳腺癌住院，准备手术治疗，患者焦虑，暗自流泪。护士最应给予的护理措施是

- A. 立即上报主管医生
- B. 给予镇静药以缓解症状
- C. 指导家属给予患者支持
- D. 允许患者家属陪住，以免焦虑
- E. 鼓励患者倾诉并给予疏导和安慰

77. 患者，男，15 岁。在河道游泳后 10 余天开始出现发热、咳嗽、腹泻等症状。体检：肝脾肿大伴有肝区压痛。实验室检查：周围血嗜酸性细胞增多。怀疑发生了血吸虫感染。遵医嘱留取粪便标本做血吸虫孵化检查，护士告知患者标本留取的正确方法是

- A. 取全部粪便并及时送检
- B. 便盆加温再留取少许粪便
- C. 检便匙取脓血处粪便
- D. 少量异常粪便置蜡纸盒送检

E. 试验饮食后第 3 日留便送检

78. 患者，男，40 岁。胃癌术后第二天。护士与患者交谈中，使用的提问技巧不恰当的是

- A. 当患者无伤口疼痛时提问
- B. 提问中避免误导
- C. 围绕交谈目的提问
- D. 提问数量越多越好
- E. 询问中重视患者感受

79. 患者，男，56 岁。30 年吸烟史，反复咳嗽、咳痰 10 余年。近 2 月以来咳嗽咳痰加重，并出现痰中带血、反复低热、胸闷等症状，初步诊断为肺癌。为查找癌细胞需留痰标本，固定标本的溶液宜选用

- A. 10% 甲醇
- B. 5% 苯酚
- C. 95% 乙醇
- D. 40% 甲醛
- E. 稀盐酸

80. 患者因虹膜炎入院治疗，一日晚上某患者突感腹痛，呼叫值班护士，值班护士为不吵醒值班医生，自作主张告知患者服用止痛片，次日该患者因急性腹膜炎延误病情出现生命危险。值班护士的医疗过失行为应承担的责任是

- A. 主要责任
- B. 同等责任
- C. 轻微责任
- D. 次要责任
- E. 完全责任

81. 患者，女，48 岁。5 个小时前与爱人发生激烈争执后服乐果中毒。为该患者洗胃禁用下列哪种洗胃

- A. 生理盐水
- B. 温开水
- C. 2%~4% 碳酸氢钠
- D. 1:15 000~1:20 000 高锰酸钾
- E. 1% 盐水

82. 患者赵某，在住院期间每天都向医生和护士询问自己现阶段的治疗和护理方案，并

常与医护人员讨论自己的下一步治疗方案等,说明患者拥有

- A. 平等护理权
- B. 保密权
- C. 监督权
- D. 知情同意权
- E. 要求回避权

83. 患者,女,60岁。确诊为急性呼吸窘迫综合征,给予面罩吸氧。为了使吸入氧能够达到53%需将氧流量调至

- A. 10 L/min
- B. 6 L/min
- C. 4 L/min
- D. 8 L/min
- E. 2 L/min

84. 李大爷,70岁,因肺部感染高热入院。今日患者痰多而不易咳出,护士给该患者吸痰时,发现病人痰液粘稠,不易吸出,下列措施中哪项不妥

- A. 叩拍胸背部,以振动痰液
- B. 给病人做超声雾化吸入,以稀释痰液
- C. 缓慢滴入少量生理盐水,以稀释痰液
- D. 缓慢滴入化痰药物,以稀释痰液
- E. 加大吸引负压,以吸尽痰液

85. 患者,男,67岁。支气管肺癌术后,护士鼓励患者早期下床活动的主要目的

- A. 促进血液循环
- B. 提高机体抵抗力
- C. 预防肺不张
- D. 增进食欲
- E. 预防压疮

86. 患者,男,50岁。因得知自己患有不治之症遂爬上医院顶楼准备轻生。医护人员随即采取强制措施将该患者带离顶楼,患者回病房后一直情绪激动,难以自控。护理人员随即给予适当约束。护士的行为是在行使何种权利

- A. 特殊干涉权
- B. 尊重自主权
- C. 知情同意权

- D. 人格尊严权
- E. 强制执行权

87. 患者,女,45岁。长期失眠。医嘱:地西洋5mg, p.o., h.s., 护士正确执行的方法和时间是

- A. 口服,临睡前一次
- B. 肌肉注射,每晚一次
- C. 静脉推注,每天一次
- D. 口服,每晚一次
- E. 皮下注射,隔天一次

88. 患者,男,28岁。诊断为缺铁性贫血。口服铁剂治疗,下列描述中说明患者需要护士给予服药指导的是

- A. “我每次都在两餐之间服用铁剂”
- B. “我每次服用铁剂的时候都会使用吸管服用”
- C. “我一直喜欢喝浓茶”
- D. “服完铁剂以后我都会漱口”
- E. “我是不会把铁剂与牛奶同服的”

89. 患者,男,55岁。患慢性支气管炎,近3天咳嗽咳痰,痰液黏稠不易咳出,为帮助祛痰,给予超声雾化,当超声雾化吸入器的水温超过一定数值时护士需要调换,该数值是

- A. 30 °C
- B. 40 °C
- C. 50 °C
- D. 60 °C
- E. 70 °C

90. 患者,女,65岁。尿糖(++),医嘱皮下注射胰岛素8U,为防止感染,护士在注射时下列最重要的是

- A. 注射前戴帽子
- B. 皮肤消毒直径为5cm
- C. 针头无锈、无钩、锐利
- D. 注射器完整无裂痕
- E. 不在硬结处进针

91. 某护士给外伤患者做头孢菌素皮试,其结果为阳性:但医生仍坚持用药。此时该护

士最应该坚持的是

- A. 重新做一次
- B. 与其他护士进行商量
- C. 拒绝使用
- D. 做对照实验
- E. 继续执行医嘱

92. 患者，女，68岁。患大叶性肺炎，高热昏迷，需24小时连续输液，护士应更换一次输液器的时间间隔是

- A. 8小时
- B. 12小时
- C. 24小时
- D. 48小时
- E. 72小时

93. 患者，男，60岁，静脉输液中，主诉胸部不适，继而出现呼吸困难、发绀，心前区闻及响亮持续的“水泡音”，护士应立即为患者采取的措施是

- A. 仰卧位头高足低位
- B. 端坐位
- C. 右侧卧位头低足高位
- D. 俯卧位头高足低位
- E. 左侧卧位头低足高位

94. 患者，男，33岁。输大量库存血后出现心率缓慢、手足抽搐、血压下降、伤口渗血，其原因是

- A. 血钾升高
- B. 血钾降低
- C. 血钙升高
- D. 血钙降低
- E. 血钠降低

95. 患者，男，74岁。慢性咳嗽、咳痰20年，诊断为COPD。诊断COPD一定具备的条件是

- A. 慢性支气管炎
- B. 进行性呼吸困难
- C. 慢性阻塞性肺气肿
- D. 气流受限
- E. 二氧化碳潴留

96. 患者，女，26岁。新婚。平时月经规律，现停经42天，主诉晨起恶心、呕吐，怀疑患者为早孕，拟采集尿标本做妊娠试验，护士应留取

- A. 晨起第一次尿
- B. 随时收集尿液
- C. 中段尿
- D. 临睡前尿
- E. 24小时尿

97. 患者，女，55岁。因“糖尿病酮症酸中毒”入院，主诉食欲减退、恶心、呕吐，常伴头痛、嗜睡，护士在测量生命体征时发现呼吸有烂苹果味，且呼吸深快，该呼吸类型是

- A. 蝉鸣样呼吸
- B. 鼾声呼吸
- C. 潮式呼吸
- D. 库斯莫呼吸
- E. 浮浅性呼吸

98. 患者，男，54岁。持续超过1~2天时间高浓度吸氧后，出现氧中毒症状。其吸入的氧浓度应高于

- A. 55%
- B. 60%
- C. 65%
- D. 70%
- E. 75%

99. 潮气量为500 mL，呼吸频率为14次/min，无效腔气量为150 mL，则肺泡通气量为

- A. 2.1 L/min
- B. 3.5 L/min
- C. 5.7 L/min
- D. 4.9 L/min
- E. 6 L/min

100. 患者，男，7岁。咳嗽反射迟钝，需及时吸出呼吸道分泌物。吸痰操作下列错误的是

- A. 调节负压40~53.3 kPa
- B. 操作前需用生理盐水试吸
- C. 快速上下提拉，每次吸痰时间小于15秒

- D. 在紧急无吸引器的情况下, 可用 50~100 mL 注射器抽吸  
E. 严格执行无菌操作, 吸痰物品应每天更换 1~2 次, 吸痰导管每次更换

二、以下提供若干个案例, 每个案例下设若干考题。请根据各考题题干所提供的信息, 在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳的答案。

(101~103 题共用题干)

某患者以发热待查入院, 体温在 39~40 °C 左右, 日差在 1 °C 以内, 连续 8 天不退, 脉搏 93 次/分, 呼吸 23 次/分, 查体: 口腔黏膜干燥, 左颊黏膜处有一 0.2 cm×0.2 cm 溃疡。

101. 病人的体温热型是

- A. 不规则热
- B. 稽留热
- C. 弛张热
- D. 间歇热
- E. 回归热

102. 给予病人的基本饮食是

- A. 普通饮食
- B. 软质饮食
- C. 试验饮食
- D. 半流质饮食
- E. 要素饮食

103. 患者此时出现面色潮红, 皮肤干燥, 呼吸急促。据此判断患者处于发热的

- A. 体温上升期
- B. 高热持续期
- C. 退热期
- D. 恢复期
- E. 恶化期

(104~105 题共用题干)

患者, 男, 55 岁。慢性肾小球肾炎 10 年, 1 周前受凉后出现食欲减退、恶心、呕吐, 晨起明显, 夜尿增多。内生肌酐清除率为 30 mL/min。

104. 下列关于患者饮食中蛋白质的说法正确的是

- A. 大量动物蛋白
- B. 大量植物蛋白
- C. 少量动物蛋白
- D. 少量植物蛋白
- E. 禁食蛋白质

105. 为了维持水电解质、酸碱平衡, 下列护理措施不正确的是

- A. 食用含钾高的食物
- B. 限制磷的摄入
- C. 补充活性维生素 D
- D. 限制钠、水摄入
- E. 补充钙、铁

(106~107 题共用题干)

患者, 女, 42 岁。与儿子吵架后半小时突然剧烈头痛, 面色苍白, 呕吐, 倒地呼之不应。送急诊。查体: 神志清楚, 痛苦表情, 应答切题, 眼底正常, 感觉正常, 脑膜刺激征阳性

106. 该患者最可能的诊断是

- A. 脑栓塞
- B. 脑血栓形成
- C. 短暂性脑缺血发作
- D. 癫痫发作
- E. 蛛网膜下腔出血

107. 对患者密切监测, 防止再发, 应绝对卧床休息

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周
- E. 5 周

(108~109 题共用题干)

某初产妇, 35 岁。孕 39 周, 对其进行 B 超测量骨盆结果是: 入口平面前后径 11 cm, 横径 13 cm; 中骨盆横径 9.0 cm, 前后径 10.5 cm; 出口横径 7.5 cm, 后矢状径 7.0 cm。

108. 根据检查结果, 该产妇的骨盆形态是

- A. 正常骨盆
- B. 漏斗骨盆
- C. 扁平骨盆
- D. 畸形骨盆
- E. 均小骨盆

109. 对该产妇试产, 正确的是

- A. 不可试产
- B. 可试产 2 小时
- C. 可试产 4 小时
- D. 可试产 6 小时
- E. 可试产 8 小时

(110~112 题共用题干)

足月新生儿, 第一胎, 男, 生后第 3 天, 母乳喂养, 生后 24 小时出现黄疸, 皮肤黄染渐加重, 查: Hb 100 g/L, 母血型 O, 子血型 B。

110. 该患儿最有可能的诊断是

- A. 胆道闭锁
- B. 新生儿生理性黄疸
- C. 新生儿 ABO 血型不合溶血症
- D. Rh 溶血症
- E. 新生儿败血症

111. 该患儿护理措施不包括

- A. 给予光照疗法
- B. 输血浆
- C. 保暖
- D. 停止母乳喂养
- E. 给予苯巴比妥

112. 若该患儿出现嗜睡、尖声哭叫、肌张力下降, 胆红素上升至  $386 \mu\text{mol/L}$ , 该患儿可能发生了

- A. 颅内出血
- B. 胆红素脑病
- C. 呼吸衰竭
- D. 新生儿化脓性脑膜炎
- E. 低血糖

(113~115 题共用题干)

患者, 男性, 24 岁。在田里劳作时被蛇咬伤, 咬伤处出血、压痛、红肿, 并向肢体近端蔓延, 病人烦躁不安、呼吸困难、语言不清、腱反射消失。

113. 急救处理措施不包括

- A. 温水冲洗伤口
- B. 用尖刀在伤口周围多处切开促使毒液排出
- C. 胰蛋白酶近侧作封闭
- D. 抗蛇毒血清应用

E. 输液

114. 预防并发症的措施不包括

- A. 多饮水
- B. 出现血红蛋白尿时静脉点滴 5%碳酸氢钠
- C. 患肢抬高
- D. 加强营养
- E. 输液

115. 病人饮食指导应除了下列哪项

- A. 高蛋白
- B. 丰富维生素
- C. 多饮水
- D. 受伤期间可喝酒
- E. 静脉输液

(116~117 题共用题干)

患者, 女性, 46 岁。由于下岗, 对生活失去信心, 同时不能照顾家庭, 伴失眠, 被诊断为“抑郁症”。

116. 不可能出现的症状是

- A. 兴趣缺乏
- B. 睡眠障碍
- C. 思维贫乏
- D. 自责和厌世感
- E. 言语动作迟缓

117. 护士在接诊患者时应注意的是

- A. 介绍医院专长
- B. 护士自我介绍
- C. 直截了当地询问
- D. 让患者放松情绪
- E. 直接给出明确诊断

(118~120 题共用题干)

患者, 女, 30 岁。因宫外孕破裂大出血入院。体格检查: 面色苍白, 四肢湿冷, 脉率 140 次/分, 血压 60/40 mmHg。

118. 该患者输血的目的是

- A. 补充血容量
- B. 增加血红蛋白
- C. 补充凝血因子
- D. 增加清蛋白
- E. 增加营养

119. 为防止发生过敏反应, 输血前应皮下注射抗过敏药物。下列操作方法中错误的是

- A. 注射部位常规消毒

- B. 进针部位选择三角肌上缘
  - C. 针头与皮肤成 30°~40° 角进针
  - D. 抽吸无回血后注射药液
  - E. 注射完毕用干棉签轻压注射处
120. 3 天后，患者在输液过程中突然出现咳嗽、呼吸困难、气促、咯粉红色泡沫样痰，

- 应考虑为
- A. 发热反应
  - B. 过敏反应
  - C. 急性肺水肿
  - D. 静脉炎
  - E. 空气栓塞

## 实践能力测试题

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E，五个备选答案，请从中选择一个最佳的答案。

1. 最易引起原发性肝癌的疾病是
  - A. 脂肪肝
  - B. 肝炎后肝硬化
  - C. 血吸虫性肝炎
  - D. 肝血管瘤
  - E. 肝内胆管结石
2. 除腹痛外，高位小肠梗阻最主要的症状是
  - A. 停止排气排便
  - B. 肠腔积气
  - C. 呕吐频繁
  - D. 肠蠕动亢进
  - E. 腹胀明显
3. 焦虑症的核心症状是
  - A. 运动性不安
  - B. 自主神经功能兴奋
  - C. 焦虑和烦恼
  - D. 过分警觉
  - E. 情绪低落
4. 抑制胰腺分泌作用最强的药物是
  - A. 阿托品
  - B. 西咪替丁
  - C. 生长抑素
  - D. 环丙沙星
  - E. 山莨菪碱
5. 导致左心室压力负荷过重的瓣膜病是
  - A. 二尖瓣关闭不全
  - B. 主动脉瓣关闭不全
  - C. 主动脉瓣狭窄
  - D. 肺动脉瓣狭窄
  - E. 二尖瓣狭窄
6. 梗阻性肥厚型心肌病患者最常见的死亡原因是
  - A. 脑卒中
  - B. 猝死
  - C. 休克
  - D. 心肌梗死
  - E. 肺栓塞
7. 肝性脑病患者伴有肾脏损害，口服抗生素应选
  - A. 新霉素
  - B. 卡那霉素
  - C. 氨苄西林
  - D. 庆大霉素
  - E. 甲硝唑
8. 对尿路感染患者的健康教育中，错误的是
  - A. 鼓励患者多饮水
  - B. 长期预防性服用抗生素
  - C. 及时治疗尿路结石
  - D. 及时治疗尿路损伤
  - E. 保持会阴部清洁
9. 流脑患儿的皮疹特点是
  - A. 斑丘疹
  - B. 瘀点、瘀斑
  - C. 荨麻疹
  - D. 丘疹
  - E. 斑疹

10. 特发性血小板减少性紫癜患者最重要的护理措施是观察和预防
- A. 胃肠道出血
  - B. 鼻出血
  - C. 脑出血
  - D. 皮肤黏膜出血
  - E. 感染
11. 肺心病并发呼吸衰竭患者缺氧的典型表现是
- A. 肺性脑病
  - B. 头痛
  - C. 三凹征
  - D. 发绀
  - E. 呼吸频率变慢
12. 流行性乙型脑炎极期最严重的三种症状是
- A. 高热、意识障碍、呼吸衰竭
  - B. 意识障碍、呼吸衰竭、循环衰竭
  - C. 惊厥、呼吸衰竭、循环衰竭
  - D. 高热、惊厥、循环衰竭
  - E. 高热、惊厥、呼吸衰竭
13. 预防、医疗、保健机构发现艾滋病病毒感染者时，以下措施不正确的是
- A. 身体约束
  - B. 留观
  - C. 定期或不定期访视
  - D. 医学观察
  - E. 给予宣教
14. 胸部 X 线检查心影呈梨型提示
- A. 心包积液
  - B. 三尖瓣关闭不全
  - C. 二尖瓣关闭不全
  - D. 二尖瓣狭窄
  - E. 主动脉瓣狭窄
15. 双手及膝盖烫伤，有大小不等的水疱，剧烈疼痛。该患者伤及的深度达
- A. 真皮全层
  - B. 真皮乳头层
  - C. 表皮浅层
  - D. 表皮全层
  - E. 皮肤全层
16. 下列有关闭式胸膜腔引流的护理错误的是
- A. 保持通畅
  - B. 确保管道密封
  - C. 妥善固定
  - D. 注意水柱波动
  - E. 搬运病人时水封瓶应高于胸腔引流口
17. 对于 2 级高血压病患者，下列哪一项不宜向其建议
- A. 低脂饮食
  - B. 戒烟
  - C. 长期卧床
  - D. 勿饮酒
  - E. 低钠盐饮食
18. 诊断葡萄胎最重要的辅助检查是
- A. 血/尿 hCG 测定
  - B. 多普勒胎心听诊检查
  - C. B 超检查
  - D. 腹部 CT 检查
  - E. 胸部 X 线检查
19. 心室颤动患者的脉搏特征是
- A. 快而规则
  - B. 慢而规则
  - C. 快而不规则
  - D. 慢而不规则
  - E. 摸不到
20. 中暑高热时，最合适的低压灌肠溶液为
- A. 4℃氯化钠溶液+冰醋酸
  - B. 0℃生理盐水+食醋
  - C. 4℃肥皂水
  - D. 4℃葡萄糖盐水
  - E. 50%硫酸镁溶液 100 mL
21. 颅内肿瘤最好发的部位是
- A. 大脑半球
  - B. 鞍区
  - C. 脑干



- C. 小脑
- E. 小脑脑桥角

22. 腹腔内实质性脏器破裂出血时，如腹部叩诊有移动性浊音，提示出血量为

- A. 200 mL 以上
- B. 300 mL 以上
- C. 400 mL 以上
- D. 500 mL 以上
- E. 1 000 mL 以上

23. 阿尔茨海默病的临床表现不包括

- A. 被害妄想
- B. 经积极治疗预后良好
- C. 与遗传因素有关
- D. 脑重减轻、脑萎缩
- E. 可有非认知性的精神症状

24. 支气管扩张症患者在施行体位引流时，错误的护理是

- A. 引流通常在空腹进行
- B. 根据病变部位选择体位
- C. 引流时鼓励患者深呼吸
- D. 引流时间每次 30 分钟以上
- E. 引流完毕后给予漱口

25. 关于葡萄胎的临床表现，错误的是

- A. 停经后出现不规则阴道出血
- B. 子宫大于妊娠周数
- C. 早孕反应较轻
- D. 妊娠高血压综合征出现早
- E. 血清 hCG 水平异常升高

26. 纤维蛋白性心包炎的典型体征是

- A. 心界扩大
- B. 心包摩擦音
- C. 心音遥远
- D. 奇脉
- E. 绌脉

27. 治疗甲状腺危象首选的药物是

- A. 甲硫氧嘧啶
- B. 丙硫氧嘧啶
- C. 卢格氏碘液

- D. 卡比马唑
- E. 甲硫米唑

28. 输卵管结扎术的结扎部位是输卵管的

- A. 间质部
- B. 峡部
- C. 壶腹部
- D. 伞部
- E. 漏斗部

29. 关于避孕药的叙述，不正确的是

- A. 抑制下丘脑促性腺激素释放，抑制排卵
- B. 使子宫颈黏液黏稠，阻碍精子穿过
- C. 是人工合成的雌孕激素复合制剂
- D. 出现不良反应主要是雌激素的作用
- E. 使子宫内膜萎缩，不利于孕卵着床

30. 可以试产的情况是

- A. 头位，骨盆出口平面狭窄
- B. 臀位，骨盆出口平面狭窄
- C. 臀位，骨盆入口平面狭窄
- D. 头位，骨盆入口平面狭窄
- E. 头位，中骨盆平面狭窄

31. 患者，男，46 岁。患尿毒症 2 年。血常规示 RBC  $2.35 \times 10^{12}/L$ ，Hb 70 g/L。导致该患者贫血的最主要原因是

- A. 出血
- B. 低蛋白
- C. 促红细胞生成素缺乏
- D. 缺铁
- E. 叶酸缺乏

32. 患者，女，35 岁。患风湿性心脏病后发生心房颤动 4 年，住院时突然出现偏瘫、头痛，首先考虑其发生了

- A. 心力衰竭
- B. 脑栓塞
- C. 脑血栓形成
- D. 洋地黄中毒
- E. 感染性心内膜炎

33. 护士评估肝硬化患者的皮肤改变时可发现蜘蛛痣，蜘蛛痣一般不出现的部位是

- A. 腹部
- B. 胸部
- C. 面颈部
- D. 手臂
- E. 肩背部

34. 患者，男，42岁。6小时前负重物时，右侧斜疝被嵌顿。下列临床表现中说明疝内容物已发生缺血坏死，应做好急诊手术前准备的是

- A. 疝块增大，不能回纳
- B. 局部有剧烈疼痛
- C. 全腹压痛、肌紧张
- D. 疝块有触痛
- E. 阵发性腹痛伴呕吐

35. 患者，男，36岁。诊断为十二指肠溃疡，现疼痛节律消失，餐后腹痛伴呕吐，呕吐物为宿食，错误的护理措施是

- A. 禁食水
- B. 连续胃肠减压
- C. 静脉补液
- D. 观察呕吐物情况
- E. 餐前洗胃

36. 患儿，男，7个月。因腹泻伴中度等渗性脱水入院。经补液治疗后，该患儿脱水体征基本消失，呼吸平稳，但精神仍差，腹胀明显，四肢软弱无力，考虑合并下列情况中的

- A. 低血糖
- B. 低钙血症
- C. 低钾血症
- D. 低镁血症
- E. 代谢性酸中毒

37. 患者，男性，35岁。踢足球时向右跌倒，摔伤右肩部就诊，检查见右肩部方肩畸形，肩关节空虚，弹性固定，Dugas征阳性。该患者首选的处理方法

- A. 手法复位外固定
- B. 切开复位内固定
- C. 骨牵引复位
- D. 悬吊牵引复位
- E. 皮牵引复位

38. 患儿女，生后3天，入院时拒乳，反应差，哭声低。体检：心音低钝，双下肢硬肿如橡皮，测肛温30.5℃。患儿首选的护理问题是

- A. 营养失调
- B. 有感染的危险
- C. 有皮肤完整性受损的危险
- D. 体温过低
- E. 潜在并发症

39. 患者，女性，23岁。甲亢半年，服用甲基硫氧嘧啶治疗，此药的作用机制是

- A. 抑制甲状腺激素合成
- B. 抑制抗原抗体反应
- C. 抑制甲状腺激素释放
- D. 使甲状腺激素分泌降低
- E. 降低外周组织对甲状腺激素反应

40. 患者，女，20岁。鼻部疖挤压后，出现头痛、高热、眼部红肿，首先应考虑的是

- A. 面部蜂窝组织炎
- B. 菌血症
- C. 毒血症
- D. 颅内海绵状静脉窦炎
- E. 脓毒症

41. 患者，男，36岁。因急性阑尾炎穿孔行“阑尾切除术”。术后5天，感腹部持续性胀痛，伴恶心呕吐，未排便排气。体检：全腹膨胀，肠鸣音消失，未触及腹部肿块。腹部X线片检查见小肠及结肠均有大量充气及气液平面。对于该患者的处理，最适宜的是

- A. 立即剖腹探查
- B. 口服钡剂全胃肠道透视
- C. 腹腔穿刺，灌洗
- D. 钡剂灌肠
- E. 胃肠减压及支持疗法

42. 患者，男，33岁。右上腹痛伴高热7天。B超和CT检查提示肝脓肿，曾有胆道感染史。引起该疾病最可能的原因是

- A. 开放性肝损伤
- B. 胆道化脓性感染
- C. 坏疽性阑尾炎

- D. 右侧膈下脓肿
- E. 肝包虫病

43. 患者，男，35岁。有被害妄想，认为饭中有毒而拒食，此时护士的正确做法是

- A. 不勉强患者进食，让其饥饿再进食
- B. 强行喂食
- C. 把患者约束起来，直至同意进食为止
- D. 带去餐厅与其他病友一起进食
- E. 进行静脉输液

44. 患者，女，45岁。因餐后腹痛住院，拟诊为急性水肿性胰腺炎，行保守治疗。护士告知患者行胃肠减压的主要目的是

- A. 减轻腹胀
- B. 防止恶心、呕吐
- C. 减少胰液分泌
- D. 预防感染
- E. 防止胰液逆流

45. 患儿，女，10岁。不规则发热，髌关节红肿、燥热、疼痛，活动受限，患儿主诉气喘不好，拟诊风湿热。关于风湿热的治疗，正确的是

- A. 激素治疗的总疗程一般在6周以下
- B. 症状好转后即应停药
- C. 阿司匹林在关节肿痛消失后可停药
- D. 心脏炎时应早期使用肾上腺皮质激素
- E. 对青霉素过敏者可选用红霉素

46. 患者，男，78岁。肺气肿病史5年，近日因感染出现痰多，不易咳出，常有头痛、烦躁，神志恍惚，白天嗜睡，夜间失眠，晨间护理时发现患者神志淡漠，间歇性抽搐。查体：球结膜水肿。应考虑出现

- A. 窒息先兆
- B. 呼吸性酸中毒
- C. 肺性脑病
- D. 休克早期
- E. 肺感染

47. 患者，女，30岁。表现为口若悬河，滔滔不绝，一个话题未完又转入另一个话题，此患者的精神症状属于

- A. 感觉过敏
- B. 思维奔逸
- C. 妄想
- D. 思维散漫
- E. 语词新作

48. 患者，女，36岁。甲状腺癌行甲状腺切除术后，患者一清醒，护士就让患者反复说出她自己的名字，目的是为了评估患者有无

- A. 出血
- B. 神经损伤
- C. 气道受损
- D. 意识障碍
- E. 上呼吸道梗阻

49. 患者，女，47岁。患结肠癌，拟行左结肠癌根治术，术前开始服用抗生素的时间是

- A. 术前6天
- B. 术前3天
- C. 术前7天
- D. 术前2天
- E. 术前4天

50. 患者，男，65岁。右肾癌根治术后第一天，护士密切观察生命体征的主要目的是

- A. 书写病情记录
- B. 完成常规护理
- C. 预防术后出血
- D. 观察麻醉并发症
- E. 向家属报告病情

51. 患者，女，40岁。行胆总管切开取石T形管引流术后5天，T形管引流液每天2000mL，提示

- A. 胆总管下段梗阻
- B. 胆汁量正常
- C. 胆汁量偏少
- D. 肠液反流
- E. 肝总管梗阻

52. 患者，女，60岁。患风湿性关节炎10年。患者现仍有关节肿痛，双手尺侧偏向畸形，持物困难，生活不能自理。针对该患者的护理措施，错误的是

- A. 卧床休息，减少活动
- B. 服用阿司匹林，消炎止痛
- C. 训练日常生活技能
- D. 晨起用热水泡手 15 分钟
- E. 保持关节功能位

53. 患者，男，50 岁。因颅内肿瘤入院，有明显颅内压增高，以下护理措施不正确的是

- A. 高流量氧气吸入
- B. 烦躁不安时给予约束
- C. 高热时给予物理降温，必要时药物降温
- D. 便秘时给予缓泻药
- E. 遵医嘱定时定量给予抗癫痫药

54. 患者，男，32 岁。从事营销工作，有不洁性生活史。全身多部位淋巴结肿大、口腔糜烂、乏力、厌食、体重下降。诊断为艾滋病，正在接受抗病毒治疗。艾滋病抗病毒治疗的最终目标是

- A. 杀灭患者体内的艾滋病病毒
- B. 延长患者生命，提高生活质量
- C. 保证患者正常的免疫功能
- D. 治疗患者的机会性感染
- E. 治疗恶性肿瘤

55. 患儿，3 岁。高热、昏迷、抽搐 1 天，急诊入院，疑为中毒性菌痢，为及时诊断，应立即进行的检查是

- A. 大便培养
- B. 肛拭子或盐水灌肠取便镜检
- C. 脑脊液常规
- D. 脑 CT
- E. 乙脑特异性 IgM 测定

56. 患者，男，35 岁。患肺结核。遵医嘱长期应用链霉素可能出现

- A. 肝功损害
- B. 胃肠道刺激
- C. 听力障碍
- D. 周围神经炎
- E. 球后视神经炎

57. 王女士，36 岁，G1P0，孕 30 周，以子痫前期收入院，在治疗过程中，实习护生小李

发现患者突发抽搐，为防黏液吸入呼吸道或舌头阻塞呼吸道，应立即将病人置于

- A. 头高左侧卧位
- B. 中凹卧位
- C. 半坐卧位
- D. 头低左侧卧位
- E. 头高右侧卧位

58. 某胎龄 35 周早产儿，生后 32 天。冬天出生，母乳喂养，体重已由出生时 2.0 kg 增至 3.0 kg。现在可以添加的辅食和添加的目的是

- A. 米汤，以补充热量
- B. 菜汤，以补充矿物质
- C. 软面条，以保护消化道
- D. 蛋黄，以补充铁
- E. 鱼肝油，以补充维生素 D

59. 患儿，12 岁。口底蜂窝织炎 3 日，伴高热、乏力、头痛、全身不适，医生决定切开引流，其目的是为预防

- A. 脓毒症
- B. 呼吸困难
- C. 吞咽困难
- D. 脑膜炎
- E. 感染性休克

60. 患者，男，58 岁。进行性黄疸三个月。诊断为胰头癌，行胰十二指肠切除术，术后 6 天突然出现上腹疼痛，腹腔穿刺抽出含胆汁的液体少许。护士对其进行病情评估后认为该患者可能出现了

- A. 胰瘘
- B. 胆瘘
- C. 吻合口瘘
- D. 术后感染
- E. 急性腹膜炎

61. 患儿，男，9 个月。因发热、咳嗽 3 天，病情加重就诊。查体：患儿烦躁不安，气促，口唇发绀。T 39.2 °C，P 180 次/min，R 50 次/min。肺部可闻及较多细湿啰音，心音低钝，肝肋下 3 cm。对该患儿的护理措施错误的是

- A. 加快输液速度
- B. 置患儿于半卧位
- C. 避免各种刺激
- D. 头罩给氧
- E. 备好抢救用品

62. 某 2 型糖尿病患者，体态肥胖，“三多一少”症状不太明显，血糖偏高，长期采用饮食控制和口服降糖药物治疗，但血糖仍偏高，针对此病人最应增加的措施是

- A. 加大胰岛素剂量
- B. 注射胰岛素
- C. 继续加大饮食控制
- D. 应用抗生素
- E. 碳酸氢钠

63. 患者，女，30 岁。哺乳期妊娠，在进行人工流产时受术者突然腹痛、面色苍白，手术者感觉宫底变深，可能的并发症为

- A. 阑尾炎
- B. 术后感染
- C. 吸附不全
- D. 羊水栓塞
- E. 子宫穿孔

64. 患儿，男，2 岁。头围 52 cm，可能的疾病为

- A. 营养不良
- B. 脑积水
- C. 脑发育不全
- D. 小头畸形
- E. 呆小病

65. 患者，男，17 岁。近 1 个月来常常逃学，父母对其进行劝阻无效，且常与父母争吵。护士建议父母处理的方法不恰当的是

- A. 尊重张某的想法
- B. 意见不统一时，强制其服从
- C. 给予无条件的爱
- D. 给张某提供选择的机会，并接受结果
- E. 尊重张某的隐私

66. 患者男，45 岁。尿蛋白(++++)，全身水肿 1 个月，测血压 160/100 mmHg，引起其水

肿最主要的因素为

- A. 肾小球滤过率下降
- B. 血浆胶体渗透压下降
- C. 继发性醛固酮增多
- D. 抗利尿激素增多
- E. 内分泌系统失调

67. 患者，男，40 岁。工地干活时从高处坠落导致腹部闭合性损伤，入院怀疑其小肠破裂，护士应重点观察患者何种情况需立即手术

- A. 肠道出血停止
- B. 全身情况无恶化趋势
- C. 腹痛和腹膜刺激征进行性加重
- D. 肠鸣音正常，无减弱或消失
- E. 经积极抗休克治疗后情况好转

68. 患者，女，25 岁。车祸致骨盆骨折。查体：生命体征平稳，X 线摄片示耻骨联合分离，右侧骶髂关节向上方移位，最合适的处理是

- A. 骨盆兜悬吊加下肢牵引
- B. 切开复位内固定
- C. 手法复位外固定
- D. 使用石膏床
- E. 使用硬板床

69. 患者，男，50 岁。患慢性肾衰竭，近日恶心、呕吐，进食明显减少，并伴有尿少，血清钾浓度增高达 8.9 mmol/L。在病情观察时，须警惕可能出现

- A. 周期性瘫痪
- B. 心力衰竭
- C. 严重心律失常
- D. 昏迷
- E. 抽搐

70. 患者，男，20 岁。聚会大量饮酒后，出现昏迷，抽搐 3 小时，急诊入院。从朋友处得知患者饮酒量约 800 mL 后逐渐胡言乱语，昏睡，继之昏迷，伴有剧烈抽搐，口吐白沫，最可能的诊断是

- A. 癫痫
- B. 中风

- C. 脑水肿
- D. 酒精中毒
- E. 食物中毒

71. 产妇，23岁。自然分娩，产后2小时，需严密观察宫缩及恶露情况，无关的观察项目是

- A. 宫底高度
- B. 呼吸频率
- C. 恶露多少
- D. 膀胱充盈
- E. 子宫质地

72. 某哮喘患者，呼吸极度困难，一口气不能说完一句话，伴发绀、大汗淋漓。对该患者首要的护理措施是

- A. 专人护理，准备抢救用品
- B. 加强巡视，防止情绪激动
- C. 帮助口服平喘药物
- D. 避免进食可能诱发哮喘的食物
- E. 采血做血气分析

73. 患儿，女，6岁。全身大面积开水烫伤送来急诊。四肢、后背大面积烫伤，创面红肿，大水疱。未伤及范围包括头、面部、颈部及前胸、腹部约8个手掌大的皮肤。估计其烧伤面积为

- A. 63%
- B. 67%
- C. 73%
- D. 77%
- E. 83%

74. 患者，女，46岁。确诊酮症酸中毒，经治疗后意识恢复。不明原因突然感到心悸、饥饿、出汗，随即又意识不清，下列哪项医嘱是正确的

- A. 加大胰岛素剂量
- B. 静脉滴注碳酸氢钠
- C. 加用格列本脲
- D. 静脉注射50%葡萄糖
- E. 应用呼吸兴奋剂

75. 患者，男，20岁。手臂刀砍伤，伤后6

小时来院。处理方法是

- A. 彻底清创并缝合
- B. 清创处理伤口不缝合
- C. 控制感染，定期更换敷料
- D. 清创、缝合并放置引流
- E. 清创、湿敷、包扎

76. 患者，女，17岁。车祸致右胫腓骨骨折，在功能锻炼时，下列选项不妥的是

- A. 主动、被动结合
- B. 动、静结合
- C. 分期锻炼
- D. 被动与助力运动为主
- E. 循序渐进

77. 患者，男，63岁。因渐进性排尿困难，夜尿增多就诊，医生询问病史后给患者做检查，诊断为前列腺增生症，下列治疗方案最适合该患者的是

- A. 药物治疗为主
- B. 根据全身情况及梗阻程度及前列腺增生部位选择治疗方法
- C. 手术并连同前列腺包膜一同切除
- D. 经尿道前列腺切除术
- E. 激光等热疗治疗

78. 患者，女，60岁。近2天出现尿频，尿急，尿痛，耻骨弓上不适，且有肉眼血尿，初诊急性膀胱炎。最适宜的口服药是

- A. 红霉素
- B. 氧氟沙星
- C. 甲硝唑
- D. 氨苄西林
- E. 碳酸氢钠

79. 患者，男性，65岁。右侧跖骨踝关节红肿疼痛，诊断为痛风性关节炎。首选的治疗药物是

- A. 美洛昔康
- B. 布洛芬
- C. 秋水仙碱
- D. 糖皮质激素
- E. 吲哚美辛

80. 患者，男，50岁。颅骨骨折术后，拟近期出院。护士在出院指导时应告知患者行颅骨修补术的时间宜在术后

- A. 6个月
- B. 1年
- C. 3个月
- D. 2年
- E. 10个月

81. 患者，女，50岁。慢性支气管炎、肺气肿病史20年。于剧烈咳嗽后突然出现呼吸困难，右胸刺痛，逐渐加重。该患者最可能是发生了

- A. 急性心肌梗死
- B. 慢性支气管炎急性发作
- C. 气胸
- D. 支气管哮喘
- E. 胸腔积液

82. 患儿，男，11个月。出现喷射性呕吐，前囟饱满，诊断为化脓性脑膜炎，下列护理措施中哪项不正确

- A. 严密观察患儿生命体征及瞳孔变化
- B. 保持室内安静，避免一切刺激
- C. 将患儿头肩抬高 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 侧卧位
- D. 给予甘露醇
- E. 增加补液量

83. 患者男，37岁。患胃溃疡9年余。行毕Ⅱ式胃大部切除术后，为预防倾倒综合征可食用的食物是

- A. 蛋糕
- B. 豆浆
- C. 骨头汤
- D. 牛奶
- E. 蒸蛋

84. 患儿，1岁。外伤致颅内出血，前囟隆起，喷射性呕吐，嗜睡，对光反射迟钝。观察中可提示脑疝发生的表现是

- A. 血压下降
- B. 四肢肌力减退
- C. 由嗜睡转为浅昏迷
- D. 双侧瞳孔不等大

E. 自主活动减少或消失

85. 患者，女，42岁。既往体健，近日因寒冷突然出现左侧面部闪电样剧痛，诊断为三叉神经痛。该患者首选的治疗药物是

- A. 地西洋
- B. 阿司匹林
- C. 卡马西平
- D. 泼尼松
- E. 吗啡

86. 患者，男，45岁。进行性消瘦、贫血、乏力，右下腹可触及肿块，大便隐血试验阳性，可能的诊断是

- A. 直肠癌
- B. 结肠息肉
- C. 右半结肠癌
- D. 左半结肠癌
- E. 慢性痢疾

87. 患者，男，64岁。慢性咳嗽、咳痰、偶有喘息10余年，活动后心悸、呼吸困难7天。查体：颈静脉怒张，肝大有压痛，下肢水肿，呼吸22次/分，心率115次/分。应首先考虑

- A. 风湿性心脏病
- B. 心肌炎
- C. 心力衰竭
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. 冠状动脉硬化性心脏病

88. 患者，男性，63岁。因前列腺增生症反复尿路感染入院，行耻骨后前列腺切除术治疗。护士术后护理的健康宣教中不正确的是

- A. 进食高纤维食物，防止便秘
- B. 多饮水，预防尿路感染
- C. 锻炼肛提肌，预防尿失禁
- D. 尽早锻炼如跑步等
- E. 2个月内禁止性生活

89. 患者，女，75岁。3年前被诊断为“肺心病”，此次上呼吸道感染后病情加重入院。护士应采取的正确的氧疗方式是

- A. 持续低流量给氧

- B. 间歇高流量给氧
- C. 机械通气给氧
- D. 持续高流量给氧
- E. 每天给氧 3~4 小时

90. 小儿, 1 岁。患有法洛四联症, 由母亲在家照顾。社区护士在进行健康教育中指出, 对法洛四联症等青紫型先天性心脏病患儿的护理中, 为防止其发生脑血栓等并发症, 应特别注意

- A. 避免过劳
- B. 低盐饮食
- C. 预防感染
- D. 多喂水
- E. 必要时哺喂前后吸氧

91. 患者, 女, 50 岁。G3P1。主诉腰骶部酸痛, 有下坠感。妇检: 患者平卧向下屏气用力时宫颈脱出阴道口, 宫体仍在阴道内, 其子宫脱垂为

- A. I 度轻型
- B. I 度重型
- C. II 度轻型
- D. II 度重型
- E. III 度

92. 患者, 男, 54 岁。间歇性无痛性肉眼血尿 3 个月, 左上腹部可触及肿块, 随呼吸活动, 轻度压痛。逆行肾盂造影发现左肾盂肾盏拉长变形。首先应考虑为

- A. 肾癌
- B. 肾囊肿
- C. 肾积水
- D. 肾盂癌
- E. 肾母细胞瘤

93. 患者, 男性, 40 岁。患急性心包炎、心包积液 2 月余, 近几日出现咳嗽、活动后气促, 有心绞痛样胸痛。体检: 有颈静脉怒张、肝大、腹水、下肢水肿、心率增快, 可见 Kussmaul 征。考虑诊断为

- A. 急性心包炎
- B. 缩窄性心包炎
- C. 亚急性心包炎

- D. 渗出性心包炎
- E. 纤维蛋白性心包炎

94. 患儿, 男, 9 岁。以急性肾小球肾炎收住入院, 经治疗患儿目前水肿消退, 血压正常, 肉眼血尿消失, 现可允许患儿

- A. 卧床休息
- B. 下床轻微活动
- C. 下床正常活动
- D. 可上学, 但免体育活动
- E. 恢复正常生活

95. 患者, 女, 45 岁。接受子宫颈癌根治手术治疗, 即将出院, 责任护士为她讲解随访计划, 让患者复述, 发现她理解错误的是

- A. 出院后一周进行首次复查
- B. 第一年内 2~3 个月复查
- C. 第二年内 3~6 个月复查
- D. 第 3~5 年半年复查
- E. 第 6 年起每年复查一次

96. 患者, 女, 70 岁。主诉轻微骨痛, 劳累或活动后加重, 诊断为骨质疏松。目前对患者生活影响最大的护理问题是

- A. 疼痛
- B. 营养失调
- C. 有受伤的危险
- D. 躯体活动障碍
- E. 焦虑

97. 患者, 男性, 62 岁。发现高血压 12 年, 近 4 年出现胸骨后疼痛, 诊断为原发性高血压、冠心病(心绞痛型)。检查: 血压 150/90 mmHg, 心率 130 次/分。给予硝苯地平 and  $\beta$  受体阻滞剂口服。关于  $\beta$  受体阻滞剂的药理作用, 以下说法正确的是

- A. 可减慢心率
- B. 可增加心排出量
- C. 可提高外周阻力
- D. 可增加肾素释放
- E. 可扩张支气管

98. 患者, 女, 26 岁。甲状腺功能亢进症 1 年, 服用甲硫咪唑治疗。近日出现发热、咽痛、胫前皮疹。最有可能出现了



- A. 过敏性皮疹
- B. 中毒性肝炎
- C. 粒细胞减少
- D. 甲状腺功能减退
- E. 血管神经性水肿

99. 患者，女，42岁。患十二指肠溃疡5年，聚会饮酒后出现刀刺样剧烈上腹疼痛入急诊。患者面色苍白，护士查体：血压80/65 mmHg，全腹肌紧张，压痛、反跳痛明显。该护士此时为患者采取的首要措施是

- A. 安慰患者，给予镇静药
- B. 持续低流量吸氧
- C. 立即禁食和胃肠减压
- D. 输注冷冻红细胞
- E. 持续心电图监护

100. 患者，男，45岁。高尿酸血症2年。近日患者夜间突发足踝部剧痛，诊断为痛风。护士在做健康教育时应告知患者，今后尽量避免食用的蔬菜是

- A. 西红柿
- B. 茄子
- C. 菠菜
- D. 青椒
- E. 冬瓜

二、以下提供若干个案例，每个案例下设若干考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳的答案。

(101~103题共用题干)

患者，女，63岁。因支气管扩张合并肺部感染、左心衰竭入院治疗，入院时体温39℃，呼吸急促，端坐呼吸。

101. 患者经抗炎、利尿、强心治疗后，体温降至正常，可平卧，现改用地高辛口服，护士给药时特别注意

- A. 应饭后服药
- B. 应空腹服药
- C. 用药前测脉率
- D. 应准时服药
- E. 服药后少饮水

102. 患者服用地高辛几天后，出现恶心、呕吐、视物模糊，护士应立即

- A. 报告护士长
- B. 给予止吐药
- C. 做心电图检查
- D. 做好患者心理护理
- E. 停止服药并报告医生

103. 患者以往有骨质疏松，自行长期口服活性钙，护士应嘱咐患者

- A. 立即停用
- B. 自行间断服用
- C. 改服其他钙剂
- D. 适当减量服用
- E. 在医护人员指导下服用

(104~106题共用题干)

患者，女，16岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。体格检查：烧伤部位有大量水疱，痛觉迟钝。

104. 患者烧伤的严重程度是

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 中重度
- D. 重度
- E. 特重度

105. 根据患者烧伤部位的特点，护士应重点观察其

- A. 呼吸功能
- B. 上肢血液循环
- C. 意识
- D. 疼痛程度
- E. 血压

106. 患者入院后第5天出现发热，体温39.2℃，创面有黄绿色分泌物伴有恶臭味。引起感染的细菌考虑为

- A. 溶血性链球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 梭形芽孢杆菌

(107~108题共用题干)

初产妇，24岁。第一产程出现不协调性宫缩过强，产妇烦躁不安，不停呻吟，拒绝抚触

其腹部，助产士小张考虑其为先兆子宫破裂。

107. 典型的先兆子宫破裂临床表现之一是

- A. 烦躁不安
- B. 呼吸、心率加快
- C. 排尿困难
- D. 病理性缩复环
- E. 胎心率改变

108. 针对先兆子宫破裂产妇，需做的辅助检查项目之一是

- A. 胎盘的位置
- B. 羊水量
- C. 胎盘的成熟度
- D. 尿常规有否血尿
- E. 胎儿双顶径

(109~111 题共用题干)

患者，男，50 岁。有慢性便秘多年。近半年来发现站立时右阴囊出现肿块，呈梨形，平卧时可还纳。局部检查，触诊发现右外环扩大，嘱患者咳嗽，指尖有冲击感，手指压迫内环处，站立咳嗽，肿块不再出现。

109. 本病例属于

- A. 腹股沟斜疝
- B. 腹股沟直疝
- D. 脐疝
- C. 股疝
- E. 切口疝

110. 为避免术后疝复发，术前主要措施是

- A. 治疗便秘
- B. 备皮
- C. 排尿
- D. 灌肠
- E. 麻醉前用药

111. 术后预防血肿的措施是

- A. 平卧位
- B. 保持敷料清洁干燥
- C. 托起阴囊，切口沙袋压迫
- D. 应用抗生素
- E. 不可过早下床活动

(112~113 题共用题干)

患儿女，3 岁。平时活动耐力低下，诊断为先天性心脏病，其心脏的血流动力学如图所示。

112. 根据上述血流动力学特点，考虑该患儿为

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 法洛四联症
- D. 动脉导管未闭
- E. 主动脉瓣关闭不全

113. 该患儿的心脏杂音特点是

- A. 舒张期隆隆样
- B. 收缩期泼水样
- C. 收缩期吹风样
- D. 舒张期吹风样
- E. 连续性机器样

(114~116 题共用题干)

患者，男，22 岁。支气管哮喘 10 年。近 2 天受凉后出现咳嗽、咳痰、气喘，考虑哮喘发作。今日突然出现右侧胸痛，大汗，呼吸困难加重。体检：气管向左侧移位，右胸叩诊鼓音。

114. 不符合哮喘发作表现的是

- A. 端坐呼吸
- B. 呼气音延长
- C. 两肺满布哮鸣音
- D. 两肺叩诊浊音
- E. 呼气性呼吸困难

115. 该患者可能合并了

- A. 右侧气胸
- B. 右侧胸腔积液
- D. 右侧肺纤维化
- C. 右侧肺梗死
- E. 右侧肺不张

116. 为确诊其并发症，首选的检查是

- A. 痰液检查
- B. 胸部 X 线检查
- C. 血液检查
- D. 血清 IgE 检测
- E. 动脉血气分析

(117~118 题共用题干)

患者，女，33 岁。干咳伴乏力、低热、夜间虚汗、体重减轻 2 个月余。X 线胸片示右上肺阴影。疑诊肺结核收住入院。

117. 未明确诊断，应进行的检查是

- A. 结核菌素试验
- B. 痰结核菌检查
- C. 呼吸功能检查
- D. 腹部 B 超
- E. 纤维支气管镜检查

118. 经检查确诊为肺结核，拟行异烟肼、利福平和吡嗪酰胺化疗。利福平的不良反应是可引起

- A. 周围神经炎
- B. 听力障碍
- C. 球后视神经炎
- D. 胃肠道反应
- E. 肝损害

(119~120 题共用题干)

患者，男，54 岁。胃溃疡病史 10 年，最近

3 个月胃痛加重，上腹胀满，时有呕吐。食欲减退，体重下降 3 kg。粪便隐血检查数次阳性。应用抗酸剂治疗胃痛，效果不好。

119. 做健康教育时要首先考虑该患者是

- A. 胃溃疡恶变
- B. 穿透性胃溃疡
- C. 复合溃疡
- D. 顽固性溃疡
- E. 胃后壁溃疡

120. 建议该患者首选的检查是

- A. CT
- B. B 型超声
- C. 纤维胃镜
- D. MRI
- E. X 线平片



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM