

2022口腔执业（助理）医师资格考试

口外 100 测试题

金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰教育医考研究院

- 1、利用电热或红外线烤箱高热烘烤进行灭菌的方法属于
 - A、煮沸消毒法
 - B、化学消毒法
 - C、干热灭菌法
 - D、医用酒精消毒法
 - E、高压蒸汽灭菌
- 2、关于锐性分离的说法错误的是
 - A、用于精细的层次解剖或分离粘连坚实的瘢痕组织
 - B、使用的器械为锐性的手术刀和手术剪
 - C、此法对组织损伤小
 - D、动作要求细巧、准确
 - E、可在盲视下进行
- 3、脓肿或无效腔的引流物的去除应在
 - A、手术后 24~48 小时
 - B、放置 24 小时后
 - C、24 小时内去除引流物
 - D、一般在 24 小时内引流量少于 20~30ml 时去除
 - E、渗出液完全消除为止
- 4、换药时应用棉球清洁的正确动作是
 - A、揩
 - B、擦
 - C、蘸
 - D、涂
 - E、蹭
- 5、缝合的创口，一般在 7~10 天内全部愈合者，称为
 - A、一期愈合
 - B、二期愈合
 - C、感染创口
 - D、无菌创口
 - E、延期愈合
- 6、淋巴结检查的正确顺序应是
 - A、枕部、耳后、耳前、腮腺、颊、颌下、颏下
 - B、腮腺、颊、颌下、颏下、枕部、耳后、耳前
 - C、颌下、颏下、枕部、耳后、耳前、腮腺、颊
 - D、耳后、耳前、腮腺、颊、颌下、颏下、枕部
 - E、颊、颌下、颏下、枕部、耳后、耳前、腮腺
- 7、正常人每日唾液总量为 1000~1500ml，其中腮腺和下颌下腺的分泌量占
 - A、50%

B、60%

C、70%

D、80%

E、90%

8、舌下腺囊肿穿刺可抽出

A、血液

B、蛋清样黏液

C、乳白色豆渣样分泌物

D、黄绿色清亮物质

E、黄绿色脓性物质

9、四头带临床上常用一段绷带，将其两端剪开一定长度，形成四个带头即可。带的长度一般为

A、35cm

B、50cm

C、70cm

D、80cm

E、100cm

10、涎腺分泌功能检查常选用的方法是

A、酸性物刺激测定

B、碱性物刺激测定

C、核磁共振检查

D、1天内自然分泌量

E、某一时段内自然分泌量测定

11、常用的局麻药物中，属于酯类的是

A、丁卡因

B、利多卡因

C、布比卡因

D、阿替卡因

E、甲哌卡因

12、临床上常用利多卡因进行表面麻醉的浓度是

A、0.25%~1%

B、0.5~1%

C、0.5%

D、1%

E、2%~5%

13、表浅的黏膜下脓肿切开引流，拔除松动的乳牙或恒牙，最常用的局麻方法是

A、涂布麻醉



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

B、阻滞麻醉

C、冷冻麻醉

D、吸入麻醉

E、低温麻醉

14、下列各选项中分布于上颌 87654|45678 腭侧牙龈及黏骨膜的神经是

A、腭前神经

B、眶下神经

C、上牙槽后神经

D、上牙槽中神经

E、鼻腭神经

15、局麻药中加入血管收缩剂的作用中，除外的是

A、加快局麻药吸收

B、降低毒性反应

C、延长局麻时间

D、减少术区出血

E、清晰术野

16、拔除上颌牙时，患者体位应是

A、头部应稍后仰，张口时上颌（牙合）平面与地面平行

B、头部应稍后仰，张口时上颌（牙合）平面与地面成 45°

C、头部应稍后仰，张口时上颌（牙合）平面与地面成 90°

D、头部应稍后仰，张口时上颌（牙合）平面与地面成 60°

E、头部应稍后仰，张口时上颌（牙合）平面与地面成 30°

17、不属于牙拔除术中并发症的一项是

A、干槽症

B、牙折断

C、软组织损伤

D、牙槽突骨折

E、邻近软组织损伤

18、不属于拔牙的禁忌证的是

A、不稳定的心绞痛

B、充血性心力衰竭

C、未控制的心律不齐

D、未控制的高血压

E、2年内发生过心肌梗死

19、牙拔除后至少多长时间，拔牙创内形成凝血块而将创口封闭

A、5分钟

B、10分钟

C、15分钟

D、30 分钟

E、45 分钟

20、以下哪种情况需行系带矫正术

A、系带位置影响牙齿萌出排列

B、舌系带过短影响发音

C、唇系带过短影响唇的运动

D、系带影响义齿的就位和稳定

E、以上均需要

21、可影响种植体骨结合的因素是

A、患者全身及局部的健康状况

B、患者的牙槽突的质量

C、口腔卫生习惯

D、种植体的应力分布

E、以上均是

22、手术创伤对种植体的骨结合有一定的影响，由于钻孔产热过高，严格控制产热和散热，用骨钻钻孔时，速度不能超过

A、500r/min

B、1000r/min

C、1500r/min

D、2000r/min

E、2500r/min

23、急性冠周炎早期局部治疗应首先采用

A、拔除患牙

B、龈袋烧灼

C、龈袋冲洗上药

D、切开引流

E、开髓引流

24、下列哪个间隙感染扩散不会引起颞间隙感染（助理不考）

A、咬肌间隙

B、下颌下间隙感染

C、颊间隙感染

D、颞下间隙

E、翼下颌间隙

25、广泛的颊间隙感染引流切口应该在下颌骨下缘（助理不考）

A、0.5~1cm

B、0.3~0.5cm

C、1~2cm

D、2~3cm

E、2.5~3.5cm

26、慢性中央性颌骨骨髓炎病变比较局限者，死骨与周围组织分离的时间在发病后

- A、1~2周
- B、3~4周
- C、4~8周
- D、2个月以上
- E、半年以上

27、感染形成脓肿时面部肿胀明显，但脓肿难以自行溃破，不易发现波动感的间隙为

- A、咬肌间隙
- B、眶下间隙
- C、口底多间隙
- D、下颌下间隙
- E、颞间隙感染

28、新生儿颌骨骨髓炎感染来源多为（助理不考）

- A、腺源性
- B、血源性
- C、损伤性
- D、牙源性
- E、医源性

29、以下哪一项最可能是引起颞间隙感染的来源（助理不考）

- A、下颌磨牙的根尖周脓肿
- B、化脓性扁桃体炎
- C、下牙槽神经阻滞麻醉消毒不严
- D、颞乳突炎
- E、第一前磨牙的根尖化脓性炎症

30、颌面部疔痛最常见的致病菌是

- A、白色念珠菌
- B、溶血性链球菌
- C、厌氧性链球菌
- D、铜绿假单胞菌
- E、金黄色葡萄球菌

31、下颌骨骨折的临床愈合所需时间

- A、4~6周
- B、5~7周
- C、6~8周
- D、7~9周

E、3个月

32、出血性休克的早期表现除外的是

- A、轻度烦躁
- B、口渴
- C、呼吸浅快
- D、皮肤苍白
- E、心率减慢

33、出现机体失代偿的表现是一般丢失的血容量已达到

- A、15%以下
- B、15%以上
- C、20%以上
- D、30%以上
- E、50%以上

34、LeFort III型骨折是指

- A、锥形骨折
- B、下颌骨骨折
- C、上颌骨低位骨折
- D、上颌骨中位骨折
- E、上颌骨高位骨折

35、颌骨骨折的复位标准是

- A、骨性愈合
- B、纤维性愈合
- C、骨折线上的牙齿不松动
- D、恢复原有咬合关系
- E、无感染发生

36、脑挫裂伤意识障碍取决于

- A、损伤的部位
- B、损伤的程度
- C、损伤的时间
- D、周围的环境
- E、损伤的原因

37、运送昏迷患者可采用的体位是

- A、俯卧位
- B、仰卧位
- C、侧卧位
- D、头侧向一侧
- E、以上体位均可

38、X线表现呈“M”或“V”形，是哪一类型骨折的特征性表现

- A、上颌骨骨折
- B、下颌骨骨折
- C、眶底骨折
- D、颧弓骨折
- E、颅底骨折

39、颌面部创口初期缝合最宽时间为

- A、6h
- B、12h
- C、24h
- D、48h

E、大于 48h 的创口，只要没有明显的化脓，清创后仍可作初期缝合

40、牙槽突骨折后用牙弓夹板、金属丝等方法固定后，注意应至少跨过骨折线几个正常牙位

- A、2 个
- B、3 个
- C、4 个
- D、5 个
- E、6 个

41、牙龈瘤来源于

- A、牙周膜
- B、牙槽骨
- C、颌骨骨皮质
- D、牙龈上皮
- E、牙周膜及颌骨牙槽突的结缔组织

42、最易发生恶变的色素痣是（助理不考）

- A、皮内痣
- B、复合痣
- C、交界痣
- D、雀斑样色素痣
- E、毛痣

43、关于甲状舌管囊肿，哪一项是不正确的

- A、可发生于颈正中线上任何部位
- B、多见于 1~10 岁的儿童
- C、若囊肿发生于舌盲孔下面或前后部，可随吞咽上下移动
- D、不会发生癌变
- E、多无自觉症状

44、第二鳃裂囊肿常位于

- A、乳突附近

- B、下颌角附近
- C、颈前正中
- D、颈根部
- E、舌骨水平，胸锁乳突肌上 1/3 前缘附近

45、临床上最多见的鳃裂囊肿来源于

- A、第一鳃裂
- B、第二鳃裂
- C、第三鳃裂
- D、第四鳃裂
- E、胸腺咽管

46、单纯行刮除术后易复发的颌骨囊肿是

- A、根端囊肿
- B、角化囊肿
- C、始基囊肿
- D、含牙囊肿
- E、血管外渗性囊肿

47、颈淋巴转移率最高，且早期转移的肿瘤是

- A、舌癌
- B、唇癌
- C、颊癌
- D、牙龈癌
- E、上颌窦癌

48、来源于间叶组织的恶性肿瘤通常称为

- A、良性肿瘤
- B、恶性肿瘤
- C、肉瘤
- D、临界瘤
- E、瘤样病变

49、下列关于含牙囊肿的描述中，正确的是

- A、发生于牙冠或牙根形成之后
- B、可来自一个牙胚，含一个牙
- C、可来自多个牙胚，含多个牙
- D、含牙囊肿就是滤泡囊肿
- E、以上说法均正确

50、血管瘤其病程进入静止消退期一般是在

- A、出生以后
- B、1 年以后

C、2 年以后

D、3 年以后

E、4 年以后

51、腺样囊性癌常沿什么扩散（助理不考）

A、神经

B、淋巴结

C、血液

D、骨膜

E、筋膜

52、外伤后涎瘘的诊断主要通过

A、CT

B、MRI

C、ECT

D、B 超

E、造影

53、下颌下腺炎常见的原因是

A、淋巴结炎

B、冠周炎

C、牙槽脓肿

D、结石阻塞导管

E、血源性感染

54、较大的囊肿可将舌抬起，状似“重舌”，是哪种囊肿的特征性表现

A、舌下腺囊肿单纯型

B、舌下腺囊肿口外型

C、皮样囊肿

D、表皮样囊肿

E、囊性水瘤

55、唾液腺恶性肿瘤中最常见的是（助理不考）

A、沃辛瘤

B、多形性腺瘤

C、腺样囊性癌

D、黏液表皮样癌

E、以上说法均正确

56、慢性复发性腮腺炎腮腺造影 X 线表现为

A、导管移位，腺体内有充盈缺损

B、造影剂外溢呈团块状

C、导管中断，或圆形、卵圆形充盈缺损，其远心端导管扩张

D、导管系统无异常改变或轻微扩张，末梢导管扩张呈点状、球状

E、只有主导管分层状改变，没有末梢导管扩张

57、颞下颌关节急性脱位后限制下颌运动的固定方法可采用

A、十字绷带包扎

B、颅颌绷带包扎

C、三角绷带包扎

D、单眼绷带包扎

E、四头绷带包扎

58、临床上最常见的颞下颌关节脱位是

A、陈旧性脱位

B、复发性脱位

C、急性前脱位

D、颞下颌关节强直

E、不可复性关节盘前移位

59、关于不可复性关节盘前移位临床特点的叙述，哪项是错误的

A、开口时下颌偏向健侧

B、典型的关节弹响病史

C、X线片显示关节前间隙增宽

D、被动开口检查，开口度不能增大

E、间断性关节绞锁史

60、颞下颌关节紊乱病是口腔颌面部常见病之一，以下列哪一年龄组患病率、就诊率最高

A、15岁以内

B、20岁以内

C、20~30岁

D、40~50岁

E、50岁以上

61、下列属于三叉神经功能检查的是

A、感觉功能

B、角膜反射

C、腭反射

D、运动功能

E、以上均是

62、哪项检查目的在于观察膝状神经节是否受损

A、味觉检查

B、听觉检查

C、泪液检查

D、有无面瘫

E、唾液分泌功能

63、贝尔面瘫与中枢性面瘫相鉴别的重要临床表现是

- A、眼睑闭合不全
- B、额纹消失，不能皱眉
- C、口角偏斜
- D、鼓腮不能
- E、鼻唇沟消失

64、对于原发性三叉神经痛有效的药物是

- A、卡马西平
- B、苯妥英钠
- C、氯硝西洋
- D、山莨菪碱
- E、以上均是

65、关于原发性三叉神经痛，下列哪项是错误的

- A、多为单侧发病
- B、可有“扳机点”存在
- C、疼痛呈阵发性、刀割样剧痛
- D、神经系统检查往往有阳性体征
- E、疼痛分布于三叉神经分布区域内

66、单侧唇裂形成的胚胎基础为

- A、一侧内侧鼻突与上颌突未联合
- B、两侧内侧鼻突未融合
- C、上颌突和下颌突未融合
- D、上颌突与外侧鼻突未融合
- E、下颌突与下颌突未融合

67、根据流行病学调查，新生儿唇腭裂的患病率大约为

- A、0.6:1000
- B、1.6:1000
- C、2.6:1000
- D、1.0:1000
- E、2.0:1000

68、目前，腭裂整复术多选择在

- A、3~6个月
- B、12~18个月
- C、6~12个月
- D、5~6岁
- E、8~12岁

69、以下有关腭裂临床表现中，不恰当的是

- A、吸吮功能障碍
B、鼻腔内的分泌物可很自然地流入口腔
C、易引起咽鼓管感染
D、易发生中耳炎
E、牙列正常
- 70、唇腭裂患儿要达到较满意的形态和功能效果，需进行序列治疗，一般包括（助理不考）
A、心理治疗
B、耳科治疗
C、语音治疗
D、唇、腭裂二期整复术
E、以上均包括
- 71、目前唾液腺造影术可用于
A、舌下腺及下颌下腺
B、舌下腺及腮腺
C、舌下腺
D、腮腺及腭腺
E、腮腺及下颌下腺
- 72、唾液腺造影的禁忌证是
A、肿瘤
B、慢性炎症
C、涎瘘
D、急性化脓性腮腺炎
E、口干
- 73、颞下颌关节紊乱病关节盘诊断一般使用
A、许勒位片
B、关节造影
C、开口位片
D、锥形束 CT 片
E、下颌横断（牙合）片
- 74、采用根尖片分角线投照技术显示被检查牙齿邻面影像重叠的原因
A、投照垂直角度过大
B、投照垂直角度过小
C、X 线与被检查牙齿的邻面不平行
D、X 线与被检查牙齿的邻面不垂直
E、X 线中心线位置不正确
- 75、根尖片可显示下列哪种牙髓病变
A、急性牙髓炎

- B、牙髓充血
- C、牙髓坏死
- D、牙内吸收
- E、以上都不是

76、华特位片用于协助诊断

- A、髁突骨瘤
- B、下颌骨肿瘤
- C、下颌骨颞孔
- D、颞下颌关节
- E、牙源性上颌窦炎

77、以下哪种病变 X 线片表现为根尖周圆形低密度透射区，边缘有一薄层密质白线

- A、急性根尖周炎
- B、慢性根尖脓肿
- C、根尖肉芽肿
- D、根尖囊肿
- E、牙骨质增生

78、可复性关节盘前移位时弹响杂音的特点

- A. 开口初期或开口初闭口末清脆单声弹响
- B. 开口末闭口初清脆单声弹响
- C. 多声破碎音
- D. 连续摩擦音
- E. 一般无弹响

79、牙颌面畸形的治疗包括（助理不考）

- A、术前正畸治疗
- B、确认手术计划
- C、正确施术
- D、完成术前准备
- E、以上都是

80、皮瓣移植后首先恢复的感觉是（助理不考）

- A、冷
- B、热
- C、痒
- D、痛
- E、以上都是

81、眶下神经阻滞麻醉口外注射法，注射针进入眶下孔内，注射麻药

- A、0.3~0.5ml
- B、0.5~1ml

C、1ml

D、1.5~2ml

E、2~3ml

82、在行下牙槽神经麻醉口内注射后，将注射针退出多少可行舌神经阻滞麻醉

A、退出 0.1cm

B、退出 0.5cm

C、退出 1.0cm

D、退出 1.5cm

E、退出 2.0cm

83、麻醉同侧下颌舌侧牙龈、黏骨膜、口底黏膜及舌前 2/3 部分，可行的阻滞麻醉方法是

A、眶下神经阻滞麻醉

B、颊神经阻滞麻醉

C、鼻腭神经阻滞麻醉

D、舌神经阻滞麻醉

E、腭前神经阻滞麻醉

84、颊长神经阻滞麻醉一般注射麻药量是

A、0.1ml

B、0.5~1ml

C、1.5~2ml

D、2.5ml

E、2~3ml

85、行口内注射行下牙槽神经阻滞麻醉后，针尖退至肌层、黏膜下时注射麻醉药可同时麻醉

A、颊神经

B、咬肌神经

C、下颌神经

D、鼻腭神经

E、腭前神经

86、下列再植牙成功的判断标准，除外的是

A、疼痛消失，无感染

B、X 线片示牙根无异常透射影

C、牙龈附着正常

D、行使功能达 7 年以上

E、牙齿无松动

87、安放拔牙钳放置时注意事项中，除外

A、手掌勿太接近关节部

B、钳喙的长轴必须与牙长轴垂直

- C、钳喙的位置必须在牙根部
D、钳喙应紧贴牙面滑入牙颈部
E、握钳时应握钳柄接近末端处
- 88、下列牙根拔除基本操作步骤，恰当的是
A、根钳拔除法适用于高位残根
B、如牙根断面是斜面，根挺应从斜面较高的一侧插入
C、牙挺取根法适用于根的折断部位比较低，根钳无法夹住时
D、牙挺取根法支点应为牙槽间隔，或腭侧骨板
E、以上说法均正确
- 89、下列有关干槽症的治疗方法中，除外
A、清创
B、隔离外界刺激
C、促进肉芽组织生长
D、局部止血药物
E、抗炎、止痛
- 90、下列不属于下颌第三磨牙阻生分类方法的是
A、根据牙与下颌升支及第二磨牙的关系
B、根据牙在骨内的深度
C、根据牙龈覆盖阻生齿的程度
D、根据阻生第三磨牙的长轴与第二磨牙的长轴关系
E、可根据牙在正常牙列中线的位置
- 91、唾液腺黏液囊肿最常见的好发部位是
A、上唇
B、下唇
C、腮腺
D、舌下腺
E、颌下腺
- 92、以下符合慢性阻塞性腮腺炎临床表现的是
A、导管口流出混浊液体
B、导管口流出黄色凝胶状液体
C、导管口流出草黄色或草绿色液体流出
D、导管口可有脓性或黏液脓性唾液流出
E、导管口流出混浊的“雪花样”或黏稠的蛋清样唾液
- 93、有关急性化脓性腮腺炎治疗的说法中，错误的是
A、可进行放射治疗
B、可进行热敷
C、可行切开引流

D、可选用有效抗生素

E、加强口腔卫生护理

94、关于急性化脓性腮腺炎病因的说法不包括

A、主要致病菌是链球菌

B、常见于腹部大手术后

C、常见于高热或禁食的病员

D、常见于体质虚弱、长期卧床的病员

E、常见于急性传染病或脓毒血症的病员

95、下列不是“扳机点”在上颌支的部位的是

A、眶下孔

B、下眼睑

C、鼻唇沟

D、耳屏部

E、鼻翼

96、三叉神经功能检查项目中不包括

A、三叉神经分布区皮肤与黏膜的触、温、痛觉

B、角膜反射

C、腭反射

D、希尔默试验

E、咀嚼肌运动功能检查

97、下列关于“单侧完全性腭裂”的叙述，不恰当的是

A、单侧完全性腭裂的裂隙自腭垂至切牙孔完全裂开

B、裂隙斜向外侧直抵牙槽突

C、裂隙与牙槽裂相连

D、健侧裂隙缘与鼻中隔相连

E、不会伴发同侧唇裂

98、进行单侧唇裂整复术最适合的年龄为

A、出生后即刻

B、1~2个月

C、3~6个月

D、7~12个月

E、1~2岁

99、钝性分离最常使用的分离器械是

A、锐性的手术刀

B、手术剪

C、血管钳

D、刀柄

E、手指

100、下列关于引流物的放置时间的叙述中，正确的是

- A、无效腔的引流物应放置至脓液及渗出液完全消除为止
- B、污染创口引流物多在 24~48 小时后去除
- C、负压引流一般在 24 小时内引流量少于 20~30ml 时去除
- D、脓肿的引流物应放置至脓液及渗出液完全消除为止
- E、以上均正确



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



关注公众号，获取更多学习资料