

2024年医师考试密卷--临床助理

A1/A2 型选择题

1. 假定两种方法检测结果的假阳性率和假阴性率都很低。现有 50 份血样用甲法检查阳性 25 份，用乙法检查阳性 35 份，其中两法同为阳性和阴性的分别为 23 和 13 份。为检验两种方法检查结果之间的差别是否有显著性意义，应选用（ ）。

- A. 配对 t 检验
- B. 行 x 列表卡方检验
- C. 配对卡方检验
- D. 格表卡方检验
- E. 两样本的 t 检验

2. 不属于医学伦理学原则的是（ ）。

- A. 有利
- B. 公正
- C. 不伤害
- D. 克己
- E. 尊重

3. 下列引起酶原激活方式的叙述哪一项是正确的？（ ）

- A. 氢键断裂，酶分子的空间构象发生改变引起的
- B. 酶蛋白与辅酶结合而实现的
- C. 是由低活性的酶形式转变成高活性的酶形式
- D. 酶蛋白被修饰
- E. 部分肽键断裂，酶分子空间构象改变引起的

4. 下述机构中的医师不适用执业医师法的是（ ）。

- A. 计划生育技术服务机构
- B. 药品生产经营机构
- C. 医疗机构
- D. 预防机构
- E. 保健机构

5. 一足部患有严重溃疡的糖尿病病人，经治疗病情未减轻，且有发生败血症的危险，此时为保证病人的生命而需要对病人截肢，这里包含的冲突是（ ）。

- A. 有利原则与公正原则的冲突
- B. 有利原则与尊重原则阿冲突
- C. 不伤害原则与有利原则的冲突
- D. 不伤害原卿与公正原则的冲突
- E. 不伤害原则与尊重原则的冲突

6. 情感对于情绪来说具有的特点是（ ）。
- A. 强烈而冲动
 - B. 伴有明显的行为变化
 - C. 伴有明显的生理变化，
 - D. 稳定而深刻
 - E. 带有明显的情境性
7. 心身疾病的诊断标准不包括（ ）。
- A. 根据临床症状、体征和特殊检查明确器质性改变
 - B. 疾病的发生有相平行的心理社会因素
 - C. 排除神经症和精神疾病
 - D. 单纯的生物医学疗法收效甚微
 - E. 由某种躯体疾病引发心理障碍
8. 在下列氯丙嗪适应证中，哪个是错误的？（ ）
- A. 人工冬眠
 - B. 镇吐
 - C. 麻醉前用药
 - D. 精神分裂症
 - E. 抑郁性精神病
9. 流行病学主要研究（ ）。
- A. 医院内的病人及患病有关因素
 - B. 正常人群的健康水平
 - C. 死健康人群的健康水平
 - D. 人群中疾病与健康状况的分布及其影响因素
 - E. 社区内高危人群及健康水平
10. 关于蛋白质变性的叙述，哪项正确？（ ）
- A. 变性蛋白质会发生分子量前变化
 - B. 变性蛋白质溶解度降低是因为中和了电
 - C. 蛋白质变性后，其溶液的黏度降低
 - D. 蛋白质变性破坏了其二、三和四级结构和一级结构
 - E. 蛋白质变性就意味着肽键断开
11. 下列有关糖异生的正确叙述是（ ）。
- A. 原料为甘油、脂肪酸、氨基酸等
 - B. 主要发生在肝、肾、肌肉
 - C. 糖酵解的逆过程
 - D. 不利于乳酸的利用
 - E. 需要克服三个障碍
12. 雷尼替丁治疗消化性溃疡的机制为（ ）。
- A. 中和胃酸

- B. 吸附胃酸
 - C. 阻断胃腺壁细胞上的 H₁受体, 抑制胃酸分泌
 - D. 阻断胃腺壁细胞上的 H₂受体, 抑制胃酸分泌
 - E. 阻断胃腺壁细胞上的 DA 受体. 抑制酸分泌
13. 影响生物利用度较大的因素是 ()。
- A. 给药次数
 - B. 给药时间
 - C. 给药剂量
 - D. 给药途径
 - E. 年龄
14. 若将血沉增快患者的红细胞置于正常人血浆中, 其红细胞沉降的速度将 ()。
- A. 增快
 - B. 下降
 - C. 正常
 - D. 无变化
 - E. 以上都不是
15. 下列激素可直接激活三酰甘油 (甘油三酯) 脂肪酶, 例外的是 ()。
- A. 肾上腺素
 - B. 胰高血糖素
 - C. 胰岛素
 - D. 去甲肾上腺素
 - E. 促肾上腺皮质激素
16. 强心苷禁用于 ()。
- A. 高血压引起的心力衰竭
 - B. 心房颤动
 - C. 心房扑动
 - D. 室上性心动过速
 - E. 室性心动过速
17. 人体姿势维持的基础是 ()。
- A. 骨骼肌收缩
 - B. 骨骼肌舒张
 - C. 腱反射
 - D. 肌紧张
 - E. 屈肌反射
18. CO₂ 在血液中运输的主要方式是 ()。
- A. 物理溶解

- B. 与水结合成碳酸
- C. 形成氧合血红蛋白
- D. 形成碳酸氢盐

E. 形成氨基甲酸血红蛋白

19. 急性细菌性痢疾的病变属于（ ）。

- A. 卡他性炎
- B. 变质性炎
- C. 化脓性炎
- D. 假膜性炎
- E. 出血性炎

20. 成瘾小，影响快动眼睡眠时相小的安眠药（ ）。

- A. 哌替啶
- B. 地西洋
- C. 氯丙嗪
- D. 甲丙氨酯
- E. 苯巴比妥

21. 下列哪种病变是癌前病变？（ ）

- A. 子宫颈浆细胞肉芽肿
- B. 子宫颈潴留囊肿
- C. 慢性、糜烂性子宫颈炎
- D. 子宫颈息肉
- E. 子宫颈肥大

22. 急性病毒性肝炎（普通型）的病变特点是肝细胞（ ）。

- A. 广泛坏死，变性轻微
- B. 广泛变性，坏死轻微
- C. 广泛再生，变性较轻
- D. 广泛坏死，再生较轻
- E. 变形、坏死、再生均广泛

23. 槟榔肝是指肝发生了（ ）。

- A. 硬化
- B. 慢性炎症
- C. 脂肪沉积
- D. 慢性淤血
- E. 亚急性红色（黄色）萎缩

24. 干性支气管扩张症的主要症状是（ ）。

- A. 反复咳嗽
- B. 大量脓痰
- C. 反复咯血

D. 营养不良

E. 肌肉酸痛

25. 风湿性心内膜炎好发于（ ）。

A. 主动脉瓣

B. 二尖瓣

C. 心内膜

D. 肺动脉瓣

E. 三尖瓣

26. 哮喘急性发作早期动脉血气分析最常见的表现（ ）。

A. P_{aO_2} 降低、 P_{aCO_2} 上升、pH 上升

B. P_{aO_2} 降低、 P_{aCO_2} 上升、pH 下降

C. P_{aO_2} 正常、 P_{aCO_2} 上升、pH 下降

D. P_{aO_2} 降低、 P_{aCO_2} 正常、pH 下降

E. P_{aO_2} 降低、 P_{aCO_2} 降低、pH 上升

27. 精神病病人最常见的幻觉是（ ）。

A. 听幻觉

B. 视幻觉

C. 嗅幻觉

D. 味幻觉

E. 触幻觉

28. X 线出现蚕蚀空洞的是（ ）。

A. 原发型肺结核

B. 浸润型肺结核

C. 结核性胸膜炎

D. 血行播散型肺结核

E. 慢性纤维空洞型肺结核

29. 脑血管病常见病因哪项不正确？（ ）

A. 脑帆管病最常见原洲足动脉粥样硬化

B. 先天性动脉瘤是蛛网膜下腔出血最常见病因

C. 脑梗死最常见病因是脑动脉炎

D. 心源性栓子是脑栓塞最常见的栓子来源

E. 高血压是脑出血最常见病因

30. 伤寒的肠道病变主要发生在（ ）。

- A. 回肠下段
- B. 回盲部
- C. 盲肠
- D. 乙状结肠
- E. 直肠

31. 甲亢时突眼类型中最多见的是（ ）。

- A. 侧浸润型突眼
- B. 侧非浸润性突眼
- C. 双侧非浸润性突眼
- D. 双侧浸润性突眼
- E. 以上都不是

32. 支气管哮喘的临床特征主要是（ ）。

- A. 吸气性呼吸困难
- B. 反复发作，阵发性，呼气性呼吸困难
- C. 反复发作，混合性呼吸困难
- D. 夜间阵发性呼吸困难
- E. 肺部有较多喘鸣伴肺底湿性啰音

33. 腺垂体功能减退症最常见的病因是（ ）。

- A. 垂体或邻近的肿瘤
- B. 颅内感染
- C. 产后大出血
- D. 颅脑外伤
- E. 脑血管疾病

34. 缺铁性贫血患者，最可能出现的体征是（ ）。

- A. 肝脾大
- B. 淋巴结肿大
- C. 舌乳头萎缩
- D. 指甲变薄变脆
- E. 胸骨压痛

35. 不能透过肾小球滤过膜的是（ ）。

- A. 钠离子
- B. 氨基酸
- C. 甘露醇
- D. 葡萄糖
- E. 血浆白蛋白

36. 慢性肾衰竭进展过程中最早出现的临床表现常为（ ）。

- A. 消化道症状
- B. 贫血

- C. 出血
- D. 反复感染
- E. 骨痛

37. 以下哪项不是急性感染性多发性神经炎的常用治疗措施? ()

- A. 糖皮质激素
- B. 甲状腺激素
- C. 血浆交换
- D. B 族维生素
- E. 肢体功能锻炼

38. 符合过敏性紫癜实验室检查的是 ()。

- A. 血小板减少
- B. 出血时间延长
- C. 凝血时间延长
- D. 血块收缩不良
- E. 毛细血管脆性试验可阳性

39. 结核渗出性胸膜炎常规治疗不包括 ()。

- A. 胸腔抽液
- B. 激素治疗
- C. 对症治疗
- D. 支持疗法
- E. 抗结核治疗

40. 抗结核药联合短程化疗最有价值的是 ()。

- A. 减少药物副作用
- B. 减少并发症
- C. 减少或避免后遗症
- D. 减少或避免耐药性发生
- E. 症状缓解快

41. 再障下列哪项不正确? ()

- A. 骨髓增生低下
- B. 铁剂、叶酸治疗无效
- C. 浆细胞、单核、淋巴细胞等非造血细胞增多
- D. 巨核细胞数量减少
- E. 慢性病例, 贫血、感染、出血较轻

42. 关于慢性肾衰竭饮食治疗原则, 下列哪项是错误的? ()

- A. 高生物效价的低蛋白饮食
- B. 供给充分非必需氨基酸
- C. 尽可能低磷饮食
- D. 供给充分热卡, 力求达到正氮平衡

E. 尿量正常，患者若无水肿，应适当饮水

43. 不能引起败血症的细菌感染是（ ）。

- A. 葡萄球菌
- B. 链球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 破伤风杆菌
- E. 铜绿假单胞菌

44. 突然发生，完全不能用病人当时的处境和心理背景采解释的妄想是（ ）。

- A. 继发性妄想
- B. 关系妄想
- C. 被害妄想
- D. 原发性妄想
- E. 超价观念

45. 脊髓前角运动细胞病变时，出现（ ）。

- A. 相应节段支配肌的中枢性瘫痪，无感觉障碍
- B. 周围神经支配区肌肉的周围性瘫痪，无感觉障碍
- C. 周围神经支配区肌肉的周围性瘫痪，有感觉障碍
- D. 相应节段支配肌的周围性瘫痪，无感觉障碍
- E. 相应节段支配肌的周围性瘫痪，有感觉障碍

46. 《传染病防治法》规定，传染病暴发、流行时，当地政府应当（ ）。

- A. 立即组织力量进行防治制，切断传染病的传播途径
- B. 限制或停止集市、集会
- C. 停业、停工、停课
- D. 临时征用房屋、交通工具
- E. 宣布疫区

47. 急性白血病发生贫血的最主要因素是（ ）。

- A. 骨髓造血受白血病细胞干扰
- B. 脾脏大，破坏红细胞过多
- C. 化疗后胃肠功能紊乱，营养缺乏
- D. 严重皮肤黏膜及内脏出血
- E. 产生抗红细胞抗体

48. 诊断慢性支气管炎的主要依据是（ ）。

- A. 病史
- B. 阳性体征
- C. 胸部 X 线检查
- D. 心电图改变

E. 肺功能检查

49. 有关左心室附壁血栓，下述哪项是正确的？（ ）

- A. 引起肺栓塞
- B. 引起脑栓塞
- C. 诱发心壁穿孔
- D. 加重心肌梗死
- E. 阻塞心室血流

50. 社区感染性肺炎最常见革兰阴性杆菌是病原体（ ）。

- A. 大肠埃希菌
- B. 肺炎克雷伯杆菌
- C. 铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）
- D. 流感嗜血杆菌
- E. 嗜肺军团菌

51. 随机抽样中较准确而且便于实行的方法是（ ）。

- A. 单纯随机抽样
- B. 机械抽样
- C. 分层抽样
- D. 整群抽样
- E. 分层加整群

52. 心排血量是指（ ）。

- A. 每分钟由一侧心室所射出的血量
- B. 每分钟由左、右心室所射出的血量
- C. 每分钟由心房所射出的血量
- D. 心脏每搏动一次，由一侧心室所射出的血量
- E. 心脏每搏动一次，由左、右心室所射出的血量

53. 属于永久性细胞的是（ ）。

- A. 血管内皮细胞
- B. 造血细胞
- C. 肝细胞
- D. 中枢神经细胞
- E. 表皮细胞

54. 在“尿生成影响因素”实验中，给家兔静脉注射 20%葡萄糖溶液 10ml，尿量将显著增多，其原因是（ ）。

- A. 肾小管液中溶质浓度增高
- B. 抗利尿激素分泌减少
- C. 醛固酮
- D. 肾小球滤过率增加
- E. 肾小球有效滤过压增高

55. 有关胸膜腔内压的叙述，错误的是（ ）。
- A. 一般情况下是负压
 - B. 胸内压=肺内压-肺回缩压
 - C. 胸膜腔内负压有利于静脉回流
 - D. 使肺维持一定的扩张程度
 - E. 产生气胸时负压增大
56. 抑郁症的急性期，抗抑郁药治疗至少（ ）。
- A. 1~2 周
 - B. 2~4 周
 - C. 4~6 周
 - D. 6~8 周
 - E. 8~10 周
57. 肿瘤的分化程度低说明其（ ）。
- A. 异型性小
 - B. 生长缓慢
 - C. 不易转移
 - D. 对机体影响小
 - E. 恶性程度高
58. 抗结核药物中 INH 的成人常规每日用量是（ ）。
- A. 50mg
 - B. 100mg
 - C. 150mg
 - D. 200mg
 - E. 300mg
59. 葡萄球菌感染引起的炎症反应中，病灶中主要的炎细胞是（ ）。
- A. 单核细胞
 - B. 淋巴细胞
 - C. 嗜中性粒细胞
 - D. 嗜酸性粒细胞
 - E. 浆细胞
60. 关于急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病，下列哪项不正确？（ ）
- A. 首发症状通常为四肢对称性无力
 - B. 脑神经损害以双侧面瘫常见
 - C. 大多数病例脑脊液蛋白-细胞分离
 - D. 主要危险是呼吸肌麻痹
 - E. 多数病例出现括约肌功能障碍
61. 学习是指通过练习而引起的（ ）。
- A. 经验的积累过程

- B. 能力的提高过程
- C. 知识的增长过程
- D. 心理的发育过程
- E. 持久的行为变化过程

62. 高血压病并发脑出血的常见部位是（ ）。

- A. 大脑皮质
- B. 脑桥
- C. 小脑
- D. 内囊及基底核区
- E. 延髓

63. 甲亢患者合并妊娠 8 个月宜采用治疗的措施是（ ）。

- A. 大剂量硫脲类药物
- B. 手术治疗
- C. 大剂量 B 受体阻滞药
- D. 小剂量丙硫氧嘧啶
- E. 放射性核素治疗

64. 支气管扩张症的治疗下列哪项是错误的？（ ）

- A. 体位引流的作用有时较抗生素治疗尤为重要
- B. 有时可考虑环中膜穿刺，注入抗生素及湿化液
- C. 经纤支镜局部灌洗后，注入抗生素也有显著疗效
- D. 大咯血者，病变超过二叶肺手术治疗
- E. 在引流痰液较多时，应注意将痰液逐渐咳出，以防发生窒息

65. 能引起肾病综合征的疾病是（ ）。

- A. 隐匿性肾炎
- B. 间质性肾炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 狼疮性肾炎

66. 蛋白质分子中小螺旋的特点是（ ）。

- A. 中螺旋为左手螺旋
- B. 每一螺旋含 3 个氨基酸残基
- C. 靠氢键维持的紧密结构
- D. 氨基酸侧链伸向螺旋内部
- E. 结构中含有脯氨酸

67. 治疗呼吸衰竭时，为建立通畅的气道应采取以下措施，除了（ ）。

- A. 给予祛痰药促进排痰
- B. 给予可待因止咳
- C. 给予支气管解痉药

D. 必要时做气管插管吸痰

E. 必要时做气管切开吸痰

68. 易出现逆行性遗忘症状的疾病是（ ）。

A. 脑外伤

B. 老年性痴呆

C. 焦虑性神经症

D. 精神分裂症

E. 抑郁症

69. 氨茶碱的主要平喘机制为（ ）。

A. 抑制磷酸二酯酶

B. 直接舒张支气管

C. 促进肾上腺素的释放

D. 激活鸟苷酸环化酶

E. 抑制腺苷酸环化酶

70. 支气管扩张最有意义的体征是（ ）。

A. 贫血

B. 杵状指

C. 固定的局限性湿啰音

D. 消瘦

E. 多变的哮鸣音

71. 手术治疗中一般病人知情权不包括（ ）。

A. 有权自主选择

B. 有同意的合法权利

C. 有明确决定的理解力

D. 有家属代为决定的权利

E. 有做出决定的认知力

72. 一般手术切口在第 7 天左右拆线的原因主要是（ ）。

A. 肉芽组织已形成

B. 胶原纤维已产生

C. 表皮已再生

D. 炎症已消退，

E. 伤口已愈合

73. 在整个反射弧中，最易出现疲劳的部位是（ ）。

A. 感受器

B. 传入神经元

C. 反射中枢中的突触

D. 传出神经元

E. 效应器

74. 下列哪一项不是生态系统的功能? ()

- A. 能量交换
- B. 物质的循环转移
- C. 信息传递
- D. 相互依存、相互制约
- E. 吸取所需营养物质

75. 心室肌细胞动作电位的主要特征是 ()。

- A. 0 期除极迅速
- B. 1 期复极快
- C. 有缓慢的 2 期平台
- D. 有快速的 3 期复极
- E. 有 4 期自动除极

76. 对地西洋错误的叙述是 ()。

- A. 安全范围较大
- B. 对快波睡眠影响小
- C. 不引起全身麻醉
- D. 醒后无明显不良反应
- E. 服药后可出现欣快感

77. 肺癌的肺外表现常见的是 ()。

- A. 杵状指
- B. 面颈部水肿
- C. 吞咽困难
- D. 一侧瞳孔缩小
- E. 锁骨上淋巴结肿大

78. 引起医院内获得性肺炎的常见致病菌中占比例最高的是 ()。

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 革兰阴性杆菌
- C. 肺炎球菌
- D. 真菌
- E. 病毒

79. 胺碘酮的作用是 ()。

- A. 阻滞钠通道
- B. 阻滞 β 受体
- C. 促 K^{+} 外流
- D. 选择性延长复极过程 (APD)
- E. 阻滞 Ca^{2+} 通道

80. 血管壁的玻璃样变性主要发生在 ()。

- A. 缓进型高血压时的微小动脉

- B. 缓进型高血压时的中动脉
- C. 缓进型高血压时的大动脉
- D. 急进型高血压时的微动脉
- E. 急进型高血压时的小动脉

81. 影响神经系统发育最重要的激素（ ）。

- A. 生长素
- B. 甲状腺激素
- C. 糖皮质激素
- D. 胰岛素
- E. 性激素

82. 一患者常规体检时发现空腹血糖为 6.5mmol/L，下列哪项不妥？（ ）

- A. 进行口服葡萄糖耐量试验
- B. 空腹及餐后 2h 血糖测定
- C. 分析影响血糖结果的因素
- D. 24h 尿糖定量及糖化血红蛋白测定
- E. 口服降血糖药物治疗

83. 癫痫发作的两大主要类型是（ ）。

- A. 全面性发作和复杂部分发作
- B. 全面性：发作和失神发作
- C. 全面性发作和单纯部分发作
- D. 部分发作和强直一阵挛发作
- E. 部分运动型发作和失神发作

84. 房室延搁一般发生于（ ）。

- A. 兴奋由窦房结传至心房肌时
- B. 兴奋在心房肌内传导时
- C. 兴奋在房室交界内传导时
- D. 兴奋在房室束传到左右束支时
- E. 兴奋由浦肯野纤维传到心室肌时

85. 李某因要报考研究生，欲向单位请假复习，遂找到其中学同学、县医院的执业医师王某，请王某为其开具病假条。王某为李某开出了“病毒性心肌炎，全休 1 个月”的诊断证明书。对于王某的行为，县卫生局可以给予（ ）。

- A. 吊销其医师执业证书
- B. 警告或责令其暂停执业活动 3~6 个月，并接受培训或继续教育
- C. 警告或责令其暂停执业活动 6 个月至 1 年
- D. 调离医师岗位
- E. 给予行政或纪律处分

86. 男性，60岁。既往有心绞痛史，昨晚突然发生心动过速，心率150/min。查体心左界大，无杂音。入院后静注西地兰0.4mg，10min后心率为75/min，最可能为（ ）。

- A. 窦性心动过速
- B. 阵发性室上性心动过速
- C. 阵发性室性心动过速
- D. 心房颤动
- E. 心房扑动

87. 某学生参加高考前数月产生严重焦虑，来到咨询室后，该生讲述了其内心的恐惧与担心，治疗师只是认真地倾听，不做指令性指导，这种心理治疗理论属于（ ）。

- A. 精神分析理论
- B. 认知理论
- C. 人本主义理论
- D. 心理生理理论
- E. 行为理论

88. 为了戒除烟瘾。在每次吸烟后，应用某种引起恶心呕吐的药物。反复多次，就不再想吸烟了。这种戒烟方法是（ ）。

- A. 系统脱敏法
- B. 生物反馈法
- C. 放松训练法
- D. 暴露疗法
- E. 厌恶疗法

89. 男，58岁，因肺心病呼吸衰竭入院，入院查神志清醒，血气分析， PaO_2 4kPa（30mmHg）， $PaCO_2$ 8kPa（60mmHg），吸氧后神志渐不清，昏迷，血气分析， PaO_2 9.3kPa（30mmHg）， $PaCO_2$ 10.6kPa（80mmHg），病情恶化的原因最可能是（ ）。

- A. 感染加重
- B. 心力衰竭加重
- C. 气道阻力增加
- D. 氧疗不当
- E. 周围循环衰竭

90. 一位亚急性细菌性心内膜炎患者，下床活动后出现意识逐渐模糊至昏迷，并有右侧偏瘫，其最可能的原因是（ ）。

- A. 肺动脉栓塞
- B. 脑动脉栓塞
- C. 冠状动脉栓塞
- D. 右上下肢动脉栓塞

E. 右上下肢静脉栓塞

91. 女性，28岁。因发热3d，食欲下降，厌油，恶心，乏力就诊，体温38.5℃，血压100/80mmHg，巩膜及皮肤黄染，右上腹部压痛，肝在肋缘下2cm，轻度触痛。不予考虑检查的项目是（ ）。

- A. ALT
- B. AST
- C. 血胆红素测定
- D. 血清蛋白质测定
- E. CK

92. 男，18岁。3周前咽喉痛。近1周面部水肿，尿少，腰酸痛，每天排尿2~3次，血红蛋白120g/L，尿蛋白（++），尿沉渣红细胞10~20/HP，红细胞管型0~1/HP，颗粒管型0~1/HP. 诊断（ ）。

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 急性肾炎综合征起病的慢性肾炎
- C. 急性肾炎
- D. 急性前列腺炎
- E. 隐匿型肾炎

93. 患者，因发生车祸被路过的群众送至医院，医生经过检查，认为必须紧急输血以挽救患者的生命，但是此时患者处于昏迷状态，其家属又无法联络到，应当（ ）。

- A. 经治医师填写临床输血单，主治医师核准签字后即可紧急输血
- B. 经治医师填写临床输血单即可实施紧急输血
- C. 应报医院职能部门或土管领导同意、备案，并记入病历
- D. 应取得县级以上卫生行政部门批准后可以实施紧急输血
- E. 应取得同行讨论后批准才可以实施紧急输血

94. 男，30岁。两小时前劳动中突发上腹刀割样疼痛，迅速波及全腹，舟状腹，全腹腹膜刺激征，肝浊音界不清，肠鸣音消失。诊断是（ ）。

- A. 『刺尾穿孔腹膜炎
- B. 胃十二指肠溃疡穿孔腹膜炎
- C. 胆囊穿孔腹膜炎
- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 急性出血性胰腺炎

95. 某甲亢患者应用抗甲状腺药物11个月时，白细胞计数降至 $1.8 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.3，宜采用的措施是（ ）。

- A. 继续原治疗方案，密切观察白细胞变化
- B. 继续原治疗方案，加升白细胞药物
- C. 停抗甲状腺药物. 用升白细胞药物
- D. 抗甲状腺药物过餐，加甲状腺片

E. 停抗甲状腺药物，密切观察白细胞变化

96. 女性，26岁，尿频尿急2年，抗生素治疗不见好转，尿常规：脓细胞(++)，红细胞(+)；尿培养阴性；IVU；右肾盂肾盏未显影，右肾区可见斑片状钙化影，左肾轻度积水，正确诊断为()。

- A. 左肾积水
- B. 右肾结核
- C. 右肾结石
- D. 右肾癌
- E. 右肾结核，左肾积水

97. 男，58岁。平素健康，近半月来夜间阵发性哮喘发作，被迫坐位，气短，10min后自行缓解，今晚加重来诊。肥胖，BP170/110mmHg，R25/min，P110/min，两肺底部湿啰音，无哮鸣音。初步诊断为()。

- A. 支气管哮喘
- B. 心源性哮喘
- C. 喘息性支气管炎
- D. 运动性哮喘
- E. 以上都不是

98. 男，54岁。昏迷6h，轻度黄疸，双侧肢体肌张力对称性增高，瞳孔等大。尿蛋白及尿糖均阴性，A/G=25/35。最有可能的诊断是()。

- A. 脑血管意外
- B. 糖尿病酮症酸中毒
- C. 安眠药中毒
- D. 肝性脑病
- E. 尿毒症

99. 男性，70岁。有慢性支气管炎，肺气肿病史。因畏寒、发热，伴咳嗽、气急D就诊。住院后，高热不退，气急、发绀明显，咳黏稠脓性血痰。x线片示右肺上叶大片密度增高的阴影，内有多个小透亮区，水平叶裂呈弧形下坠。最可能的诊断是()。

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 肺脓肿
- C. 克雷伯杆菌肺炎
- D. 干酪性肺炎
- E. 金黄色葡萄球菌肺炎

100. 女性20岁，3个月来低热，盗汗，腹痛腹胀，巩膜无黄染，颈静脉无怒张，腹部移动性浊音(+)，腹水比重1020，蛋白定量40g/L，最可能的诊断是()。

- A. 卵巢囊肿
- B. 结核性腹膜炎

- C. 肝硬化腹水
- D. 缩窄性心包炎
- E. 门静脉血栓形成

101. 男性，56岁。患高血压性心脏病6年。近1年来，每天从事原有日常活动时出现心悸、气短、休息后好转。判定为（ ）。

- A. 心功能I级
- B. 心功能II级
- C. 心功能III级
- D. 心功能IV级
- E. 以上都不是

102. 男性，40岁，间歇性水肿10年，恶心、呕吐1周，查血压150/100mmHg，HB80g/L，尿蛋白（++），蜡样管型（+），血BUN40mmol/L，Cr760 μ mol/L，血钾5.51mmol/L。最适宜的首选治疗方法是（ ）。

- A. 降压治疗
- B. 利尿药
- C. 纠正贫血
- D. 饮食治疗
- E. 血液透析

103. 女性，25岁。发热、咳嗽、流涕2周后热退，但又出现胸闷、心悸，心率120/min，心律失常，偶闻期前收缩，心电图：低电压，T波低平。应首先考虑（ ）。

- A. 急性心包炎
- B. 扩张性心肌病
- C. 病毒性心肌炎
- D. 风湿性心肌炎
- E. 风湿性心脏病

104. 男，50岁。半年前体检发现非胰岛素依赖型糖尿病，无口渴、多尿症状，身高165cm，体重66kg，坚持饮食控制及运动锻炼，近3个月空腹血糖5.0~6.0mmol/L（90~108mg/DL），餐后血糖10.0~13.0mmol/L（180~234mg/DL）。拟加用（ ）。

- A. 双胍类降血糖药
- B. 葡萄糖苷酶抑制药
- C. 磺脲类降糖药
- D. 短效胰岛素
- E. 中效胰岛素

105. 女孩，2岁，经常感冒和肺炎。体检：心前区隆起，无震颤，胸骨左缘第2肋间可闻及II级喷射性杂音，P2>A2伴有固定分裂，心电显示电轴右

偏，V呈rsR波型，R（V1）4mm，P（V1）2ram，P-R间期0.16s，该患儿考虑何种先心病（ ）。

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 肺动脉狭窄
- E. 法洛四联症

106. 某妇女，骨盆测量骶耻外径18.5cm，髂棘间径24cm，髂嵴间径26cm，坐骨棘间径9.0cm，坐骨结节间径7cm，应诊断为（ ）。

- A. 正常骨盆
- B. 扁平骨盆
- C. 正常形态狭窄骨盆
- D. 漏斗骨盆
- E. 横径狭小骨盆

107. 男性，62岁，急性重症胰腺炎患者，于保守治疗中，尿量逐渐减少，无尿2d，出现气促、全身水肿，血压180/92mmHg，心率120/min，听诊闻及两肺部下布满湿啰音，查血钾6.9mmol/L，BUN25.2mmol/L，肌酐577 μ mol/L。目前应采取最有效的治疗手段是（ ）。

- A. 襻利尿药静脉注射
- B. 静脉滴注甘露醇利尿
- C. 口服甘露醇或硫酸镁导泻
- D. 控制入液量，停止补钾
- E. 及时紧急透析

108. 女，50岁。掌指和腕关节反复肿痛2年余，近1个月病情加重，晨起时出现关节僵硬，活动后可缓解。首先考虑的诊断是（ ）。

- A. 风湿性关节炎
- B. 痛风
- C. 强直性脊柱炎
- D. 骨关节炎
- E. 类风湿关节炎

109. 男性，17岁。发热，齿龈肿胀1个月，皮肤散在紫癜，淋巴结、肝脾大，白细胞420 \times 10⁹/L，分类可见原始细胞，非特异性酯酶染色强阳性，能被NAF抑制，过氧化酶染色弱阳性。最可能的诊断是（ ）。

- A. 急性单核细胞性白血病
- B. 急性粒细胞白血病
- C. 急性淋巴细胞白血病
- D. 类白血病反应
- E. 淋巴瘤

110. 女性，50岁。右乳房外上象限内扪及1.5cm×1.5cm肿块，与皮肤及胸肌无粘连，右腋淋巴结不肿大，诊断右乳癌，按TNM分期为（ ）。

- A. T₁N₀M₀
- B. T₁N₂M₀
- C. T₂N₂M₀
- D. T₃N₁M₀
- E. T₂N₂M₀

111. 男，26岁，明显的“三多一少”症状10年，经胰岛素治疗，症状时轻时重，有时出现低血糖症状。近2个月眼睑及下肢水肿，乏力，腰痛，血压160/100mmHg（213，133kPa，尿蛋白（++）、颗粒管型少许，尿糖（++）。应诊断为（ ）。

- A. 糖尿病性肾病
- B. 肾动脉硬化
- C. 肾盂肾炎
- D. 肾炎
- E. 胰岛素副作用

112. 患者患胆管癌，术中术者用手指钝性剥离胆总管而撕破静脉急性走出血，慌乱中用钳夹止血，造成门静脉完全离断，虽经吻合，患者终因急性肝功能衰竭而死亡。产生的后果属于（ ）。

- A. 医疗意外
- B. 医疗差错
- C. 病情重笃而发生的难以避免的死亡
- D. 医疗事故
- E. 手术难以避免的并发症

B1型选择题

（113-1~113-2题共用备选答案）

- A. 低色素性贫血
- B. 间皮瘤
- C. 易兴奋症、震颤、口腔炎
- D. 白血病
- E. 光感性皮炎

113-1. 长期高浓度苯接触能引起（ ）。

114-2. 过量汞进入体内能引起（ ）。

（115-1~115-3题共用备选答案）

- A. 双方冲突型
- B. 患者主导型
- C. 主动-被动型

D. 指导-合作型

E. 共同参与型

115-1. 一般来说，医患之间信托-契约关系所倡导的医患交往模式是（ ）。

116-2. 一般来说，使医患之间信托-契约关系能够得到理想体现的是（ ）。

117-3. 对婴幼儿、处于休克状态需要急救等患者适用的模式是（ ）。

（118-1~118-3 题共用备选答案）

A. 窦房结

B. 心房肌

C. 房室交界

D. 心室肌

E. 浦肯野纤维

118-1. 传导速度最快的是（ ）。

119-2. 传导速度最慢的是（ ）。

120-3. 自律性最高的是（ ）。

（121-1~121-2 题共用备选答案）

A. 碱性磷酸酶增高

B. 酸性磷酸酶增高

C. 胎儿硫糖蛋白增高

D. 酸性和碱性磷酸酶增高

E. 氧化酶增高

121-1. 肝癌（ ）。

122-2. 前列腺癌（ ）。

（123-1~123-2 题共用备选答案）

A. 2:1 等张含钠液

B. 4:3:2 (2/3 张) 混合液

C. 2:3:1 (1/2 张) 混合液

D. 1:4 (1/5 张) 混合液

E. 1:2 (1/3 张) 混合液

123-1. 腹泻患儿重度低渗性脱水扩容应首先选用（ ）。

124-2. 婴儿肺炎维持体液平衡应选用（ ）。

（125-1~125-3 题共用备选答案）

A. α 受体

B. β_1 受体

C. β_2 受体

D. M受体

E. N受体

125-1. 导致心率加快，传导加速，心脏收缩力加强的受体是（ ）。

126-2. 引起支气管平滑肌舒张的受体是（ ）。

127-3. 促进胃肠运动的受体是（ ）。

（128-1~128-2 题共用备选答案）

A. 直方图

B. 直条图

C. 线图

D. 圆形图

E. 散点图

128-1. 表示某地 1990—1994 年肝炎病例的年龄分布，宜采用（ ）。

129-2. 表示某地 1995 年五种不同类型病毒肝炎发病人数占病毒性肝炎发病总人数的比重，宜采用（ ）。

（130-1~130-2 题共用备选答案）

A. 布洛芬

B. 卡托普利

C. 泼尼松

D. 阿司匹林

E. 苯丙酸诺龙

130-1. 抑制血小板聚集功能的药物是（ ）。

131-2. 扩张肾小球入球小动脉的药物是（ ）。

（132-1~132-3 题共用备选答案）

A. 溶血性黄疸

B. 阻塞性黄疸

C. 肝细胞性黄疸

D. 后天性卟啉症

E. 多发性骨髓瘤

132-1. 铅中毒（ ）。

133-2. 病变的免疫球蛋白（ ）。

134-3. 尿胆素原增加，尿胆红素阴性（ ）。

（135-1~135-2 题共用备选答案）

A. 3h

B. 6h

C. 12h

D. 24h

E. 48h

135-1. 患者死亡后，患者的亲属对患者死固有异议，医疗机构又不募备尸体冻存条件的，应当在多少小时内进行尸检（ ）。

136-2. 医疗机构因为重大过失导致 3 人以上凡身损害后果的，应当在多少小

时内向所在地卫生行政部门报告（ ）。

A3/A4 型选择题

（137-1~137-3 题共用题干）

女，47岁，4年反复胃区不适，疼痛暖气，胃镜检查：胃窦部黏膜红白相间以白为主，可见血管显露。

137-1. 关于萎缩性胃炎哪项是错误的？（ ）

- A. 与自身免疫反应有关
- B. 发生胃癌者较胃体胃炎多见
- C. 胃酸正常或轻度障碍
- D. 胃黏膜炎症由浅变深
- E. HP 附于胃窦黏膜上皮细胞上

138-2. 哪项不符合慢性萎缩性胃炎？（ ）

- A. 胃酸分泌正常或降低
- B. 多有消化道症状
- C. 血清促胃泌素正常或降低
- D. 易发生恶性贫血
- E. 抗壁细胞抗体阴性

139-3. 哪项病理改变为癌前病变？（ ）

- A. 炎症细胞浸润
- B. 腺体萎缩
- C. 中度以上不典型增生
- D. 肠腺化生
- E. 假性幽门腺化生

（140-1~140-2 题共用题干）

成年男性，从高楼跌下后出现抽搐。每次抽搐先是左侧面部，然后双眼球向左凝视，左侧上肢抽，最后左侧下肢抽，整个过程约 30s，每小时发作 20 次，查体时浅昏迷。

140-1. 本病诊断为（ ）。

- A. 癫痫部分发作
- B. 癫痫强直阵挛发作
- C. 癔症性抽搐
- D. 癫痫失神发作
- E. 杰克逊癫痫

141-2. 脑部主要病灶可能在（ ）。

- A. 左侧中央后回
- B. 右侧中央后回
- C. 左侧中央前回

- D. 右侧中央前回
- E. 颞叶

(142-1~142-3 题共用题干)

女, 37 岁。自缢后呼吸、心跳停止, 经抢救复苏后, 为防治脑水肿给予脱水、降温治疗, 维持肺功能稳定。

142-1. 关于脱水治疗, 不正确的是 ()。

- A. 保持正常输液量
- B. 20%甘露醇 250ml 静脉内快速滴入, 每日 2~4 次
- C. 必要时加用呋塞米 20~40mg/次静脉注射
- D. 应定期检裔血生化, 以免引起水电解质紊乱
- E. 脱水治疗应持续 2~3d

143-2. 关于降温治疗, 不正确的是 ()。

- A. 体温每降低 1℃, 可使氧耗率下降 5%~6%
- B. 病人出现体温上升趋势或痉挛表现时, 应立即开始降温
- C. 降温前用地西洋、硫喷妥钠等防止寒战
- D. 降温时先脑部降温, 再行全身降温
- E. 复温时逐步撤除冰袋, 同时停用降温辅助药

144-3. 维持肺功能稳定最有效的药物是 ()。

- A. 多巴胺
- B. 毛花苷 c
- C. 阿托品
- D. 尼可刹米
- E. 山莨菪碱

(145-1~145-3 题共用题干)

男, 55 岁。咳嗽、咳痰, 10 余年。近 2 年来加重, 常咳黄色脓痰, 伴有气喘, 1 周前受凉后症状加剧, 发绀, 两肺闻及湿啰音及哮鸣音。

145-1. 最可能的诊断为 ()。

- A. 支气管哮喘继发感染
- B. 支气管扩张症继发感染
- C. 慢性喘息性支气管炎急性发作
- D. 肺结核继发感染
- E. 尘肺继发感染

146-2. 最能提示该病人并发慢性阻塞性肺气肿紫肿型的表现是 ()。

- A. 慢性咳嗽咳痰量多
- B. 呼吸困难明显
- C. 肺气肿体征明显
- D. 肺功能检查残气量增加明显
- E. 血气分析氧分压下降明显

147-3. 最重要的治疗措施是（ ）。

- A. 吸氧+解痉平喘
- B. 抗生素+解痉平喘
- C. 祛痰药+抗生素
- D. 吸氧+糖皮质激素
- E. 糖皮质激素+祛痰药

(148-1~148-3 题共用题干)

男，36岁。上腹部隐痛伴反酸数年，今天早上突发腹部绞痛，同时出现右下腹扁。体检：上腹及右下腹压痛明显，轻度腹肌紧张，肠鸣音弱；血常规：白细胞及中性粒细胞均增多。

148-1. 该病人为明确诊断最好的检查方法是（ ）。

- A. 纤维胃镜
- B. 立位腹部平片
- C. X线钡剂
- D. B超
- E. CT

149-2. 最好的治疗方法（ ）。

- A. 禁食输液，胃管抽吸，全身使用抗生素
- B. 行胃大部切除
- C. 中药治疗
- D. 行阑尾切除术.
- E. 肌内注射抗生素

150-3. 该患者在住院期间经过一段时间治疗，症状、体征不见好转反而加重，应改用手术治疗，保守观察时间最好是（ ）。

- A. 72h
- B. 48h后
- C. 36~48h
- D. 24~26h
- E. 6~8h