

第一单元

A1 型选择题 (1~76 题)

- 关于酶活性的叙述, 正确的是
 - 关键酶的活性不易被调节
 - 25°C时 TaqDNA 聚合酶活性最高
 - 酶活性检测可用于疾病的诊断
 - 多数酶最适 pH 在 8.0
 - 缺少氯离子时唾液淀粉酶失去活性
- 蛋白质生物学价值的高低主要取决于
 - 所含氨基酸的数量
 - 表观消化率
 - 含量
 - 真消化率
 - 所含必需氨基酸的含量和比值
- 来自正态总体且方差齐性的多个样本均数比较时, 通常选择的统计方法是
 - u 检验
 - t 检验
 - 卡方检验
 - 相关回归分析
 - 方差分析
- 不属于慢性风湿性心脏病病变的是
 - 心肌间质小瘢痕形成
 - 心包纤维素渗出
 - 主动脉瓣增厚、缩短、变形
 - McCallum 斑形成
 - 二尖瓣增厚、缩短、变形
- 医疗机构开展诊疗活动必须按照
 - 核准的项目
 - 核准的诊疗科目
 - 核准、登记的诊疗科目
 - 登记的诊疗科目
 - 核准、登记的诊疗科目
- 为提高医务人员对患者识别的准确性, 医院管理中强调必须严格执行“三查七对”制度, 其中的三查是
 - 开方查、配药查、输液查
 - 门诊查、取药查、发药查
 - 操作前查、操作中查、操作后查
 - 开方查、取药查、发药查
 - 门诊查、住院查、出院查
- 肿瘤相关抗原的含义是
 - 表达于肿瘤细胞而不表达于正常细胞
 - 肿瘤细胞和正常细胞无差异性表达
 - 表达于正常细胞而不表达于肿瘤细胞
 - 高表达于肿瘤细胞而低表达于正常细胞
 - 高表达于正常细胞而低表达于肿瘤细胞
- 青春期自我意识中的主要矛盾不包括
 - 理想与现实
 - 学习与恋爱
 - 原我与超我
 - 独立与依赖
 - 交往与封闭
- 下列有关磺胺类药物的药理学特点叙述错误的是
 - 抗菌谱广
 - 不良反应多

- D. 大多数在体内的乙酰化代谢物溶解度高
E. 磺胺嘧啶易透过血脑屏障

10. 疫苗接种记录保留的最低年限是

- A. 不得少于 5 年
B. 不得少于 2 年
C. 不得少于 3 年
D. 不得少于 6 年
E. 不得少于 8 年

11. 迷走神经兴奋引起胃窦部 G 细胞分泌的递质是

- A. 盐酸
B. 内因子
C. 胃蛋白酶
D. 碱性黏液
E. 促胃液素

12. 下列哪项不属于公共卫生伦理原则框架范围

- A. 公正
B. 公众利益兼顾个人利益
C. 团结互助
D. 多部门协作和合作
E. 保护弱势群体

13. 医患沟通中的非语言沟通形式不包括

- A. 面部表情
B. 人际距离
C. 引导话题
D. 身段姿态
E. 目光接触

14. 在流行病学现状调查中，系统抽样的方法是

- B. 按照行政系统抽取调查单位
C. 按照一定比例或间隔抽取调查单位
D. 按照随机原则抽取调查单位
E. 按照方便原则抽取调查单位

15. CD4+T 细胞发挥抗病毒作用的主要机制不包括

- A. 辅助抗体产生
B. 杀伤被感染细胞
C. 产生免疫记忆
D. 辅助 CD8+T 细胞
E. 分泌细胞因子

16. 提出“大医精诚”的我国古代医学家是

- A. 张仲景
B. 陈实功
C. 孙思邈
D. 扁鹊
E. 董奉

17. 维系 DNA 双链间碱基配对的化学键是

- A. 氢键
B. 磷酸二酯键
C. 肽键
D. 疏水键
E. 糖苷键

18. 疾病监测的目的不包括

- A. 验证病因假设
B. 预测疾病流行
C. 评级预防效果
D. 描述疾病分布
E. 监测疾病暴发

19. 奥美拉唑在作用机制上属于

- B. 胃壁细胞 H^+ 泵抑制药
- C. 促胃液素受体阻断药
- D. H_2 受体阻断药
- E. M 胆碱受体阻断药

20. 医源性传播是指

- A. 在疾病的防治过程中, 诊疗区域和药品被污染所造成的疾病的传播
- B. 医务人员对患者进行操作不规范, 使用器械方法不当引起的不良反应
- C. 医护人员之间通过接触引起的疾病的传播
- D. 患者之间由于共用餐饮具而引起的疾病传播
- E. 医务人员使用不合格药物, 或过期变质药物引起的不良反应

21. 骨肉瘤最重要的组织学特点是

- A. 细胞核多形
- B. 血管内瘤栓
- C. 肿瘤性成骨
- D. 细胞异型性明显
- E. 核分裂象多见

22. 每张中成药处方可以开具的药品种类最多是

- A. 5 种
- B. 7 种
- C. 3 种
- D. 6 种
- E. 2 种

23. 队列研究的观察终点是

- A. 观察对象出现了预期的结果
- B. 观察对象因非研究因素退出研究
- C. 整个研究工作结束

E. 随访者与观察对象失去了联系

24. 下列属于淋病奈瑟菌特征的是

- A. 离开人体可存活 4 小时
- B. 为革兰染色阴性双球菌
- C. 对移行上皮无亲和力
- D. 一般消毒剂不易将其杀灭
- E. 对复层鳞状上皮有亲和力

25. 每分通气量和肺泡通气量之差等于

- A. 潮气量 \times 呼吸频率
- B. 肺活量 \times 呼吸频率
- C. 残气量 \times 呼吸频率
- D. 无效腔气量 \times 呼吸频率
- E. 功能残气量 \times 呼吸频率

26. 不参与三羧酸循环的化合物是

- A. α -酮戊二酸
- B. 草酰乙酸
- C. 丙二酸
- D. 柠檬酸
- E. 琥珀酸

27. 预后最好的乳腺癌病理类型是

- A. 硬癌
- B. 单纯癌
- C. 导管内癌
- D. 黏液腺癌
- E. 髓样癌

28. 肉眼观察肾体积明显缩小, 质地变硬, 表面有大的不规则凹陷性瘢痕, 该病变性质最可能是

- A. 晚期肾小球肾炎
- B. 慢性肾盂肾炎

- D. 良性高血压病引起的颗粒性固缩肾
- E. 局灶性节段性肾小球肾炎

29. 可导致输血反应的天然抗体类型是

- A. IgM
- B. IgG
- C. IgD
- D. IgE
- E. IgA

30. 医患关系的本质特征是

- A. 具有互利性质的经济关系
- B. 具有买卖性质的依附关系
- C. 具有协作性质的买卖关系
- D. 具有依附性质的非平等关系
- E. 具有契约性质的信托关系

31. 进行甲乙两地 2005 年 5 种不同类型病毒性肝炎发病率的比较, 宜采用

- A. 直方图
- B. 直条图
- C. 线图
- D. 圆形图
- E. 散点图

32. 关于身体活动的说法, 不正确的是

- A. 不同的活动类型促进健康的作用不相同
- B. 适度增加身体活动可以获得更大的健康效益
- C. 高强度的身体活动可能造成身体损伤
- D. 成人每周应至少参加五次以上中等强度的身体活动
- E. 高血压患者不应该参加身体活动

33. 我国慢性病防治的基本原则不包括

- B. 坚持统筹协调
- C. 坚持共建共享
- D. 坚持预防为主
- E. 坚持分类指导

34. 下列不属于实施职业卫生服务原则的是

- A. 保护和预防原则
- B. 全面的初级卫生保健原则
- C. 适应原则
- D. 健康促进原则
- E. 治疗优先原则

35. 初级卫生保健的基础原则不包括

- A. 社区参与
- B. 预防为主
- C. 推广医学实验技术
- D. 合理分配资源
- E. 合理转诊

36. 蛋白质中对 280nm 紫外光吸收最强的氨基酸残基是

- A. 谷氨酸
- B. 赖氨酸
- C. 丙氨酸
- D. 组氨酸
- E. 色氨酸

37. 谷类和豆类食物的营养互补氨基酸是

- A. 赖氨酸和色氨酸
- B. 赖氨酸和酪氨酸
- C. 赖氨酸和丙氨酸
- D. 赖氨酸和谷氨酸
- E. 赖氨酸和甘氨酸

38. 下列选项中符合手术治疗伦理要求的是

B. 手术对患者确实有益时，可无须患者知情同意

C. 患者充分信任时，医生可自行决定手术方案

D. 手术方案必须经患者单位同意

E. 手术方案应经患者知情同意

39. 不属于肺炎链球菌致病物质的是

A. M 蛋白

B. 荚膜

C. 神经氨酸酶

D. 肺炎链球菌溶血素

E. 脂磷壁酸

40. 医疗机构临床用血医学文书不包括

A. 献血员信息

B. 输血过程和输血后疗效评价情况

C. 输血治疗知情同意书

D. 输血记录单

E. 患者输血适应证的评估

41. 组织和细胞损伤后，周围细胞增生、修复的过程是

A. 增生

B. 再生

C. 化生

D. 肥大

E. 机化

42. 卫生领域中的公平性是指生存机会的分配

A. 以社会阶层为导向

B. 以支付能力为导向

C. 以需要为导向

D. 以市场经济规律为导向

E. 以年龄为导向

只能提供给

A. 8 名妇女受孕

B. 6 名妇女受孕

C. 15 名妇女受孕

D. 5 名妇女受孕

E. 10 名妇女受孕

44. 通过替代途径激活补体的免疫球蛋白是

A. IgM

B. IgD

C. IgG2

D. IgA

E. IgG1

45. 在测量基础代谢率时，正确的做法是

A. 测量可在 24 小时内任何时刻进行

B. 测量前一天晚上的饮食不受任何限制

C. 受试者应处于睡眠状态

D. 受试者无精神紧张和肌肉活动

E. 室温不限高低，但要求恒定不变

46. 营养素的概念是指

A. 富含蛋白质、脂类和碳水化合物的食物

B. 富含维生素、矿物质和水的食物

C. 富含必需氨基酸和微量元素的营养物质

D. 维持生命和健康，保证生长发育和生产劳动所必须从食物中获取的营养物质

E. 无机盐、维生素等营养物质的总称

47. 只有 T 细胞才具有的表面标记为

A. 识别抗原受体

B. C3 受体

C. 细胞因子受体

D. CD3 分子

E. 有丝分裂原受体

48. 心理活动或意识对一定对象的指向或集中的现象称为

- A. 注意
- B. 人格
- C. 记忆
- D. 情感
- E. 想象

49. 国家实行特殊管理的药品不包括

- A. 麻醉药品
- B. 疫苗
- C. 精神药品
- D. 医疗用毒性药品
- E. 放射性药品

50. Meta 分析中异质性检验的目的是检验各个独立研究结果的

- A. 可靠性
- B. 同质性
- C. 代表性
- D. 真实性
- E. 敏感性

51. 大多数脱氢酶的辅酶是

- A. NAD^+
- B. NADP^+
- C. CoA
- D. Cyt_c
- E. FADH_2

52. 进行膳食调查的主要目的是

- A. 了解有无膳食缺乏症
- B. 了解膳食组成及营养素摄取情况
- C. 了解机体营养情况
- D. 了解居民体质

53. 恶性程度最高的体表肿瘤是

- A. 皮肤乳头状癌
- B. 皮肤鳞状细胞癌
- C. 恶性黑色素瘤
- D. 纤维肉瘤
- E. 皮肤基底细胞癌

54. 关于纤维素性炎的描述中, 错误的是

- A. 常发生于浆膜、黏膜和肺
- B. 浆膜的纤维素性炎易导致浆膜粘连
- C. 心外膜的纤维素性炎常形成绒毛心
- D. 肺的纤维素性炎不会导致机化
- E. 常伴中性粒细胞浸润

55. 在医疗实践活动中分配医疗收益与平衡时, 类似的个案适用相同的准则, 不同的个案适合不同的准则, 这所体现的医学伦理基本原则是

- A. 尊重原则
- B. 不伤害原则
- C. 公正原则
- D. 有利原则
- E. 公益原则

56. 关于生物-心理-社会医学模式, 下列说法中错误的是

- A. 人们关于健康和疾病的基本观点
- B. 21 世纪建立起来的一种全新医学模式
- C. 临床实践活动和医学科学研究的指导思想
- D. 在更高层次上实现了对人的尊重
- E. 不仅重视人的生物生存状态, 而且更加重视人的社会生存状态

57. 某医疗机构对有能力诊治的危重患者应该采取的处置措施是

- A. 办理住院手续

- C. 报告当值医院领导
D. 报告当地卫生行政部门
E. 转院
58. 维持组织液生成量与回流量平衡的机制是
A. 多余的生成部分经毛细淋巴管回流
B. 主要受局部代谢产物的调节
C. 毛细血管交替性开放和关闭
D. 改变毛细血管前后阻力比
E. 毛细血管通透性发生改变
59. 一碳单位代谢的辅酶是
A. 叶酸
B. 二氢叶酸
C. 四氢叶酸
D. NADPH
E. NADH
60. Dane 颗粒是
A. 丁型肝炎病毒
B. 乙型肝炎病毒
C. 甲型肝炎病毒
D. 戊型肝炎病毒
E. 丙型肝炎病毒
61. 肺的静态顺应性越大, 表示
A. 肺的弹性阻力大, 肺扩张程度小
B. 肺的弹性阻力小, 肺扩张程度小
C. 肺的非弹性阻力大, 肺扩张程度大
D. 肺的弹性阻力小, 肺扩张程度大
E. 肺的大量弹性阻力与肺的扩张程度无变化
62. 大肠埃希菌 O157:H7 引起的腹泻特点是
A. 脓性便
B. 血样便

- D. 蛋花样便
E. 黏液便
63. 下列各项哪一类不属于突发公共卫生事件
A. 重大传染病疫情
B. 重大交通事故
C. 重大职业中毒事故
D. 重大食物中毒事故
E. 群体不明原因疾病
64. 能够诱导 UDP 葡萄糖醛酸转移酶合成从而减轻黄疸的药物是
A. 阿司匹林
B. 氢氯噻嗪
C. 青霉素
D. 磺胺嘧啶
E. 苯巴比妥
65. 以强制参保为原则, 参保范围涵盖城镇所有用人单位和职工的保险为
A. 城镇职工基本医疗保险
B. 补充医疗保险
C. 城镇居民基本医疗保险
D. 社会医疗救助
E. 商业医疗保险
66. DNA 碱基组成的规律是
A. $([A] + [T]) / ([C] + [G]) = 1$
B. $[A] + [T] = [C] + [G]$
C. $[A] = [T]$ 、 $[C] = [G]$
D. $[A] = [C]$ 、 $[T] = [G]$
E. $[A] = [G]$ 、 $[T] = [C]$
67. 心理评估的常用方法不包括
A. 会谈法

- C. 调查法
- D. 观察法
- E. 实验法

68. 颅前窝骨折造成的熊猫眼征指的是

- A. 双侧视盘水肿
- B. 眶周广泛性淤血斑
- C. 乳突部皮下淤血斑
- D. 双眼视网膜出血
- E. 双额部皮肤表面淤血

69. 属于环境中的二次污染物是

- A. 汞
- B. 镉
- C. 二氧化碳
- D. 光化学烟雾
- E. 二手烟

70. 与自身免疫性疾病发生无关的原因是

- A. 隐蔽抗原释放
- B. 自身抗原发生改变
- C. 交叉抗原或分子模拟
- D. 免疫球蛋白类别转换
- E. 多克隆 T 细胞活化

71. 细胞膜在静息情况下, 对下列离子通透性最大的是

- A. Na^+
- B. K^+
- C. Cl^-
- D. Ca^{2+}
- E. Mg^{2+}

72. 陈旧性心肌梗死患者, 心电图示频发室性期前收缩。首选药物

- A. 慢心律
- B. 普罗帕酮 (心律平)
- C. 奎尼丁
- D. β 受体阻滞剂
- E. 钙拮抗剂

73. 医学心理学的研究范围包括

- A. 脑与行为的关系
- B. 心身关系
- C. 心理障碍
- D. 医患关系
- E. 以上都是

74. 健康促进的 5 个主要活动领域不包括

- A. 建立促进健康的公共政策
- B. 调整卫生服务方向
- C. 创造健康支持环境
- D. 加强社区行动
- E. 以农村为重点、预防为主

75. 在血浆各种脂蛋白中, 按其所含胆固醇及其酯的量, 从多到少的排列是

- A. CM、VLDL、LDL、HDL
- B. HDL、LDL、VLDL、CM
- C. VLDL、LDL、HDL、CM
- D. LDL、HDL、VLDL、CM
- E. LDL、VLDL、HDL、CM

76. 进行底物水平磷酸化的反应是

- A. 葡萄糖 \rightarrow 6-磷酸葡萄糖
- B. 6-磷酸果糖 \rightarrow 1, 6-二磷酸果糖
- C. 3-磷酸甘油醛 \rightarrow 1, 3-二磷酸甘油酸
- D. 琥珀酰 CoA \rightarrow 琥珀酸
- E. 丙酮酸 \rightarrow 乙酰 CoA

A2 型选择题 (77~116 题)

77. 某癌症患者, 心理状态较差且预后不良, 治疗过程中需要家属的积极配合。对此, 医生关于患者的最佳告知方式是

- A. 告知家属部分病情并向患者保密
- B. 告知家属实情并对患者适度告知
- C. 告知患者部分病情并向家属保密
- D. 直接告知患者实情
- E. 告知患者及家属实情

78. 女, 55 岁, 国家公务员。30 年来因丈夫 (高级工程师) 有外遇, 夫妻感情不佳, 总想离婚, 但又舍不得孩子, 且怕丢面子。遂来到心理咨询门诊, 想问心理咨询师, 离婚还是不离婚好。此时心理咨询师最应注意的原则是

- A. 回避原则
- B. 灵活原则
- C. 耐心原则
- D. 综合原则
- E. 中立原则

79. 男孩, 15 岁。贫血伴尿色黄 6 年, 未诊治。其弟弟有类似表现。查体: 巩膜轻度黄染, 脾肋下 2cm。辅助检查: Hb70g/L, MCV70fl, MCHC29%, 网织红细胞 0.09; 尿胆红素 (-), 尿胆原强阳性。下列检查对诊断最有帮助的是

- A. 酸溶血试验
- B. 自体溶血试验
- C. Coombs 试验
- D. 血红蛋白电泳
- E. 红细胞脆性试验

80. 女, 63 岁, 经常在冬季和季节转变时咳嗽, 咳痰史 8 年。近 3 年来活动时气急, 近 2 天因

湿啰音。心率 100 次/分, 下列哪项治疗措施是最重要的

- A. 持续低流量吸氧
- B. 使用氨茶碱等平喘药
- C. 选用氨溴索等祛痰药
- D. 超声雾化吸入
- E. 选用有效抗菌药

81. 女, 22 岁。受凉后出现寒战、发热、咳嗽, 咳少许黏痰 3 天。自服感冒药后热退。查体: T39.5°C, 急性病容, 右肺呼吸音减弱, 语音震颤增强。血常规: WBC $13.4 \times 10^9/L$, N0.87。胸部 X 线片显示右下肺大片状模糊阴影。该患者抗感染治疗不宜首选的是

- A. 青霉素
- B. 左氧氟沙星
- C. 阿莫西林
- D. 头孢曲松
- E. 阿米卡星 (氨基糖苷类)

82. 男孩, 14 岁。右大腿深部巨大海绵状血管瘤, 术后情况良好, 伤口一期愈合。拆线后下床活动 5 分钟后突然晕倒, 抢救无效死亡。应考虑

- A. 脑血管意外
- B. 心肌梗死
- C. 休克致死
- D. 肺动脉栓塞
- E. 脂肪栓塞

83. 男, 65 岁。间断腹胀、上腹隐痛 25 年。胃镜检查显示: 胃体黏膜变薄, 血管透见, 皱襞稀疏。患者可能缺乏的维生素是

A. 维生素 B₁₂

- B. 维生素 C
- C. 维生素 B₁₂
- D. 维生素 B₂
- E. 维生素 D

84. 女, 35 岁。下肢严重挤压伤 2 小时。查体: BP105/70mmHg, 实验室检查: 血清 K⁺6.0mmol/L, Na⁺138mmol/L, Cl⁻105mmol/L。

该患者最可能出现的酸碱平衡紊乱是

- A. 细胞外液碱中毒、尿液呈酸性
- B. 细胞外液酸中毒、尿液呈酸性
- C. 细胞外液酸中毒、尿液呈碱性
- D. 细胞内液碱中毒、尿液呈酸性
- E. 细胞外液碱中毒、尿液呈碱性

85. 女, 45 岁。在初次心理治疗中, 衣着整洁, 年貌相当, 言语清晰, 但语速较快, 逻辑欠清晰, 倾诉欲特别强, 说话滔滔不绝, 不带丝毫停顿。为了节省时间, 尽快了解患者的主要问题, 医生应对这位患者

- A. 解释其多话原因
- B. 训斥其说话无主题
- C. 使用封闭式提问
- D. 诊断为狂躁症
- E. 继续认真地倾听

86. 女, 23 岁。突发心悸半小时, 自数脉率为 180 次/分, 律齐; 将面部沉浸在冰水中心悸突然好转, 自数脉率为 70 次/分, 脉律齐。冷刺激使其症状缓解的最主要机制是

- A. 房室交界区不应期延长
- B. 窦房结自律细胞增强
- C. 异常传导的兴奋性增高
- D. 房室延搁时间缩短
- E. 房室交界区细胞 4 期自动去极化减弱

87. 某单位在职工体检时发现员工高血压、超重的检出率较高。医务人员为该单位进行的健康教育与健康促进干预活动主要包括调整食堂的膳食结构、制订工间操制度、组织文体活动等。这些干预活动主要是

- A. 社会因素
- B. 强化因素
- C. 人群因素
- D. 倾向因素
- E. 促成因素

88. 男性, 34 岁, 2 天前受凉后发热, 体温 38.9°C, 伴呼吸困难, 咳嗽, 咳少量黄痰, 腹泻两次, 自服“先锋霉素”无效。入院查体: 嗜睡, 口唇轻度发绀, 脉搏 100 次/分, 呼吸 28 次/分, 双肺叩诊呈清音, 双下肺可闻及湿啰音, 心律整, 腹(-), 血 WBC12.3×10⁹/L, 中性粒细胞 87%, 血气分析: pH7.35, PaO₂57mmHg, PaCO₂31mmHg, 胸片示: 左上肺前段、左下肺及右上肺前段、右中肺见斑片状阴影。最可能的诊断是

- A. 军团菌肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. ARDS
- D. 肺栓塞
- E. 支原体肺炎

89. 男, 45 岁。发作性呼吸困难 5 年, 再发 3 天, 伴咳嗽、咳白色泡沫痰, 无咯血、发热。有甲状腺功能亢进症病史 1 年。查体: 口唇发绀, 心率 90 次/分, BP135/90mmHg, 呼气相延长, 双肺可闻及哮鸣音。发生呼吸困难最可能的机制是

- A. 大支气管狭窄

- C. 小支气管狭窄
- D. 呼吸面积减少
- E. 肺泡张力增高

90. 某高校心理咨询工作人员接待了一位大学生, 该生对心理咨询师说, 他多次难以自控地想要杀死其女友。那么, 此情况下心理咨询师的最佳做法是

- A. 劝其尽快接受治疗
- B. 严格保守该生的秘密
- C. 告知该生女友家属对其进行保护, 同时建议该生家属带其进行必要的心理诊治
- D. 通知该生的家长对其妥善监管
- E. 联系精神病医院并直接送该生入院

91. 患儿, 3岁。因发热3日到县医院就诊, 接诊医师检查后拟诊为流行性出血热。因县医院不具备隔离治疗条件, 接诊医师遂嘱患儿的家长带患儿去市传染病医院就诊。按照传染病防治法的规定, 接诊医师应当

- A. 请上级医师会诊, 确诊后再转诊
- B. 请上级医师会诊, 确诊后隔离治疗
- C. 向医院领导报告, 确诊后对患儿就地隔离
- D. 向当地疾病控制机构报告, 并复印病历资料转诊
- E. 向当地疾病控制机构报告, 由疾病控制机构转诊

92. 为探讨儿童白血病的病因, 研究者选择100例确诊为白血病的儿童, 同时选择100例同期同医院的确诊无白血病的儿童, 然后调查其母亲孕期X线照射情况, 这种方法属于

- A. 临床试验
- B. 队列研究

- C. 现况调查
- D. 病例对照研究
- E. 历史性队列研究

93. 某幼儿园大班11名6岁儿童接受百白破疫苗注射后, 其抗体滴度分别是1:20, 1:20, 1:20, 1:40, 1:40, 1:80, 1:80, 1:160, 1:160, 1:320, 1:640。描述其抗体滴度的集中趋势的指标应选用

- A. 标准差
- B. 极差
- C. 算术平均数
- D. 几何平均数
- E. 四分位间距

94. 刘女士2周前经剖宫产产下一女婴, 产后奶水不足令孩子啼哭不止; 加之家里老人身体不好, 婴儿及产妇的照顾和护理也是问题, 刘女士因此萌生了悲观厌世的想法。对于医护人员来说, 为了解患者的心理状况, 比较简便的心理评估工具为

- A. TAT (主题统觉测验)
- B. H-RB (神经心理成套测验)
- C. SDS (自评抑郁量表)
- D. EPQ (艾森克人格问卷)
- E. MMPI (明尼苏达多相人格调查表)

95. 女, 36岁。突发呼吸困难伴咳粉红色泡沫痰10分钟, 有风湿性心脏病史。查体: BP150/95mmHg, 心率120次/分, 律齐, 心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音, P₂亢进, 双肺满布中小水泡音。可立即静脉注射

- A. 阿托品
- B. 胺碘酮

C. 呋塞米

- D. 普罗帕酮
- E. 垂体后叶素

96. 突发事件发生后,应当及时向毗邻省自治区直辖市人民政府卫生行政部门通报的机构是

- A. 国务院
- B. 国务院卫生行政部门
- C. 突发事件发生地的省自治区直辖市人民政府
- D. 突发事件发生地的省自治区直辖市人民政府卫生行政部门
- E. 国务院办公厅

97. 一淋巴结做病理切片检查,淋巴结内见成团的异型细胞,并有病理性核分裂象和角化珠形成。应诊断为

- A. 淋巴结结核
- B. 淋巴结慢性炎症
- C. 淋巴结转移性腺癌
- D. 恶性淋巴瘤
- E. 淋巴结转移性鳞癌

98. 女,35岁。丈夫因车祸去世,令其痛不欲生,遂到心理咨询门诊寻求帮助。该女性在诉说其目前的心境时痛哭流涕。对此,心理咨询师在初始阶段一般不应采取的措施是

- A. 对质其懦弱
- B. 帮助其领悟
- C. 增强其自控
- D. 指导其放松
- E. 接受其宣泄

99. 医生张某在某上级医院学习产前诊断技术,回到所在医院后想开展该项业务。根据《母婴

的资格,对其申请有审批权的机构应当是

- A. 市妇幼保健机构
- B. 省妇幼保健机构
- C. 省级卫生行政部门
- D. 市级卫生行政部门
- E. 县级卫生行政部门

100. 女,28岁。发热、咳嗽2个月。胸部X线片示左上肺不规则片状阴影。予抗结核治疗1月余。查体: T36.5°C, 巩膜稍黄染,双肺未闻及干湿性啰音。血常规: WBC $4.3 \times 10^9/L$, N0.55。肝功能检查示: ALT和AST正常,总胆红素 $40.6 \mu\text{mol/L}$,直接胆红素 $17.8 \mu\text{mol/L}$ 。该患者现停用的药物是

- A. 利福平
- B. 异烟肼
- C. 吡嗪酰胺
- D. 乙胺丁醇
- E. 链霉素

101. 男,28岁。呕吐,腹胀3天,胡言乱语1天。查体: 巩膜明显黄染,肝浊音界缩小。血ALT 520IU/L , TBil $215 \mu\text{mol/L}$, DBil $138 \mu\text{mol/L}$ 。其典型的病理改变主要是

- A. 肝细胞脂肪变性
- B. 汇管区纤维化
- C. 多个小叶或大块肝细胞坏死
- D. 淤血性改变
- E. 汇管区中性粒细胞变性

102. 对10名25岁以上的山区健康男子测量脉搏次数(次/分),用t检验与全国正常男子治疗进行比较,按 $\alpha=0.05$ 的检验水准,自由度为

▲

- B. v=19
- C. v=8
- D. v=20
- E. v=18

103. 女, 30 岁。孕 40 周, 无剖宫产适应证, 但产妇及家属坚决要求剖宫产。术后新生儿出现呼吸困难, 诊断新生儿湿肺, 家属对提出质疑。主治医师称, 产妇本不该手术, 自然分娩该病发生的概率较低, 这些信息已告知且产妇及家属已签字。但家属认为: 医生是权威, 应由医生决定是否进行手术, 如果医生讲清楚剖宫产会导致新生儿湿肺, 我们不会再坚持。本案例中, 该医师违背的临床诊疗伦理要求是

- A. 履行知情同意手续
- B. 药品合理配伍
- C. 患者利益至上
- D. 医护精诚协作
- E. 认真做好术前准备

104. 女, 19 岁。因发热伴头痛、呕吐、烦躁 2 天, 于 8 月 10 日入院。查体: T39.8°C, BP130/80mmHg, 精神差, 问话不能正确回答, 颈抵抗 (+), 克氏征及巴氏征均阳性。该患者病变最严重的部位是

- A. 脑桥和小脑
- B. 基底核和丘脑
- C. 小脑和延髓
- D. 延髓和脑桥
- E. 大脑皮层及丘脑

105. 男孩, 5 岁。发热、头痛、呕吐 4 天, 昏迷半天, 于 2 月 10 日入院。查体: T39.6°C, P115 次/分, R26 次/分, BP60/20mmHg。神志不清, 皮肤可见出血点, 球结膜水肿, 心肺腹

(-), 颈抵抗 (+), 双侧巴氏征 (+)。实验室检查: 血 WBC $16.4 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 0.88, 淋巴细胞 0.12。患者抢救无效于次日死亡。其脑组织病理检查最可能出现的结果是

- A. 颅底多发性闭塞性动脉内膜炎, 引起脑实质损害
- B. 软脑膜充血、水肿、出血
- C. 脑沟和脑回可见小的肉芽肿、结节和脓肿, 蛛网膜下腔可见有胶样渗出物
- D. 病变多发生在灰质白质交界处, 引起脑室扩大、脑积水及脑蛛网膜炎
- E. 脑血管高度扩张充血, 蛛网膜下腔充满黄色脓性分泌物

106. 男, 21 岁。发热、咳嗽 3 天入院。胸部 X 线片显示右下肺致密阴影。血常规: WBC $13 \times 10^9/L$ 。该患者最可能的病原体是

- A. 肺炎克雷伯杆菌
- B. 肺炎支原体
- C. 结核分枝杆菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

107. 女, 43 岁, 1 周前, 曾因咳嗽, 低热就诊, 诊断为上呼吸道感染, 近两天来发现颈部疼痛, 波及到耳、颞、枕部, 查体: 甲状腺弥漫性肿大, 质硬, 压痛, 体温 38°C, ESR20mm/h, BMR+20%, 碘吸收率 2 小时 5%, 24 小时 20%, 甲状腺穿刺可见白细胞浸润和吞有胶体颗粒的巨细胞, 此患者的诊断

- A. 轻度甲亢
- B. 结节性甲状腺肿
- C. 单纯性甲状腺肿
- D. 亚急性甲状腺炎

108. 男, 65 岁。反复反酸、烧心、上腹胀 4 年, 加重 1 个月。胃镜检查: 食管下段见 3 条纵行黏膜破损, 相互融合。目前最主要的治疗药物是

- A. 硫糖铝
- B. 西咪替丁
- C. 铝碳酸镁
- D. 奥美拉唑
- E. 枸橼酸铋钾

109. 男, 60 岁。进行性消瘦, 低热, 食欲缺乏, 伴右上腹胀痛 3 个月。查体: 皮肤、黏膜无黄染, 浅表淋巴结无肿大, 心肺检查无异常, 肝肋下 1.5cm, 剑突下 4cm 可及, 白细胞 $4 \times 10^9/L$ 。B 超显示右叶有直径 5cm 的强回声团块, 中央可见液性暗区。正确的诊断是

- A. 肝硬化
- B. 肝癌
- C. 肝囊肿
- D. 肺结核
- E. 肝脓肿

110. 某医院抽样调查得 100 名健康人血清, 求得平均数为 4.800, 标准差为 0.7920。求其标准误为

- A. 0.0792
- B. 0.7920
- C. 0.0079
- D. 0.048
- E. 7.92

111. 男, 42 岁。慢性肾炎病史多年, 近 1 年经常出现双下肢水肿, 一直服双嘧达莫和氢氯噻嗪。近 1 周感觉腰痛、乏力、双下肢无力。医生必须考虑的是

- A. 肾功能严重减退
- B. 低钾血症
- C. 肾盂肾炎
- D. 双嘧达莫中毒
- E. 氢氯噻嗪中毒

112. 男, 55 岁, 工程师。因膀胱癌入院准备接受手术治疗。在术前准备期间, 患者一方面希望尽快恢复健康而配合各种检查和治疗, 另一方面又担心自己主持的工程项目出问题而自行离院回单位开会。这种患者角色的状态属于

- A. 角色行为强化
- B. 角色行为异常
- C. 角色行为适应
- D. 角色行为缺如
- E. 角色行为冲突

113. 女, 35 岁, 因甲状腺肿块在当地行甲状腺肿块切除术后 5 天, 病理学诊断为甲状腺乳头状腺癌 II 级, 对该患者的进一步处理是

- A. 终生服用甲状腺素片
- B. 行放射性外照射
- C. 行放射性碘治疗
- D. 再次手术, 行患侧全切及对侧全切
- E. 再次手术, 行患侧全切、峡部切除及对侧大部切除

114. 女, 45 岁。类风湿关节炎 5 年, 予改变病情抗风湿药及小剂量激素治疗, 疾病仍然处于高活动状态, 关节骨破坏发展。此时可考虑选用的细胞因子拮抗治疗是

- A. 抗 CD5 单抗
- B. 抗 EGFR 抗体
- C. 抗 IL-23 单抗

- D. 抗 HER-2 抗体
- E. 抗 TNF- α 单抗

115. 某一急性药物中毒病人, 表现为昏迷、瞳孔极度缩小、呼吸深度抑制、血压降低。出现上述中毒症状的药物是

- A. 苯巴比妥
- B. 吗啡
- C. 地西洋
- D. 氯丙嗪
- E. 苯妥英钠

A3/A4 型选择题 (117~126 题)

(117~119 题共用题干)

男, 65 岁。高血压病史 5 年, 于活动中突然出现右侧肢体无力, 伴讲话不清和呕吐, 2 小时后来急诊。查体: 血压 220/120mmHg, 心律齐, 眼球向下偏斜, 意识障碍, 不能讲话, 右侧肢体完全偏瘫。

117. 此患者可能的诊断为

- A. 脑栓塞
- B. 脑出血
- C. 脑血栓形成
- D. 上矢状窦血栓形成
- E. 短暂性脑缺血发作

118. 首选的检查是

- A. 脑血管造影
- B. 头颅 MRI
- C. 头颅 CT
- D. 经颅多普勒超声
- E. 脑电图

(119~121 题共用题干)

116. 女, 35 岁。早饱、体重下降 1 年。每餐进食约 50g 固体食物即感上腹饱胀而无法继续进食。胃镜检查: 黏膜光滑、花斑, 以红为主。

该患者胃运动障碍主要为

- A. 胃体蠕动减弱
- B. 胃窦蠕动减弱
- C. 胃底容受性舒张障碍
- D. 胃排空延迟
- E. 幽门痉挛

感染 1 月余入院治疗。骨科主治医师王某建议进行专家会诊。会诊后决定采用保守治疗, 既避免手术治疗造成软组织的进一步损伤, 又能节约费用。治疗期间患者经常出现紧张、焦虑, 害怕出现组织坏死甚至截肢等严重后果, 影响睡眠和康复。

119. 针对该患者的紧张焦虑, 最适合的心理干预技术是

- A. 冲击
- B. 梦的分析
- C. 厌恶疗法
- D. 系统脱敏法
- E. 放松训练

120. 本案例中, 专家会诊决定的治疗方案体现的临床诊断伦理原则是

- A. 保密守信原则
- B. 患者至上原则
- C. 公平公正原则
- D. 知情同意原则
- E. 具体化原则

121. 骨科主治医师应当对患者实施的医学措施是

- A. 精神障碍治疗
- B. 心理健康指导
- C. 精神障碍鉴定
- D. 精神障碍诊断
- E. 精神障碍检查

(122~123 题共用题干)

男, 18 岁。双下肢及颜面水肿 1 周。实验室检查: 尿蛋白 12.2g/d, RBC0~2 个/高倍视野, 白蛋白 18g/L, Scr79 μ mol/L, ANA (-), 乙型肝炎病毒标志物均 (-)。

122. 该患者最可能的肾脏病理类型是

- A. 毛细血管内增生性肾小球肾炎
- B. 膜增生性肾小球肾炎
- C. 膜性肾病
- D. 局灶节段性肾小球硬化
- E. 微小病变型肾病

123. 如果经足量糖皮质激素治疗 12 周无效, 其病理类型最可能是

- A. 局灶节段性肾小球硬化
- B. 膜性肾病
- C. 微小病变型肾病
- D. 膜增生性肾小球肾炎
- E. 毛细血管内增生性肾小球肾炎

B1 型选择题 (127~150 题)

(127~128 题共用备选答案)

- A. 急性巨核细胞白血病
- B. 急性单核细胞白血病
- C. 急性早幼粒细胞性白血病
- D. 急性粒细胞白血病部分分化型
- E. 急性淋巴白血病

(124~126 题共用题干)

女, 28 岁。被人发现昏迷且休克, 室内有火炉, 且发现有敌敌畏空瓶。查体: T36 $^{\circ}$ C, BP90/60mmHg, 四肢厥冷, 腱反射消失。心电图为一度房室传导阻滞。尿常规: 尿糖 (+), 尿蛋白 (+)。血液 COHb 为 60%。

124. 对该患者, 您考虑最可能的疾病诊断是

- A. 急性巴比妥类中毒
- B. 急性有机磷农药中毒
- C. 急性 CO 中毒
- D. 糖尿病酸中毒
- E. 急性亚硝酸盐中毒

125. 诊断该病后, 首要的治疗方法是

- A. 20%甘露醇 250ml 快速静点
- B. 冬眠疗法
- C. 血液透析
- D. 能量合剂
- E. 氧气疗法

126. 该病在重度昏迷期间, 下列哪项并发症最

- A. 肺水肿
- B. 心律失常
- C. 上消化道出血
- D. 中毒性肝炎
- E. 肾衰竭

E. 急性淋巴白血病

127. 细胞化学染色变现为髓过氧化物酶(+++)、糖原染色 (-) 的疾病是

128. 细胞化学染色变现为非特异性 (+), 可被氧化钠抑制的疾病是

(129~131 题共用备选答案)

- A. 医疗审慎
 - B. 临终关怀
 - C. 医德认识
 - D. 传统习俗
 - E. 医德教育
129. 能够表明一个医务人员良好医德品质的是
130. 作为医德评价方式之一的是
131. 能够体现人道主义在医学领域内升华的是

(132~133 题共用备选答案)

- A. 金黄色葡萄球菌
 - B. 草绿色链球菌
 - C. A 组乙型溶血性链球菌
 - D. 大肠杆菌
 - E. 肺炎球菌
132. 风湿性心内膜炎的常见致病菌是
133. 亚急性细菌性心内膜炎的常见致病菌是

(134~136 题共用备选答案)

- A. 肠致活酶
 - B. 胰蛋白酶
 - C. 胆盐
 - D. 糜蛋白酶
 - E. 盐酸
134. 使胰蛋白酶原活化的最主要的物质是
135. 对脂肪起乳化作用的物质是
136. 活化糜蛋白酶原的物质是

(137~138 题共用备选答案)

- A. 甲氨蝶呤
- B. 多柔比星
- C. VP 方案
- D. 环磷酰胺
- E. DA 方案

137. 急性髓系白血病治疗首选
138. 急性淋巴细胞白血病治疗首选

(139~140 题共用备选答案)

- A. 属于I型超敏反应性疾病
 - B. 属于II型超敏反应性疾病
 - C. 属于III型超敏反应性疾病
 - D. 属于IV型超敏反应性疾病
 - E. 不属于超敏反应性疾病
139. 类风湿关节炎
140. 免疫复合物型肾小球肾炎

(141~142 题共用备选答案)

- A. 腺病毒
 - B. 新型肠道病毒 71 型
 - C. 埃可病毒
 - D. 轮状病毒
 - E. 脊髓灰质炎病毒
141. 目前最常见的导致手足口病的病原体是
142. 可导致流行性角结膜炎的病原体是

(143~144 题共用备选答案)

- A. 糖的无氧酵解
 - B. 糖的有氧氧化
 - C. 磷酸戊糖途径
 - D. 乳酸生成反应
143. 成熟红细胞所需能量来自
144. 红细胞中 NADPH 主要来自

(145~146 题共用备选答案)

- A. 免疫球蛋白
- B. 肌红蛋白
- C. 脂蛋白
- D. 铜蓝蛋白
- E. 白蛋白

146. 转运游离脂肪酸的是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 葡萄球菌
- B. 链球菌
- C. 脑膜炎奈瑟菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 淋病奈瑟菌

147. 可引起食物中毒的细菌是

148. 在黏膜表面黏附时,可产生分解 SIgA 蛋

白酶的细菌是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 磺胺嘧啶
- B. 四环素
- C. 异烟肼
- D. 甲氧苄啶
- E. 环丙沙星

149. 治疗结核病选用的药物

150. 治疗铜绿假单胞菌感染首选的药物



第二单元

A1 型选择题 (1~45 题)

1. 隐睾最严重的后果是
 - A. 睾丸扭转
 - B. 睾丸炎
 - C. 不育
 - D. 睾丸恶变
 - E. 睾丸萎缩
2. 流行性脑脊髓膜炎病原体的特点是
 - A. 革兰染色阳性双球菌
 - B. 革兰染色阴性双球菌
 - C. 革兰染色阳性杆菌
 - D. 革兰染色阴性弧菌
 - E. 革兰染色阴性杆菌
3. 成人股骨头最主要的血供来源是
 - A. 干骺端上侧动脉
 - B. 股骨干滋养动脉升支
 - C. 骺外侧动脉
 - D. 圆韧带内的小凹动脉
 - E. 干骺端下侧动脉
4. 下列哪种血气分析变化符合 I 型呼吸衰竭
 - A. $\text{PaO}_2 55\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 50\text{mmHg}$
 - B. $\text{PaO}_2 65\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 40\text{mmHg}$
 - C. $\text{PaO}_2 50\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 40\text{mmHg}$
 - D. $\text{PaO}_2 70\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 35\text{mmHg}$
 - E. $\text{PaO}_2 80\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 55\text{mmHg}$
5. 常于秋季发病, 儿童和青年人多见, 起病缓慢, 阵发性干咳、发热、肌痛, 胸片示下叶间质性肺炎改变, 可能为
 - A. 喘息型慢性支气管炎
 - B. 支气管哮喘
 - C. 肺炎支原体肺炎
 - D. 肺炎克雷伯杆菌肺炎
6. 吸入性肺脓肿最常见的病原体是
 - A. 铜绿假单胞菌
 - B. 表皮葡萄球菌
 - C. 金黄色葡萄球菌
 - D. 肺炎链球菌
 - E. 厌氧菌
7. 肾细胞癌的淋巴转移最先到
 - A. 肺
 - B. 肝
 - C. 骨
 - D. 脑
 - E. 肾蒂
8. 评价心脏功能最常用的检查方法为
 - A. 胸部 X 线
 - B. 常规心电图
 - C. 心电图运动负荷试验
 - D. 超声心动图
 - E. 放射性核素心肌显像
9. 肾病综合征的诊断标准不包括
 - A. 血清白蛋白 $< 30\text{g/L}$
 - B. 高血压
 - C. 水肿
 - D. 高脂血症

10. 阵发性室上性心动过速的根治措施

- A. 直流电复律
- B. 经食道超速起搏
- C. 口服长效 β 受体拮抗剂
- D. 口服长效维拉帕米
- E. 射频消融术

11. 右心衰竭引起淤血的器官主要是

- A. 肺、肾及胃肠道
- B. 肺、脑及胃肠道
- C. 肝、脾及胃肠道
- D. 脾、肺及胃肠道
- E. 肺、肝及胃肠道

12. 有关急性心肌梗死心肌损伤标志物的描述不正确的是

- A. 肌红蛋白起病后 2 小时内升高, 12 小时内达到高峰, 24~48 小时恢复正常
- B. 肌钙蛋白起病后 6 小时内升高, 5~6 天恢复正常
- C. CK-MB 起病后 4 小时内增高, 16~24 小时达高峰, 3~4 天恢复正常
- D. AST 在起病 6~10 小时开始升高, 3~6 天恢复正常
- E. LDH 在起病 6~10 小时后升高, 1~2 周内恢复正常

13. 主要作用于髓祥升支粗段皮质部和髓质部的利尿药是

- A. 螺内酯
- B. 氨苯蝶啶
- C. 甘露醇
- D. 呋塞米
- E. 氢氯噻嗪

淋巴瘤) 发病有关的感染是

- A. Hp 感染
- B. HPV 感染
- C. HIV 感染
- D. EBV 感染
- E. HTLV-1 感染

15. 中央型肺癌伴纵隔肺门多发淋巴结肿大最常见于

- A. 鳞癌
- B. 大细胞癌
- C. 小细胞癌
- D. 腺癌
- E. 类癌

16. 对哮喘持续状态有效的药物治疗是

- A. 头孢他啶
- B. 右旋糖酐
- C. 地塞米松
- D. 哌替啶
- E. 阿托品

17. 下列关于心力衰竭的叙述错误的是

- A. 心室充盈及(或)射血能力受损
- B. 心排量可维持正常
- C. 是伴有临床症状的心功能不全
- D. 常伴肺循环充血
- E. 有心功能不全不一定有心力衰竭

18. 肺癌空洞的典型 X 线表现是

- A. 薄壁空洞, 形状不规则
- B. 厚壁空洞, 内壁光滑
- C. 薄壁空洞, 内壁光滑
- D. 厚壁空洞, 内壁凹凸不平
- E. 厚壁空洞, 内有液平

19. 诊断肾病综合征必须具备的依据是

- A. 大量蛋白尿与血尿
- B. 高脂血症与水肿
- C. 大量蛋白尿与低蛋白血症
- D. 低蛋白血症与高脂血症
- E. 水肿与低蛋白血症

20. 脊柱骨折搬运时禁用的方法是

- A. 平托将伤员移至木板
- B. 平托将伤员移至担架
- C. 多人用手同时平托搬运
- D. 将患者躯干成一整体滚动
- E. 一人抬头一人抬足搬运

21. 剧烈运动时，少尿的主要原因是

- A. 肾小球毛细血管血压增高
- B. 抗利尿激素分泌增多
- C. 肾小动脉收缩，肾血流量减少
- D. 醛固酮分泌增多
- E. 肾小球滤过膜面积减少

22. 抗利尿激素来源于

- A. 腺垂体
- B. 下丘脑的视上核和室旁核
- C. 垂体柄中间部，
- D. 神经垂体
- E. 漏斗部

23. 诊断肾癌最常见的检查方法是

- A. 肾穿刺活检
- B. IVU
- C. KUB
- D. CT（平扫+增强）
- E. 逆行肾盂造影

A. 右房右室大

- B. 左室右室大
- C. 左室左房大
- D. 右室左房大
- E. 右房左房大

25. 下列引起白细胞减少的疾病，发病机制不属于粒细胞破坏或消耗的是

- A. 脾功能亢进
- B. 类风湿关节炎
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 巨幼细胞贫血
- E. 败血症

26. 阻塞性肺不张时不会出现的体征是

- A. 病变部位呼吸音减弱
- B. 病变部位叩诊呈浊音
- C. 病变部位触觉震颤增强
- D. 气管向患侧移位
- E. 胸廓可有塌陷

27. 下列各项为肺癌常见症状，除了

- A. 刺激性咳嗽
- B. 大咯血
- C. 咳脓痰
- D. 痰中带血
- E. 胸痛

28. 小儿肾病综合征最常见的并发症是

- A. 电解质紊乱
- B. 血管栓塞
- C. 低血容量休克
- D. 细菌或病毒感染
- E. 肾衰竭

- A. 头下骨折
- B. 经颈骨折
- C. 基底骨折
- D. 内收骨折
- E. 外展骨折

30. 孟氏 (Monteggia) 骨折的 X 线

- A. 桡骨干下 1/3 骨折合并尺骨
- B. 尺骨干上 1/3 骨折合并下尺骨
- C. 尺骨干上 1/3 骨折合并桡骨
- D. 尺骨干下 1/3 骨折合并桡骨
- E. 桡骨干上 1/3 骨折合并尺骨

31. 肾性贫血最主要的原因是

- A. 铁及叶酸摄入不足
- B. 消化道失血
- C. 蛋白质摄入量不足
- D. 红细胞寿命缩短
- E. 促红细胞生成素合成不足

32. 下列各项组合中, 能准确判断酸中毒性质严重程度和代偿情况的是

- A. 动脉血和尿的 pH
- B. 动脉血 pH 和 HCO_3^-
- C. 动脉血和静脉血 pH
- D. 动脉血和静脉血 PaCO_2
- E. 静脉血和尿的 pH

33. 胫骨中下段多段闭合性骨折功能复位后发生骨折端不愈合, 最可能的原因是

- A. 骨折端血液供应差
- B. 未用促骨折愈合药物
- C. 未达到解剖复位
- D. 功能锻炼不够
- E. 骨折端软组织嵌入

34. 最容易引起骨折不连接的移位是

- A. 成角移位
- B. 侧方移位
- C. 分离移位
- D. 旋转移位
- E. 缩短移位

35. 提示支气管哮喘患者病情危重的是

- A. 呼气相延长
- B. 脉压增加
- C. 呼吸性碱中毒
- D. 胸腹矛盾运动
- E. 烦躁不安

36. 慢性肾炎的综合治疗措施不包括

- A. 常规应用激素及细胞毒药物
- B. 积极控制血压
- C. 避免用氨基糖苷类抗生素
- D. 应用血小板解聚药
- E. 肾功能不全氮质血症时限制食物中蛋白和磷

37. 心肺复苏时首选药物是

- A. 肾上腺素
- B. 去甲肾上腺素
- C. 阿托品
- D. 异丙肾腺素
- E. 多巴胺

38. 尿路结石在下列哪些部位形成

- A. 肾和膀胱
- B. 肾和输尿管
- C. 输尿管和膀胱
- D. 肾
- E. 膀胱

39. 诊断结核性脑膜炎首要的检查是

- A. 腰穿
- B. 结核抗体检测
- C. PPD
- D. 头颅 CT
- E. 胸片

40. 风湿性心脏病严重二尖瓣狭窄突发大咯血是由于

- A. 肺毛细血管破裂
- B. 急性肺水肿
- C. 合并肺结核
- D. 支气管静脉破裂
- E. 合并支气管扩张

41. 最易发生血栓并发症的肾病综合征病理类型是

- A. 微小病变肾病
- B. 非 IgA 系膜增生性肾炎
- C. 系膜增生性 IgA 肾病
- D. 膜性肾病
- E. 局灶节段性肾小球硬化

42. 颈静脉过度充盈并于深呼气时更明显, 最可能的原因是

- A. 全心衰竭

B. 左心衰竭

- C. 上腔静脉血栓形成
- D. 肥厚型梗阻性心肌病
- E. 心包积液

43. 双胍类降血糖药物的降糖作用机制是

- A. 抑制肝糖原的分解
- B. 增加基础胰岛素的分泌量
- C. 改变餐时胰岛素的分泌模式
- D. 延缓肠道碳水化合物的吸收
- E. 激活过氧化物酶增殖体活化因子受体

44. 以下不适合用输尿管镜碎石的是

- A. 输尿管狭窄
- B. 阴性结石
- C. 结石停留时间较长
- D. 患侧肾积水
- E. 肥胖患者

45. 细支气管不完全阻塞所致的阻塞性通气障碍可造成

- A. 气胸
- B. 肺纤维化
- C. 支气管扩张
- D. 肺不张
- E. 肺气肿

A2 型选择题 (46~111 题)

46. 某患者术后禁食 3 天, 仅从静脉输入大量 5% 葡萄糖液维持机体需要, 此患者最容易发生

- A. 高血钾
- B. 低血钾

- D. 高血钙
- E. 低血钙

47. 患者胸部外伤 2 小时。查体: 脉搏 120 次/分, 血压 12.0/8.0kPa, 右胸可触到骨擦感和皮下气肿, 叩诊鼓音, 呼吸音消失。急救处理是



- B. 立即胸腔排气
- C. 胶布固定
- D. 应用升压药
- E. 氧气吸入

48. 男，24岁。因车祸致开放性胫腓骨骨折，4小时后入院，急诊手术。手术的重点在于

- A. 胫腓骨折的复位和内固定
- B. 胫骨骨折的复位和内固定
- C. 腓骨骨折的复位和内固定
- D. 彻底清创，确保伤口一期愈合
- E. 骨牵引，待伤口二期愈合

49. 女，58岁。咳嗽、痰中带血、左胸痛1个月。胸部X线片示左侧大量胸腔积液。查体：左侧呼吸音消失、语颤减弱。有助于明确诊断的检查不包括

- A. 胸水细胞学及生化
- B. 胸部CT
- C. 胸膜活检
- D. 支气管镜
- E. 肺功能

50. 男孩，13岁。剧烈运动后右膝关节前方疼痛1周。查体：右胫骨结节处有明显隆起，压痛阳性。X线片示胫骨结节骨骺增大、破裂。最合适的处理方法是

- A. 局部封闭
- B. 钻孔植骨
- C. 膝关节短期制动
- D. 穿刺活检
- E. 切除活检

51. 患者肱骨中段骨折已6个月，局部有异常活动。X线片对位对线良好，但仍有骨折

治疗为宜

- A. 继续小夹板固定
- B. 胸肩肱石膏外固定
- C. 钢板内固定
- D. 钢板内固定+植骨
- E. 钢板内固定加植骨加石膏外固定

52. 男孩，14岁。左胫骨近端疼痛2个月，呈进行性加重。X线片检查发现左胫骨干骺端骨膜反应呈“日光反射”形态。最可能的诊断是

- A. 骨肉瘤
- B. 骨巨细胞瘤
- C. 骨软骨瘤
- D. 骨结核
- E. 骨囊肿

53. 女，20岁。发作性呼吸困难3年，曾肺功能检查诊断：“支气管哮喘”，控制使用吸入糖皮质激素+长效 β_2 受体激动剂，3天来症状加重，连续吸入短效 β_2 受体激动剂效果欠佳。此时患者应首先采取的措施是

- A. 再次吸入糖皮质激素+长效 β_2 受体激动剂
- B. 继续吸入短效 β_2 受体激动剂
- C. 口服糖皮质激素
- D. 口服氨茶碱
- E. 口服抗生素

54. 女，29岁。查体：血压160/95mmHg。实验室检查：Hb80g/L，蛋白(+)，颗粒管型2~3/HP，BUN10mmol/L，Scr230 μ mol/L。对该患者不宜采取

- A. 低蛋白饮食
- B. 高蛋白饮食
- C. 低钠饮食
- D. 根据尿量多少适当限水

E. 低磷饮食

55. 男, 37 岁。1 周来咳嗽、寒战、高热, 最高体温 40°C , 血 $\text{WBC}15.2\times 10^9/\text{L}$, $\text{N}0.91$, 经阿莫西林抗感染治疗后体温下降不明显, 逐渐出现呼吸急促。半月前颈部皮肤疖肿, 自行结痂。胸部 X 线片示双肺可见多发直径 $2\sim 3\text{cm}$ 的边缘模糊的类圆形阴影, 其内可见空洞。下列检查对明确诊断意义最大的是

- A. 痰涂片革兰染色
- B. 支气管镜
- C. 动脉血气分析
- D. 胸部 CT
- E. 血培养

56. 男, 16 岁。溺水, 经急救后来急诊。查体: $\text{P}120$ 次/分, $\text{R}32$ 次/分, $\text{BP}95/65\text{mmHg}$, 神志清楚, 口唇发绀, 双肺可闻及湿性啰音。面罩吸氧后氧饱和度监测显示为 85% 。该患者应立即采取的治疗措施是

- A. 静脉注射地塞米松
- B. 无创通气
- C. 静脉注射呋塞米
- D. 静脉注射毛花苷 C
- E. 皮下注射吗啡

57. 男, 55 岁。间断咳嗽、咳痰, 反复发作 30 年, 近 2 年来渐觉气短。吸烟 36 年, 40 支/日。发现高血压 3 年。查体: $\text{BP}140/90\text{mmHg}$, 心肺无明显阳性体征。心脏彩超未发现异常。为明确诊断首选的检查是

- A. 胸部 CT
- B. 肺功能
- C. 运动心肺功能
- D. 冠状动脉造影

E. 核素心肌显影

58. 男, 70 岁。左侧下颌部阵发性抽搐剧痛 3 天, 不能吃饭。查体: 双额纹对等, 闭目有力, 面部感觉对称存在。诊断为

- A. 右面神经麻痹
- B. 偏头痛
- C. 左三叉神经痛
- D. 右三叉神经痛
- E. 左面神经麻痹

59. 女, 21 岁。左胫骨下段横行骨折。经手法复位石膏固定后复查 X 线片, 符合功能复位的是

- A. 断端旋转 5°
- B. 断端重叠 2cm
- C. 骨折向外侧成角 5°
- D. 断端分离 1cm
- E. 骨折向前方成角 5°

60. 男, 35 岁。入院诊断为扩张型心肌病, 心功能 IV 级。心电图示心率 96 次/分, 心房颤动。血电解质: 血清钾 6.5mmol/L , 血清钠 130mmol/L 。该患者不宜应用

- A. 硝普钠
- B. 呋塞米 (速尿)
- C. 螺内酯 (安体舒通)
- D. 地高辛
- E. 阿司匹林

61. 男, 27 岁, 近日来出现午后低热。阴囊疼痛, 皮肤发红、发热、疼痛, 并沿精索、下腹部以及会阴部放射。检查阴囊部可触及寒性脓肿, 首先采取的治疗措施

- A. 脓肿切开引流

- C. 热水坐浴
- D. 理疗
- E. 附睾切除术

62. 女, 38 岁。10 年前分娩后出现无乳汁分泌, 闭经, 食欲缺乏, 怕冷, 面色苍白, 毛发脱落。最可能的诊断是

- A. 腺垂体功能减退症
- B. 原发性甲状腺功能减退症
- C. 神经性厌食症
- D. 肾上腺皮质功能减退症
- E. 卵巢功能早衰症

63. 男, 14 岁。平素喜踢足球, 近 1 周右小腿上端前侧疼痛。查体: 右小腿上端前侧隆起, 皮肤无红肿发热及静脉怒张, 压痛明显。X 线片示胫骨结节骨骺增大、致密。应首先考虑的诊断是胫骨结节

- A. 撕脱骨折
- B. 骨髓炎
- C. 骨结核
- D. 骨软骨瘤
- E. 骨软骨病

64. 中年男性, 骑摩托车摔倒, 左小腿砸伤 10 小时后来院。检查见左小腿中段高度肿胀, 坚硬并有异常活动, 足部皮温较对侧低, 感觉明显减退, 足背动脉触不到。X 线证实左胫腓骨中段骨折。其可能的并发症是

- A. 胫前动脉损伤
- B. 腓总神经损伤
- C. 脂肪栓塞
- D. 感染
- E. 骨筋膜室综合征

室率 50 次/分, P-R 间期 0.21 秒, P-R 间期及 R-R 间期恒定不变, QRS 波群形态和时限正常。最可能的诊断为

- A. 二度 I 型房室传导阻滞
- B. 二度 II 型房室传导阻滞
- C. 三度房室传导阻滞
- D. 心房颤动伴差异性传导
- E. 一度房室传导阻滞

66. 男, 19 岁。约 2 周前曾咳嗽、流涕, 近 3 天感心悸。查体: 心界不大, $P_2 > A_2$, 心率 96 次/分, 可闻及频发期前收缩, 心脏各瓣膜区未闻及杂音和附加音。心电图示室性期前收缩。血清肌钙蛋白升高。该患者最可能的诊断是

- A. 感染性心内膜炎
- B. 扩张型心肌病
- C. 急性心肌梗死
- D. 急性心包炎
- E. 病毒性心肌炎

67. 男, 49 岁。发作劳力性胸痛 2 个月余, 每次持续 5~10 分钟, 休息 2~3 分钟可自行缓解。查体: BP140/90mmHg, 心率 110 次/分, 律齐。心电图示窦性心律。为控制心率, 宜首选的药物是

- A. 地高辛
- B. 胺碘酮
- C. 普罗帕酮
- D. 维拉帕米
- E. 美托洛尔

68. 女, 68 岁。清晨锻炼时突发心肌梗死, 心搏骤停 3 分钟后实施心肺复苏, 5 分钟后心跳、呼吸恢复, 10 分钟后到医院。查体: P100 次/分, BP100/65 mmHg, II、III、aVF 导联 ST 段抬高, 双侧瞳孔不等

大。不必要的治疗措施是

- A. 足量抗生素静滴
- B. 高压氧疗
- C. 呋塞米 20mg 静脉滴注
- D. 物理降温使体温降至 33~35°C
- E. 20%甘露醇 250ml 静脉快速滴注

69. 男, 56 岁。2 年来间断出现活动时胸闷, 休息时可缓解, 近 4 个月无胸闷发作。查体: BP130/85mmHg, 心率 72 次/分, 心脏各瓣膜区未闻及杂音。最有助于明确诊断的检查是

- A. 放射性核素静态心肌造影
- B. 动态心电图
- C. 超声心动图
- D. 心电图运动负荷试验
- E. 胸部 X 线片

70. 女, 78 岁。跌倒时左肩部着地受伤。既往脑梗死病史 8 年, 遗留左侧肢体偏瘫。查体: 左肩部肿痛, 活动受限。X 线片检查示左肱骨大结节与肱骨干交界处可见多个骨碎块, 对位线尚可, 略有侧方移位。首选治疗方法是

- A. 耻骨鹰嘴外展位骨牵引
- B. 手法复位, 外固定
- C. 切开复位内固定
- D. 小夹板固定、皮牵引
- E. 三角巾悬吊、对症治疗

71. 男, 28 岁, 阵发性心悸, 头痛、大汗 3 月余, 多在体位变化, 情绪激动时发作, 体重减轻约 5kg, 发作时面色苍白, 多汗, 血压最高时达 230/120mmHg, 心率 96 次/分, 静注酚妥拉明后 1 分钟血压可降至 150/100mmHg, 肾上腺 CT 示右肾上腺有一直径约 5cm 类球形占

位。最可能的诊断是

- A. 原发性醛固酮增多症
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 嗜铬细胞瘤
- D. 肾病综合征
- E. 库欣综合征

72. 女, 34 岁。全程肉眼血尿 1 天, 无血丝, 血块, 无尿频、尿急、尿痛, 无发热及腰腹痛, 尿沉渣镜检 RBC 满视野, WBC4~5 个/HP, 尿蛋白 (++)。首先应进行的检查是

- A. 膀胱镜检查
- B. 清洁中断尿培养
- C. 静脉肾盂造影
- D. 尿相差显微镜检查
- E. 同位素肾动脉扫描

73. 女孩, 7 岁。左髋疼痛、跛行 60 余天, 伴乏力、低热、消瘦。左腹股沟可触及 3cm×3cm 质软肿物, 无压痛。X 线片示左髋关节间隙变窄, 边缘性骨质破坏。最可能的诊断是

- A. 髋关节骨关节炎
- B. 股骨上端慢性骨髓炎
- C. 风湿性髋关节炎
- D. 髋关节结核
- E. 急性化脓性髋关节炎

74. 男孩, 4 岁。右侧阴囊包块, 质软, 透光试验阳性, 平卧后可消失。正确的诊断是

- A. 右侧睾丸鞘膜积液
- B. 右侧交通性鞘膜积液
- C. 右侧斜疝
- D. 右侧睾丸肿瘤
- E. 右侧附睾结核

75. 男, 64 岁。胆结石术后 5 天突发呼吸困难

BP110/80mmHg,端坐呼吸,烦躁不安,大汗,口唇发绀,双肺可闻及少量干湿性啰音,心率120次/分。该患者呼吸困难最可能的原因是并发

- A. 急性呼吸窘迫综合征
- B. 急性左心衰竭
- C. 继发肺部感染
- D. 自发性气胸
- E. 右心衰竭

76. 男,20岁。因阵发性心悸2年,急性发作2小时入院。查心电图显示:心率180次/分,节律规则,QRS波群时限0.11秒,可见逆行P波。该患者最可能的诊断为

- A. 阵发性室上性心动过速
- B. 阵发性室性心动过速
- C. 窦性心动过速
- D. 心房扑动
- E. 非阵发性房室交界区心动过速

77. 男,30岁。车祸受伤,伤后右髋关节疼痛剧烈不能活动。查体:患肢短缩,呈屈曲、内收、内旋畸形。应首先考虑的诊断是

- A. 股骨颈骨折
- B. 股骨干骨折
- C. 髋关节后脱位
- D. 髋关节前脱位
- E. 坐骨神经损伤

78. 女,28岁。低热、干咳2周。胸部X线片片示右侧中等量胸腔积液。胸腔积液检查示有核细胞总数 $1460 \times 10^6/L$,单核细胞0.85。给予四联抗结核药物治疗。下列对防止该患者出现胸膜肥厚最重要的措施是

- B. 胸腔内注射抗结核药物
- C. 口服糖皮质激素
- D. 胸腔内注射尿激酶
- E. 反复胸腔穿刺抽取胸腔积液

79. 女,35岁。肺结核患者,肺内有空洞性病变。最符合的X线表现是

- A. 上叶尖后段空洞,壁光滑,周围有卫星灶
- B. 下叶空洞周围大片炎性浸润
- C. 空洞内壁不规则,凹凸不平
- D. 厚壁空洞、偏心
- E. 厚壁空洞伴有液平面

80. 男,40岁。因创伤致心跳、呼吸停止,经复苏后恢复,继而出现体温升高、抽搐、惊厥,患者可能并发

- A. 肺水肿
- B. 心力衰竭
- C. 肾衰竭
- D. 脑水肿
- E. 脑死亡

81. 男,68岁。因脑梗死住院半月。近1周出现高热、咳嗽、咳脓血痰。查体: $T39.2^{\circ}C$,意识模糊,呼吸急促,口唇发绀。双肺散在湿性啰音。血常规: $WBC20.3 \times 10^9/L$, $N0.92$ 。胸片右肺大片状阴影,其中可见多个气囊腔。该患者可能的诊断是

- A. 金黄色葡萄球菌性肺炎
- B. 肺炎链球菌性肺炎
- C. 肺炎支原体肺炎
- D. 干酪性肺炎
- E. 真菌性肺炎

82. 女,38岁。洗衣时突发右侧肢体活动不灵

A. 胸腔内注射糖皮质激素

音，心律不齐，右侧偏瘫，上肢重于下肢，偏身痛觉减退，首先考虑的诊断是

- A. 脑血栓形成
- B. 脑栓塞
- C. 脑出血
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 短暂性脑缺血发作

83. 女，35岁。间断咳嗽、咳痰伴咯血20年，行HRCT检查示右中叶支气管囊状扩张，其余肺叶未见异常。今日再次咯血，量约200ml，给予静脉点滴垂体后叶素治疗，效果欠佳。该患者宜选择的最佳治疗措施为

- A. 静脉滴注鱼精蛋白
- B. 换用酚妥拉明静脉滴注
- C. 支气管动脉栓塞
- D. 支气管镜下止血
- E. 手术切除病变肺叶

84. 男，58岁。6个月前急性心肌梗死，心电图V₁~V₅导联ST段持续抬高3mm。近3个月偶尔快跑时出现胸闷，持续1小时。查体：心界向左侧扩大，心尖搏动弥散。该患者最可能的诊断是

- A. 急性心包炎
- B. 心室壁瘤
- C. 急性心肌梗死
- D. 梗死后心绞痛
- E. 变异型心绞痛

85. 孕妇，25岁。妊娠7个月，发热、腰痛伴恶心、呕吐，尿频、尿急、尿痛1天。查体：T38.5℃，左肾区叩击痛。血常规：WBC11.9×10⁹/L。尿常规：RBC5~8/HP，

WBC20~50/HP，尿蛋白(+)。最可能的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 急性膀胱炎
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 急性胃肠炎

86. 女性，50岁，因便血2个月来诊。直肠镜检查发现距肛缘4cm直肠前壁有2cm×2cm肿块，取活检病理检查为直肠乳头状腺癌，最佳的手术方式是

- A. 经肛局部切除术
- B. 骶后径路局部切除术
- C. Miles手术腹会阴联合直肠癌根治术
- D. Dixon手术经腹直肠癌切除术
- E. 经腹直肠癌切除、近端造口、远端封闭手术

87. 男，73岁。拔牙术后1周，寒战、发热、咳脓痰2天。查体：T39.4℃，右下肺可闻及湿性啰音。胸部X线片示右下肺大片状浓密模糊阴影。血常规：WBC20.3×10⁹/L，N0.96。该患者感染的病原菌最可能是

- A. 肺炎克雷伯杆菌
- B. 肺炎链球菌
- C. 厌氧菌
- D. 表皮葡萄球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

88. 男，17岁。双下肢出血点伴关节痛2周，水肿1周。实验室检查：尿红细胞30~40/HP，尿蛋白4.2g/d。血浆白蛋白28g/L，肾免疫病理示IgA沉积于系膜区，其病因诊断为

- A. IgA肾病
- B. 狼疮肾炎
- C. 过敏性紫癜肾炎
- D. 乙型肝炎相关性肾炎

D. 乙型肝炎相关性肾炎

E. 原发性肾病综合征

89. 男, 28 岁。慢性肾炎 5 年, 肌酐清除率 65ml/min, 3 天前患肺炎。应选用哪种抗生素

- A. 卡那霉素
- B. 红霉素
- C. 四环素
- D. 庆大霉素
- E. 羧苄青霉素

90. 男, 35 岁。车祸致腰背部受伤, 腰部活动明显受限, 双下肢出现弛缓性瘫痪, 大小便失禁。伤后 1 小时双下肢感觉、运动功能好转。最可能的诊断是

- A. 马尾神经损伤
- B. 脊髓挫伤
- C. 脊髓受压
- D. 脊髓震荡
- E. 脊髓出血

91. 男, 70 岁, 发现大量蛋白尿 2 周入院。入院后查本周蛋白尿阳性。为明确诊断, 检查意义最大的是

- A. 肾活检
- B. 骨髓穿刺
- C. 核素骨扫描
- D. 全身 X 线骨摄片
- E. 血白蛋白电泳

92. 男, 25 岁。2007 年 10 月 8 日因车祸被抬入急诊室。CT 检查显示颅内血肿, 量约 30ml, 合并下颌骨开放性骨折, 并有舌后坠。抢救原则首先是

- A. 降低颅内压
- B. 下颌骨结扎固定

D. 保持呼吸道通畅

E. 开颅手术

93. 男, 28 岁。既往患有风湿性心脏病, 近半月来发热, T38.3°C, 右下睑结膜见一出血点, 双肺无啰音, 脾肋下可扪及边缘, 双下肢皮肤少数紫癜。血常规: Hb100g/L, WBC $12 \times 10^9/L$, N0.75, PLT $150 \times 10^9/L$ 。可能的诊断是

- A. 脾功能亢进
- B. 过敏性紫癜
- C. 急性白血病
- D. 再生障碍性贫血
- E. 亚急性感染性心内膜炎

94. 男, 60 岁。排尿困难 3 个月。体检发现前列腺变硬。为排除前列腺癌意义最大的实验室检查项目是

- A. 血癌胚抗原
- B. 血酸性磷酸酶
- C. 血甲胎球蛋白
- D. 血碱性磷酸酶
- E. 血前列腺特异抗原

95. 女, 25 岁。乏力 3 个月。查体: BP170/105mmHg。血常规: Hb84g/L。尿常规: 蛋白(++), 颗粒管型 2~3 个/低倍视野。血液生化检查示 BUN12.3mmol/L, Scr276.8 μ mol/L。对该患者不应该采取的措施是

- A. 低磷饮食
- B. 控制血压
- C. 根据尿量适当限水
- D. 高蛋白饮食
- E. 低钠饮食

96. 男, 34 岁。四肢广泛挤压伤后 3 小时。急

唇发绀，双肺可闻及湿啰音，心率 140 次/分。血气分析（未吸氧）：PaO₂50mmHg，PaCO₂30mmHg。除扩容治疗外，此时应首选的治疗措施为

- A. 持续低浓度吸氧
- B. 机械通气
- C. 持续高浓度吸氧
- D. 静脉应用抗生素
- E. 应用糖皮质激素

97. 男，68 岁。活动后心悸、气短 4 年，突发憋喘 1 小时来诊。高血压病史 10 年余，平时血压波动于 130~150/70~90mmHg。查体：BP230/100mmHg，端坐位，双肺底可闻及少量湿性啰音，心率 114 次/分。该患者最适宜的治疗是

- A. 口服阿替洛尔
- B. 口服硝苯地平
- C. 口服哌唑嗪
- D. 肌注利血平
- E. 静脉滴注硝普钠

98. 男，40 岁。陈旧性心肌梗死 3 年，高血压病史 4 年。查体：BP150/95mmHg，心率 90 次/分。降压治疗宜首选

- A. α 受体拮抗剂
- B. β 受体拮抗剂
- C. 利尿剂
- D. 二氢吡啶类钙通道阻滞剂
- E. 神经节拮抗剂

99. 男，63 岁。2 型糖尿病 14 年，血压升高 5 年。尿蛋白定量 2.6g/d，血肌酐 132 μ mol/L。其蛋白尿性质应为

- B. 功能性
- C. 肾小管炎
- D. 溢出性
- E. 分泌性

100. 男，49 岁。4 小时前突然出现胸骨后闷痛，呈持续性。ECG 示：II、III、aVF 导联 ST 段弓背向上抬高 0.2mV。最可能的诊断是

- A. 变异型心绞痛
- B. 急性心包炎
- C. 急性心肌梗死
- D. 急性肺动脉栓塞
- E. 主动脉夹层分离

101. 女，28 岁。婚后 3 年未孕，继发闭经 2 年。查体：双侧乳房泌乳，血 PRL 水平 800 μ g/L；磁共振检查垂体未见占位病变。诊断继发闭经、原发不孕。治疗宜采用

- A. 手术切除垂体腺瘤
- B. 放射治疗垂体腺瘤
- C. 多巴胺激动剂溴隐亭
- D. 人工周期恢复月经
- E. 促排卵治疗不育

102. 男，45 岁。头痛、视物模糊 3 月余。查体：视力明显减退，视野缺损。查血 T₃、T₄、TSH 降低，血 ACTH、皮质醇降低。最可能的诊断是

- A. 肾上腺肿瘤
- B. 垂体肿瘤
- C. 甲状腺癌
- D. 艾迪生病
- E. 库欣病

103. 男，54 岁。发作性胸痛 3 天。于劳累时

最近 2 小时内上述症状发作 2 次,每次持续 20 分钟。该患者最恰当的处理措施是

- A. 立即收住院行心电图运动负荷试验
- B. 立即收住院监测心电图和血肌钙蛋白
- C. 门诊预约动态心电图检查
- D. 立即收住院行胸部 X 线片检查
- E. 门诊预约超声心动图检查

104. 女孩, 5 岁。车祸右大腿致伤。X 线显示右股骨中段骨折, 轻度成角畸形, 无明显移位。正确的治疗方法是

- A. 垂直悬吊皮牵引
- B. 切开复位髓内针内固定
- C. 切开复位钢板内固定
- D. 手法复位小夹板固定皮牵引
- E. 切开复位外固定架固定

105. 男, 48 岁。发作性胸痛 1 个月, 每次发作含硝酸甘油后缓解, 考虑冠心病心绞痛。最常用的检查方法是

- A. 心脏 X 线摄片
- B. 心电图运动负荷试验
- C. 放射性核素检查
- D. 动态心电图
- E. 超声心动图

106. 男, 60 岁, 突发意识丧失。心电监护示心电波形、振幅与频率均不规则, 无法辨认 QRS 波群、ST 段与 T 波。该患者应首选

- A. 利多卡因 1~1.5mg/kg 静脉注射
- B. 美托洛尔 5mg 静脉注射
- C. 胺碘酮 150mg 静脉注射
- D. 阿托品 0.1mg 静脉注射
- E. 360J 直流电除颤

沫痰 28 年, 气促 10 年, 近 2 天因受凉后出现发热伴咳黄脓痰, 气喘不能平卧。查体: 双肺语颤减弱, 可闻及散在干湿性啰音, 心界缩小, 心率 115 次/分。下列治疗措施哪项不妥

- A. 沙丁胺醇雾化吸入
- B. 低流量吸氧
- C. 高流量吸氧
- D. 口服头孢呋辛
- E. 口服泼尼松龙

108. 男, 38 岁。近 3 个月以来发作性血压升高达 29.3/17.3kPa (220/130mmHg), 伴心慌、大汗、头痛, 症状持续 1~2 小时后可自动消失, 血压恢复正常。该病例最可能的诊断为

- A. 原发性高血压病
- B. 恶性高血压
- C. 嗜铬细胞瘤
- D. 原发性醛固酮增多症
- E. 主动脉狭窄

109. 3 岁女孩, 近 2 个月来低热、盗汗, 精神、食欲差, PPD (+++), 全身未找到结核灶, 胸部 X 线检查未见异常。可能的诊断为

- A. 结核感染
- B. 卡介苗反应
- C. 原发型肺结核
- D. 继发性肺结核
- E. 结核性脑膜炎

110. 女, 50 岁。高血压病 5 年。空腹血糖 7.0mmol/L, 尿蛋白 (+++)。该患者首选的降压药物应为

- A. 利尿剂
- B. β 受体拮抗剂
- C. 钙通道阻滞剂

- D. α 受体拮抗剂
- E. 血管紧张素转换酶抑制剂

111. 女, 35 岁。双侧颈部淋巴结肿大 1 月余, 发热 1 周。既往体健。查体: $T38.1^{\circ}\text{C}$, 双侧颈部可触及数个肿大淋巴结, 最大者 $2\text{cm}\times 2\text{cm}$, 质韧, 无触痛。左颈部淋巴结活检见正常结构消失, 代之以均一的中-大型淋巴细胞浸润。免

疫组化: $\text{CD}20(+)$, $\text{CD}30(-)$, $\text{CD}5(-)$ 。最可能的诊断是

- A. 弥漫性大 B 细胞淋巴瘤
- B. 霍奇金淋巴瘤
- C. 套细胞淋巴瘤
- D. 滤泡性淋巴瘤
- E. 间变性大细胞淋巴瘤

A3/A4 型选择题 (112~134 题)

(112~113 题共用题干)

男, 60 岁。水肿、蛋白尿 3 个月。既往患糖尿病 3 年, 高血压 2 年。实验室: $\text{ESR}43\text{mm/h}$, $\text{Hb } 80\text{g/L}$, $\text{TP } 79\text{g/L}$, $\text{Alb } 30\text{g/L}$, $\text{SCr } 152\mu\text{mol/L}$ 。尿沉渣镜检 $\text{RBC } 0\sim 2/\text{HP}$, 尿蛋白(+). 尿蛋白定量 $7.6\text{g}/24\text{h}$, 尿蛋白分析提示以小分子蛋白为主。

112. 该患者最可能的诊断是
- A. 多发性骨髓瘤肾损害
 - B. 糖尿病肾病
 - C. 乙型肝炎病毒相关性肾炎
 - D. 良性小动脉性肾硬化症
 - E. 原发性小血管炎肾损害

113. 应首先做的检查是

- A. 抗中性粒细胞胞浆抗体
- B. 骨髓穿刺、血尿免疫固定电泳
- C. 乙肝病毒标志物
- D. 双肾 B 超
- E. 肾穿刺活检

(114~115 题共用题干)

女, 32 岁。慢性膀胱刺激症状逐渐加重 3 个月。KUB+IVU 见右肾有钤化影, 肾影增大。

114. 应考虑的疾病是

- A. 右肾结核
- B. 右肾肿瘤
- C. 右肾结石
- D. 肾盂肾炎
- E. 右肾积水

115. 对确诊最有价值的尿液检查是

- A. 尿三杯试验
- B. 尿蛋白测定
- C. 尿结核分枝杆菌培养
- D. 尿常规
- E. 尿普通细菌培养

(116~117 题共用题干)

男, 78 岁, 吸烟者。反复咳嗽、咳痰伴气促 40 余年, 加重 3 天入院。查体: $T38.3^{\circ}\text{C}$, $\text{BP}160/90\text{mmHg}$ 。呼吸急促, 口唇发绀, 双肺散在哮鸣音和湿性啰音, P_2 亢进, 三尖瓣区可闻及收缩性 3/6 级杂音, 双下肢水肿。血常规: $\text{WBC } 9.3\times 10^9/\text{L}$, $\text{N}0.78$ 。

116. 该患者最可能的诊断是

- A. 老年性心脏病

- C. 冠心病
- D. 风心病
- E. 肺心病

117. 为进一步明确诊断最需要的检查是

- A. 心电图
- B. 心脏彩超
- C. X线检查
- D. 动脉血气检查
- E. 通气/灌注 ECT

(118~119 题共用题干)

某建筑工人不慎坠楼，腰部剧痛，双下肢感觉、运动障碍，二便功能障碍，经 X 线检查，诊断为胸腰段压缩性骨折，高度怀疑脊髓损伤。

118. 下列哪项检查最有价值

- A. MRI
- B. CT
- C. ECT
- D. 脊髓造影
- E. X 线断层摄影

119. 除手术治疗外，早期最重要的治疗措施是

- A. 抗生素
- B. 吗啡镇痛
- C. 大剂量糖皮质激素和甘露醇脱水
- D. 防治压疮
- E. 留置导尿

(120~121 题共用题干)

产妇，37 岁。G₁P₀，胎膜已破 3 天，临产 2 天，胎动消失半天，由乡卫生院转来，查体：体温 39.9℃，脉搏 124 次/分，血压 12.0/9.0kPa (90/60mmHg)，胎位 LOA，先露+2，胎心 110

宫口开大 2cm，血象：白细胞 22×10⁹/L，中性 0.95，淋巴 0.05。

120. 下列诊断，哪项是错误的

- A. 胎膜早破
- B. 产时感染
- C. 胎儿宫内窘迫
- D. 高龄初产
- E. 先兆子宫破裂

121. 下列处理哪项是错误的

- A. 静脉抗生素
- B. 高渗葡萄糖+维生素 C 静滴
- C. 剖宫产
- D. 吸氧
- E. 静注催产素促进阴道分娩

(122~123 题共用题干)

女性，20 岁，服务业人员，未婚，不否认有性交行为。半月前躯干、四肢、双手掌跖出现红斑，无痒痛感，查体：躯干、四肢可见玫瑰色椭圆形斑疹，对称分布，掌跖部黄豆大小铜红色领圈样脱屑。

122. 该患者应考虑为哪种疾病

- A. 玫瑰糠疹
- B. 梅毒
- C. 红斑狼疮
- D. 麻疹
- E. 结节性红斑

123. 要诊断梅毒还应做哪项检查

- A. TPPA
- B. 抗-HIV
- C. 抗-HEV

E. 血沉

(124~125 题共用题干)

男, 30 岁。因发热、右侧胸痛、咳嗽 3 天入院。三天来每日体温最低为 39.2°C, 最高 39.8°C。入院后查体: T39.5°C, 发绀, 呼吸音减低, 语颤增强, 右锁骨下可闻及支气管呼吸音。

124. 最可能的诊断是

- A. 肺结核
- B. 肺癌
- C. 胸膜炎
- D. 大叶性肺炎
- E. 自发性气胸合并感染

125. 该患者右上肺叩诊音可能出现

- A. 清音
- B. 浊音
- C. 实音
- D. 鼓音
- E. 过清音

(126~128 题共用题干)

男性, 21 岁, 近半年来反复心悸、胸痛、劳力性呼吸困难, 时有头晕或短暂神志丧失。体检发现: 心脏轻度增大, 心尖部有 2/6 级收缩期杂音和第四心音, 胸骨左缘第 3~4 肋间闻及较粗糙的喷射性收缩期杂音。

126. 最可能的诊断是

- A. 冠心病心绞痛
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 梗阻性肥厚型心肌病
- E. 病毒性心肌炎

127. 最有价值的诊断方法是

- A. 胸部 X 线摄片
- B. 心电图
- C. 超声心动图
- D. 心脏核素检查
- E. 冠状动脉造影

128. 应选用的药物是

- A. 地高辛
- B. 硝酸甘油
- C. 普萘洛尔
- D. 卡托普利
- E. 双氢克尿噻

(129~131 题共用题干)

男, 40 岁。因塌方左腰及下肢被压 8 小时后入院。诉口渴, 尿少、呈暗红色。查体: 脉搏 120 次/分, 血压 95/70mmHg, 左下肢明显肿胀, 皮肤有散在淤血斑及水疱, 足背动脉搏动较健侧弱, 趾端凉, 无骨折征。

129. 诊断首先考虑

- A. 感染性休克
- B. 肾挫伤
- C. 左下肢挫伤
- D. 左下肢血栓形成
- E. 挤压伤综合征

130. 静脉输液宜首选

- A. 全血
- B. 血浆
- C. 右旋糖酐
- D. 等渗盐水加入 1.25%碳酸氢钠溶液
- E. 5%葡萄糖溶液

- A. 镇痛
- B. 左下肢固定
- C. 血液透析
- D. 利尿
- E. 吸氧

(132~134 题共用题干)

女, 45 岁。近 2 个月感口渴, 饮水量增加明显, 达每日 200ml。身高 156cm, 体重 71kg。空腹血糖 180mg/dl (10.0mmol/L), 餐后血糖 252mg/dl (14.0mmol/L)。系初次发现血糖高, 过去无糖尿病史。

132. 给患者的治疗建议是
- A. 饮食及运动治疗
 - B. 双胍类降血糖药
 - C. 磺脲类降血糖药
 - D. α -葡萄糖苷酶抑制剂
 - E. 胰岛素

B1 型选择题 (135~150 题)

(135~136 题共用备选答案)

- A. 氯喹
 - B. 伯氯喹
 - C. 青蒿素
 - D. 奎宁
 - E. 乙胺嘧啶
135. 控制普通型疟疾发作多选用的药物是
136. 预防疟疾复发选用的药物是

(137~138 题共用备选答案)

- A. 格列本脲
- B. 瑞格列奈
- C. 二甲双胍
- D. 胰岛素

133. 按以上建议治疗 3 个月后空腹血糖 153mg/dl (8.5mmol/L)、餐后血糖 225mg/dl (12.5mmol/L)。进一步治疗建议

- A. 阿卡波糖
- B. 格列齐特
- C. 二甲双胍
- D. 氯磺丙脲
- E. 胰岛素

134. 4 年后该患者被发现有浸润型肺结核, 降血糖治疗宜

- A. 原降血糖药增加剂量
- B. 改用降血糖作用更强的口服降血糖药
- C. 增加一种口服降血糖药
- D. 双胍类、磺脲类、 α -葡萄糖苷酶抑制剂联合使用
- E. 胰岛素治疗

E. 普萘洛尔

137. 能抑制肠道对葡萄糖的吸收, 主要用于 2 型糖尿病伴肥胖的药物是
138. 糖尿病伴有严重感染首选的药物是

(139~141 题共用备选答案)

- A. 血 pH 降低, PaCO₂ 降低, [HCO₃⁻] 降低
- B. 血 pH 降低, PaCO₂ 增高, [HCO₃⁻] 增高
- C. 血 pH 升高, PaCO₂ 降低, [HCO₃⁻] 降低
- D. 血 pH 升高, PaCO₂ 增高, [HCO₃⁻] 增高
- E. 血 pH 降低, PaCO₂ 增高, [HCO₃⁻] 降低

139. 失代偿性代谢性酸中毒时

140. 失代偿性代谢性碱中毒时

141. 失代偿性呼吸性酸中毒时

(142~143 题共用备选答案)

- A. 草酸盐结石
 - B. 尿酸结石
 - C. 混合型结石
 - D. 碳酸盐结石
 - E. 磷酸盐结石
142. 腹部平片不显影的结石是
143. 感染性结石的性质是

(144~145 题共用备选答案)

- A. 无痛性肉眼血尿
 - B. 终末血尿伴膀胱刺激症状
 - C. 初始血尿
 - D. 疼痛伴血尿
 - E. 血尿+蛋白尿
144. 泌尿系肿瘤血尿是
145. 泌尿系结石血尿是

(146~147 题共用备选答案)

- A. 肺部体征出现较早, 易引起肺脓肿、肺大疱
 - B. 体温一般不高, 喘憋为主, 肺部听诊有哮鸣音
 - C. 多为稽留热, 肺部体征出现晚
 - D. 嗜酸细胞增高
 - E. X 线检查示肺部片状阴影, 呈云雾状或游走性
146. 金黄色葡萄球菌肺炎的主要临床特点是
147. 腺病毒肺炎可出现

(148~150 题共用备选答案)

- A. 抗组蛋白抗体
 - B. 抗 Sm 抗体
 - C. 抗 SSB 抗体
 - D. 抗 SCl-70 抗体
 - E. 抗 Jo-1 抗体
148. SLE 的标志性抗体
149. 干燥综合症的标志性抗体
150. 多发性皮肌炎的特异性抗体

第三单元

A1 型选择题 (1~49 题)

- 急性阑尾炎手术后尿潴留, 下列处理措施首选
 - 耻骨上膀胱穿刺
 - 无菌导尿后拔除尿管
 - 协助起床, 试行自行排尿
 - 应用利尿剂
 - 留置导尿 4~5 天
- 休克指数的计算方法是
 - 脉率与脉压之比
 - 脉率与舒张压之比
 - 收缩压与舒张压之比
 - 心率与舒张压之比
 - 脉率与收缩压之比
- 关于破伤风, 正确的描述是
 - 颈部肌肉强烈收缩最早出现
 - 光线不能诱发全身肌肉抽搐
 - 严重者神志不清
 - 可出现尿潴留
 - 不会发生骨折
- 淋巴瘤最有诊断意义的临床表现
 - 肝脾大
 - 长期周期性发热
 - 盗汗、体重减轻
 - 无痛性淋巴结肿大
 - 局限性淋巴结肿大并有粘连
- 易引起二重感染的主要原因是
 - 联合使用抗菌药物
 - 使用免疫抑制剂
 - 营养不良
 - 全身免疫力降低
- 霍乱患者泻吐期临床特点不包括
 - 多数以剧烈腹泻开始, 继以呕吐
 - 多数腹泻伴有里急后重
 - 大便每日数次至十数次或无法计数
 - 粪便以黄水便或清水便为多
 - 粪便有鱼腥味, 镜检无脓细胞
- 急性心肌梗死溶栓治疗中最常用的溶栓剂是
 - 肝素
 - 尿激酶
 - 去纤酶
 - 蝮蛇抗栓酶
 - 阿司匹林
- 应激性溃疡发病基础不包括
 - 重度烧伤
 - 慢性胃炎
 - 颅内手术
 - 重度创伤
 - 脓毒血症
- 结肠癌最早出现的临床症状是
 - 腹部肿块
 - 全身症状如贫血、消瘦、低热等
 - 肠梗阻症状
 - 排便习惯和粪便性状的改变
 - 阵发性绞痛

10. 关于肝性脑病的氨代谢，下述哪项不正确
- A. 大多数门腔分流术患者血氨及脑脊液中氨含量都增高
 - B. 暴发性肝功能衰竭时血氨往往明显增高
 - C. 动脉血和脑脊液中氨含量明显相关
 - D. 便秘时会引起血氨增高
 - E. 结肠呈碱性环境时产氨增多

11. 慢性阻塞性肺疾病的体征不包括
- A. 呼吸音减弱
 - B. 支气管呼吸音
 - C. 心音遥远
 - D. 桶状胸
 - E. 呼气相延长

12. 急性阑尾炎手术治疗后最常见的并发症是
- A. 阑尾残株炎
 - B. 粘连性肠梗阻
 - C. 切口感染
 - D. 出血
 - E. 粪瘘

13. 确诊系统性红斑狼疮最有价值的自身抗体是
- A. ANA
 - B. 抗SSB抗体
 - C. 抗RNP抗体
 - D. 抗SSA抗体
 - E. 抗dsDNA抗体

14. 原发性肝癌早期转移途径为
- A. 肺内转移
 - B. 淋巴转移
 - C. 直接浸润转移
 - D. 肝内进行转移

15. 慢性再生障碍性贫血病人最常见的感染是
- A. 败血症
 - B. 肠道感染
 - C. 尿路感染
 - D. 上呼吸道感染
 - E. 皮肤感染

16. 支气管哮喘急性发作患者，提示病情危重的情况是
- A. 三凹征
 - B. 双肺满布哮鸣音
 - C. 胸部X线片示肺充气过度
 - D. 呼气峰流速（PEF）显著下降
 - E. PaCO₂增高

17. 直肠指检不易发现的病变是
- A. 肛瘘
 - B. 直肠息肉
 - C. 内痔
 - D. 肛管直肠癌
 - E. 盆腔脓肿

18. 除有关节肿痛外，对类风湿关节炎诊断最有意义的表现
- A. 足跟、足掌部位痛
 - B. 关节隆起部与受压部皮下出现无痛性结节
 - C. 弥漫性肺间质病变
 - D. 胸腔积液（糖含量正常）
 - E. 小腿痛性皮下结节

19. 霍乱的传播途径不包括
- A. 空气传播
 - B. 蚊虫叮咬
 - C. 水
 - D. 食物

20. 某患者血气分析显示 $\text{PaCO}_2 > 45\text{mmHg}$, $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 。对该结果发生机制的解释正确的是

- A. 阻塞性通气功能障碍
- B. 肺脏生理无效腔减少
- C. 弥散功能障碍
- D. 限制性通气功能障碍
- E. 肺泡通气量下降

21. 早期胃癌是指

- A. 侵及黏膜下层及肌层的癌
- B. 直径小于 2cm 的癌
- C. 无局部淋巴结转移的癌
- D. 癌灶局限于黏膜层及黏膜下层
- E. 无临床症状的癌

22. 近年来输血后肝炎主要由哪种病毒引起

- A. 甲型肝炎病毒
- B. 乙型肝炎病毒
- C. 丙型肝炎病毒
- D. 戊型肝炎病毒
- E. 丁型肝炎病毒

23. 嵌顿性疝和绞窄性疝的主要区别是

- A. 时间长短
- B. 肠系膜动脉的搏动与否
- C. 局部是否疼痛
- D. 是否出现肠梗阻
- E. 疝的大小

24. 细菌性肝脓肿最主要的原因是

- A. 膈下脓肿蔓延
- B. 开放性肝脏损伤
- C. 化脓性门静脉炎
- D. 脓毒症

25. 代谢性酸中毒在没有发展到循环衰竭程度时, 首选治疗应该是

- A. 使用碳酸氢钠
- B. 使用乳酸钠
- C. 使用枸橼酸钾
- D. 使用三羟甲基氨基甲烷
- E. 实施病因治疗

26. 下列哪项可用于流行性乙型脑炎早期诊断

- A. 补体结合试验
- B. 血凝抑制试验
- C. 中和试验
- D. 特异性 IgM 抗体检测
- E. 病毒分离

27. 克罗恩病的最常见的并发症是

- A. 中毒性休克
- B. 结肠大出血
- C. 肠梗阻
- D. 急性肠穿孔
- E. 癌变

28. 缺铁性贫血的血象特点是

- A. RBC 减少比 Hb 减少明显
- B. 粒细胞分叶多
- C. $\text{MCH} = 32\text{pg}$
- D. 红细胞中央淡染区大
- E. 粒细胞左移

29. 急性糜烂性胃炎的确诊应依据

- A. X 线胃肠钡餐检查
- B. 胃液分析
- C. 上消化道出血的临床表现
- D. 急诊胃镜检查
- E. 腹部 B 超

30. 下列各项中错误的是

- A. 恶性肿瘤可以直接侵犯邻近的脏器
- B. 恶性肿瘤都是区域淋巴结转移
- C. 胃癌可种植到盆腔
- D. 结肠癌可转移到肝脏
- E. 乳癌可血行转移至骨骼

31. 直肠指检可触及条索状物，挤压时条索状物的肛旁端有脓性分泌物流出。最可能的诊断是

- A. 肛痿
- B. 内痔
- C. 外痔
- D. 直肠癌
- E. 直肠息肉

32. 择期手术患者，手术前需要进行特殊准备的是

- A. 血红蛋白 120g/L
- B. 空腹血糖 5.6mmol/L
- C. 血压 160/100mmHg
- D. 血小板 $100 \times 10^9/L$
- E. 白细胞 $7.0 \times 10^9/L$

33. 肠外营养时，使用大量高渗葡萄糖作为单一的能源会引起

- A. 糖异生活跃
- B. 静息能量消耗降低
- C. 肝脏脂肪浸润
- D. 去甲肾上腺素分泌减少
- E. 蛋白质分解减少

34. 诊断胎儿遗传性疾病，准确性较差的产前诊断技术

- A. 孕妇血提取胎儿细胞

C. 胎儿镜下活检

- D. 经皮脐血穿刺技术
- E. 绒毛穿刺取样

35. 直接调节甲状腺素产生与分泌的激素是

- A. 糖皮质激素
- B. 促甲状腺激素
- C. 甲状旁腺素
- D. 降钙素
- E. 甲状腺球蛋白

36. 切口“乙级愈合”的表现不包括

- A. 积液
- B. 红肿
- C. 血肿
- D. 硬结
- E. 化脓

37. 按手术期限，下列属于限期手术的是

- A. 慢性阑尾炎切除术
- B. 直肠癌根治术
- C. 完全性肠梗阻造瘘术
- D. 可复性股疝修补术
- E. 急性上消化道穿孔修补术

38. 关于急性中毒的治疗原则，不正确的是

- A. 酸性毒物污染皮肤、黏膜后应用碱性液体冲洗、中和
- B. 立即终止接触毒物
- C. 迅速清除进入体内已经被吸收或尚未被吸收的毒物
- D. 及早使用特效药解毒剂和拮抗剂
- E. 根据患者不同情况进行对症治疗

39. 胃大部切除术后发生残胃癌至少是几年后

- B. 5年
- C. 10年
- D. 15年
- E. 30年

40. 对诊断消化性溃疡穿孔最有价值的临床表现是

- A. 突发上腹部剧痛
- B. 腹式呼吸消失
- C. 上腹部压痛明显
- D. 上腹部有反跳痛
- E. 肝浊音界消失

41. 行胃高选择性迷走神经切断术时，作为保留分支标志的是其

- A. 胃前支
- B. 胃后支
- C. 肝胆支
- D. “鸦爪”支
- E. 腹腔支

42. 恶性程度最高的乳癌类型是

- A. 浸润性导管癌
- B. 浸润性小叶癌
- C. 湿疹样癌
- D. 炎性乳癌
- E. 髓样癌

43. 择期胃手术1周后腹胀、肠鸣音减弱或无、反复呕吐，首先应采取

- A. 做胃镜检查，查明原因
- B. 胃肠减压、支持治疗
- C. 剖腹检查，解除梗阻
- D. 输液、补钾
- E. 肌注阿托品

44. 食管癌的典型症状是

- A. 胸骨后烧灼感
- B. 食管内异物感
- C. 咽下食物哽噎感
- D. 咽下食物停滞感
- E. 进行性吞咽困难

45. B型胃炎主要是由下列哪个原因引起

- A. 幽门螺杆菌感染
- B. 胆汁反流
- C. 消食药物
- D. 吸烟
- E. 酒癖

46. 当阑尾血运障碍时，易导致其坏死的解剖学特点是

- A. 阑尾淋巴组织丰富
- B. 阑尾体积小
- C. 阑尾动脉为无侧支终末动脉
- D. 阑尾腔小
- E. 阑尾开口小

47. 处理下肢大隐静脉曲张的根本办法是

- A. 穿弹力袜或用弹力绷带
- B. 硬化剂注射和压迫疗法
- C. 高位结扎和抽剥大隐静脉，并结扎功能不全的交通静脉
- D. 内科药物治疗
- E. 仅行静脉瓣膜修复术

48. 下列各种脑脊液的变化中，单独存在即可确诊化脓性脑膜炎并发脑室管膜炎的是

- A. 白细胞 $>50 \times 10^6/L$
- B. 糖 $<1.6mmol/L$
- C. 蛋白定量 $>400mg/L$

E. 细菌培养、涂片阳性，与腰穿脑脊液检查结果一致

49. 甲状腺功能亢进症患者的手术禁忌证是

A. 中度 Graves 病

B. 胸骨后甲状腺肿伴甲亢

C. 高功能腺瘤

D. 妊娠早期重度甲亢

E. 青少年患者

A2 型选择题 (50~106 题)

50. 男孩，3 岁。面色苍黄 1 个月，易疲乏，食欲减退。体检：肝肋下 3cm，质中，脾肋下 1.5cm 查血常规：Hb 83g/L，RBC $2.28 \times 10^{12}/L$ ，MCV 97fl，MCH 36pg，MCHC 36%。最可能的诊断是

A. 溶血性贫血

B. 再生障碍性贫血

C. 缺铁性贫血

D. 巨幼细胞贫血

E. 感染性贫血

51. 男，30 岁。排便次数增多、大便带血 1 个月。无腹痛、发热，无体重变化。查体：T 36.5°C，P80 次/分，R18 次/分，BP 120/80mmHg。浅表淋巴结未触及。双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐。腹软，无压痛，肝脾肋下未触及。直肠指检：触及一个柔软光滑有蒂包块，直径约 1cm，指套带血。最可能诊断是

A. 结肠癌

B. 直肠息肉

C. 血栓性外痔

D. 肛窦炎

E. 直肠癌

52. 女，35 岁。间断黏液脓血便 2 年，伴里急后重，大便每天 3 次，反复应用多种抗生素治疗，症状无明显缓解，最有可能诊断的是

A. 慢性细菌性痢疾

B. 阿米巴痢疾

C. 肠伤寒

D. 溃疡性结肠炎

E. 肠易激综合征

53. 女，11 岁。食蚕豆后突感畏寒、发热、皮肤发黄。辅助检查：血红蛋白 68g/L，网织红细胞 0.20，尿胆原阳性，胆红素阴性。对明确诊断最重要的检查是

A. 血总胆红素测定

B. 酸化血清溶血试验

C. 抗人球蛋白试验

D. G-6-PD 活性测定

E. 高铁血红蛋白还原试验

54. 一职工从沿海城市归来，腹泻 1 天，10 余次，水样便，到市医院求治，疑为肠炎，后粪便培养出 E1-Tor 型细菌。诊断后 11 小时医师上报疫情，国家要求上报此类传染病最迟不超过

A. 2 小时

B. 6 小时

C. 12 小时

D. 24 小时

E. 48 小时

55. 男，70 岁。右腹股沟区肿块 3 年，平卧消失。查体：右耻骨结节外上方有一半球形

沟韧带中点上方咳嗽时仍可见肿块突出。最可能的诊断是

- A. 股疝
- B. 腹股沟斜疝
- C. 腹股沟直疝
- D. 精索鞘膜积液
- E. 交通性鞘膜积液

56. 女, 30 岁。肛周疼痛 3 天, 排便时加重。查体: 肛门左侧局部压痛, 有波动感。血 WBC $11.9 \times 10^9/L$ 。首选的治疗方法是

- A. 广谱抗生素静脉滴注
- B. 高锰酸钾坐浴
- C. 对症镇痛、镇静
- D. 手术切开引流
- E. 肛门应用吲哚美辛栓

57. 男, 50 岁。乙型肝炎病史 10 年。近 3 个月肝区胀痛不适, CT 检查: 肝右叶 5cm 占位性病变。为进一步明确性质应首选检测

- A. CA19-9
- B. 甲胎蛋白
- C. 癌胚抗原
- D. CA15-3
- E. 碱性磷酸酶

58. 女, 6 岁。诊断为单纯肾病综合征, 病程突发腰痛, 尿呈洗肉水, 最可能是

- A. 泌尿道感染
- B. 肾结石
- C. 肾静脉血栓形成
- D. 电解质紊乱
- E. 肾衰竭

59. 男, 34 岁。腹部砸伤 4 小时。查体: 四肢

浊音, 肠鸣音消失。该病人目前应进行的处理不包括

- A. 诊断性腹腔穿刺
- B. 密切监测基本生命体征
- C. 补充血容量, 抗休克治疗
- D. 给予镇痛和镇静剂
- E. 抗感染治疗

60. 女, 30 岁。面色苍白、乏力 1 年, 皮肤出血点 2 周。查体: 神志清, 巩膜轻度黄染, 肝肋下未触及, 脾肋下 2cm。血常规: Hb 60g/L, RBC $1.8 \times 10^{12}/L$, WBC $4.6 \times 10^9/L$, Plt $12 \times 10^9/L$, Ret 0.12。Coombs 试验 (+)。尿 Rous 试验 (-)。骨髓细胞学检查: 红系、巨核系明显增生, 全片见巨核细胞 96 个, 未见产板型巨核细胞。最可能的诊断是

- A. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症
- B. Evans 综合征
- C. 巨幼细胞贫血
- D. 血栓性血小板减少性紫癜
- E. 弥散性血管内凝血

61. 一患者坚信他的思想变成了声音, 不仅自己听见了, 坚信别人也听见了, 这是

- A. 思维被广播
- B. 读心症
- C. 思维扩散
- D. 被洞悉感
- E. 思维化声

62. 女, 26 岁。右下腹痛, 腹泻三个月, 伴低热, 结肠镜检查在回盲部见环形溃疡。X 线钡剂结肠造影可见回盲部“跳跃征”。最可能诊断的是

A. 溃疡性结肠炎

- B. 肠淋巴瘤
- C. 肠结核
- D. 克罗恩病
- E. 阿米巴肠病

63. 男, 72 岁。突发头痛 10 小时, 昏迷 8 小时。头颅 CT: 右颞叶出血, 1 小时来呕暗红色血 2 次, 共约 350ml, 无慢性肝病史。最可能的呕血原因是

- A. 急性胃黏膜病变
- B. 胃癌
- C. 十二指肠溃疡
- D. 贲门黏膜撕裂
- E. 食管胃底静脉曲张破裂

64. 女, 29 岁, 反复发作脓血便, 伴膝关节疼痛, 多次细菌培养阴性, X 线钡剂检查示乙状结肠袋消失, 管壁平滑变硬, 肠管缩短, 肠腔狭窄, 下列哪种诊断可能性大

- A. Crohn 病
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 结肠过敏
- D. 肠结核
- E. 慢性细菌性痢疾

65. 男, 45 岁。间断头晕 1 月余。1 个月前在一次情绪激动后自觉头晕, 休息后缓解, 当时测血压 150/95mmHg, 自测血压有时增高, 有时正常。建议采取的措施为

- A. 进行低或中等强度的等张运动
- B. 每日食盐量不少于 6g
- C. 膳食中脂肪量控制在总热量的 50% 以下
- D. 体质指数控制在 $26\text{kg}/\text{m}^2$ 以内
- E. 减少体育锻炼

水肿, 给予利尿剂治疗, 数日后出现腹胀、乏力, 心音低钝, 膝反射减弱, 心电图出现 U 波。治疗中需及时补充

- A. 钠盐
- B. 钾盐
- C. 钙剂
- D. 镁剂
- E. 维生素 B₁

67. 男, 53 岁。右季肋部胀痛 1 月余。查体: 无黄疸, 肝肋下 3cm, 质硬, 无腹水征。B 超示肝右叶低回声病灶, 约 11cm, 肝左叶见多个小低回声区。AFP > 1000 $\mu\text{g}/\text{L}$ 。最佳的治疗措施是

- A. 放射治疗
- B. 抗感染治疗
- C. 肝动脉插管栓塞化疗
- D. 剖腹探查
- E. 中草药治疗

68. 男, 65 岁。皮肤巩膜黄染进行性加重 1 个月来诊, 自述尿色深黄, 粪便灰白色, 查体: 扪诊胆囊无肿大, Murphy 征阴性, 腹部未扪及肿块, 诊断首先考虑为

- A. 胰头癌
- B. 胆总管下端癌
- C. 乏特壶腹癌
- D. 肝门部胆管癌
- E. 十二指肠腺癌

69. 女, 30 岁。停经 12 周, 阴道不规则流血 3 天, 下腹隐痛。妇科检查: 宫底平脐, 质软, 未触及胎体, 未闻及胎心。尿妊娠试验阳性。应首先考虑的诊断是

▲ 执业医师

- B. 稽留流产
- C. 死胎
- D. 羊水过多
- E. 葡萄胎

70. 男, 50 岁。胃窦癌行根治性胃大部切除术后 2 年, 因上腹疼痛不适, 进食后饱胀, 消瘦、贫血入院。钡餐检查: 胃空肠吻合口处有充盈缺损和狭窄, 最可能的诊断是

- A. 残胃癌
- B. 胃癌复发
- C. 碱液反流性胃炎
- D. 吻合口消化性溃疡
- E. 吻合口炎症水肿

71. 男, 33 岁。有溃疡性结肠炎病史, 1 天前又出现高热伴明显腹胀。查体: 腹膨隆, 明显压痛和反跳痛, 肠鸣音减弱。X 线腹部平片可见结肠扩张, 结肠袋形消失。此患者最可能出现了下列哪种情况

- A. 结核性腹膜炎
- B. 自发性腹膜炎
- C. 中毒性巨结肠
- D. 肠穿孔
- E. 肠梗阻

72. 男, 20 岁。腰痛 3 年, 膝关节痛 2 个月。查体: 右膝肿胀、压痛, 浮髌试验阴性。实验室检查: 血尿酸正常, HLA-B27 阳性。X 线检查: 双侧骶髂关节骨侵蚀改变, 伴间隙狭窄。最可能的诊断是

- A. 痛风性关节炎
- B. 反应性关节炎
- C. 强直性脊柱炎
- D. 银屑病关节炎

E. 感染性关节炎

73. 肺组织切片检查, 光镜下见细支气管上皮脱落, 腔内及周围肺泡腔内亦有多少不等的脓性渗出物, 应诊断为

- A. 慢性肺淤血
- B. 大叶性肺炎灰色肝样变期
- C. 小叶性肺炎
- D. 大叶性肺炎溶解消散期
- E. 肺结核变质渗出期

74. 女, 21 岁。3 天来左膝关节肿胀。自幼于外伤后易出血不止。查体: 皮肤、黏膜未见出血及紫癜。凝血功能检查: 出血时间 1 分钟, 凝血时间 35 分钟, 凝血酶原时间正常。疾病分类应为

- A. 纤维蛋白生成障碍
- B. 凝血酶生成障碍
- C. 血小板异常
- D. 凝血活酶生成障碍
- E. 血管壁功能异常

75. 40 岁男性患者, 前胸部被撞伤, X 线检查可见左第 9、10 肋骨骨折, 2 天后突发休克, 最可能的原因是

- A. 气胸
- B. 肝破裂
- C. 脾破裂
- D. 胃破裂
- E. 结肠破裂

76. 男, 57 岁。咳嗽、咯血 2 天, 突发呼吸困难 1 小时。血 D-二聚体明显升高, 心电图见 SIQIII 波群, 确诊为急性肺栓塞, 经 rt-PA 50mg 溶栓治疗后症状改善。此时应采取的

- A. 口服华法林
- B. 皮下注射低分子肝素
- C. 口服氯吡格雷
- D. 维持 rt-PA 静脉注射
- E. 口服阿司匹林

77. 男, 35 岁。因胃癌入院手术, 注红细胞 2U 及新鲜冷冻血浆, 在输血开始后 4 小时, 患者突然气急、呼吸困难, 迅速出现呼吸衰竭。查体: T37°C, P98 次/分, R28 次/分, 血压 120/70mmHg。该患者出现的输血反应最可能的是

- A. 循环超负荷
- B. 细菌性反应
- C. 急性溶血反应
- D. 过敏反应
- E. 输血相关急性肺损伤

78. 男, 34 岁。上腹灼痛 3 个月, 柏油样便 2 日。为确诊首选检查是

- A. X 线钡餐透视
- B. 大便潜血试验
- C. 血常规
- D. 胃镜
- E. B 超

79. 男, 29 岁。阑尾切除术后 1 天出现烦躁、剧烈腹痛。查体: 心率 112 次/分, 血压 90/60mmHg, 腹胀, 全腹压痛, 肠鸣音弱, 为除外腹腔内出血。首要的检查是

- A. B 超
- B. CT
- C. MRI
- D. 腹腔穿刺
- E. 六位腹平片

80. 女, 54 岁。肝硬化 20 年。腹部 B 超检查: 腹水最大液深 18cm。化验检查: 血清钠 142mmol/L, 钾 6.3mmol/L, BUN23mmol/L, 血肌酐 224 μ mol/L。治疗措施错误的是

- A. 10%葡萄糖酸钙 20ml 缓慢静脉注射
- B. 口服螺内酯
- C. 输白蛋白
- D. 控制液体入量
- E. 葡萄糖加胰岛素静点

81. 女, 26 岁。妊娠 16 周, 心慌、怕热、多汗、易饿 4 周。查体: BP130/60mmHg, 中等体型, 皮肤潮红, 手有细颤, 轻度突眼, 甲状腺弥漫性 II 度肿大, 血管杂音(+), 心率 110 次/分。血 TSH 0.005 (正常范围 0.27~4.20) μ IU/ml, FT₃13.34 (正常范围 2.0~4.4) pg/ml, FT₄5.18 (正常范围 0.93~1.70) ng/dl。诊断为妊娠合并甲状腺功能亢进症。甲亢的治疗选用

- A. 甲状腺大部切除术
- B. 放射性核素 ¹³¹I
- C. 丙硫氧嘧啶
- D. 大剂量普萘洛尔
- E. 复方碘溶液

82. 女, 28 岁, 经产妇。曾足月分娩 2 次。月经周期正常, 经量中等。查阴道前后壁明显膨出, 重度颗粒型宫颈糜烂, 宫口松, 子宫后倾, 正常大, 附件未见异常。患者要求避孕, 最合适的避孕方法是

- A. 口服短效避孕药
- B. 阴茎套避孕
- C. 外用避孕药
- D. 宫内节育器
- E. 安全期避孕

83. 男, 70 岁。右腹股沟区可复性肿物 15 年。查体: P84 次/分, R20 次/分, BP160/110mmHg。糖尿病病史 7 年, 口服降糖药治疗, 空腹血糖近 1 个月来维持在 6.2~9.0mmol/L。吸烟 20 余年, 20~30 支/日。欲行右腹股沟无张力疝修补术, 围手术期处理错误的是

- A. 术前戒烟 2 周
- B. 练习床上排便
- C. 术前应用胰岛素降低血糖
- D. 术前禁食 12 小时
- E. 口服降压药控制血压

84. 女, 2 岁。面色苍白 2 个月, 易疲乏, 时而烦躁, 纳差。体检: 肝肋下 3cm, 质中, 脾肋下 1.5cm。查血常规: Hb 86g/L, RBC $3.45 \times 10^{12}/L$, MCV 68fl, MCH 20pg, MCHC26%。最可能的诊断是

- A. 叶酸缺乏性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. VitB₁₂ 缺乏性贫血
- E. 生理性贫血

85. 女, 35 岁。与家人吵架后服美曲膦酯 100ml, 30 分钟后被急送医院。查体: 昏迷状态, 呼吸困难, 皮肤湿冷, 瞳孔如针尖大小。正确的紧急处理是

- A. 气管插管气道保护后硫磺铜溶液洗胃+导泻
- B. 直接应用大量生理盐水洗胃+导泻
- C. 直接应用硫酸铜溶液洗胃+导泻
- D. 气管插管气道保护后 2%碳酸氢钠溶液洗胃
- E. 气管插管气道保护后应用大量温水洗胃+导泻

欲缺乏、腹胀, 无腹痛, 近 5 天大便发白, 陶土样, 尿呈浓茶样。查体: 巩膜、皮肤黄染, 可触及肿大胆囊, 无压痛。首选的影像学检查是

- A. 内镜逆行性胰胆管造影
- B. 经皮肝穿刺胆道造影
- C. 腹部 B 超
- D. 磁共振胰胆管成像
- E. 静脉胆道造影

87. 男, 65 岁。上腹部无规律性隐痛 2 个月, 因饮酒后呕咖啡样物 150ml, 柏油便 300ml 来诊, 无肝病史。查体: 血压 90/60mmHg, 脉搏 100 次/分, 血红蛋白 90g/L, 上腹部轻度压痛, 肝脾肋下未触及。其止血措施最好选择

- A. 维生素 K₁ 静脉滴注
- B. 奥美拉唑静脉注射
- C. 氨基己酸静脉滴注
- D. 三腔二囊管压迫
- E. 垂体后叶素静脉滴注

88. 男, 29 岁, 农民。突起发热, 伴头痛、眼眶痛、腰痛。病程第 4 日就诊时热已退, 血压偏低, 球结膜水肿、出血, 胸背部见条索点状瘀点。前一日 24 小时尿量 300ml。该病例最可能的诊断是

- A. 败血症
- B. 血小板减少性紫癜
- C. 肾综合征出血热
- D. 钩体病
- E. 急性肾小球肾炎

89. 女, 31 岁。结婚 5 年未孕, 月经规律。妇科检查: 子宫正常大小, 双侧附件正常。男方

精液检查正常。本例应首先进行

90. 女, 58 岁。进行性黄疸 15 天。平素体

- A. 阴道脱落细胞学检查
- B. 输卵管通畅检查
- C. 宫颈黏液结晶
- D. 子宫内膜病理检查
- E. 子宫输卵管造影

90. 男, 29 岁。12 小时前不洁饮食, 出现反复大量呕吐, 最可能出现的水电解质失调是

- A. 等渗性缺水
- B. 低镁血症
- C. 高渗性缺水
- D. 稀释性低钠血症
- E. 高钾血症

91. 男, 32 岁。十二指肠溃疡病史 1 年, 口服药物治疗。因 12 小时前呕吐鲜血来诊。BP80/50mmHg, 输血 1000ml 后, 血压仍有波动。查体: 贫血貌, 腹软, 剑突下压痛。此患者最适宜的治疗方法是

- A. 快速补液、输血
- B. 静脉注射止血药
- C. 胃镜电凝止血
- D. 急诊剖腹手术
- E. 应用血管活性药物

92. 女婴, 1 岁, 外阴部红肿、阴道脓性分泌物 1 周, 同时神萎、哭吵不安。可能的诊断为

- A. 淋病
- B. 霉菌性阴道炎
- C. 非特异性阴道炎
- D. 衣原体阴道炎
- E. 滴虫性阴道炎

93. 男, 49 岁。寒战、高热伴肝区疼痛半个月。

既往体健。查体: T38.5°C, P110 次/分

肝区叩击痛阳性。血常规: WBC $16 \times 10^9/L$, N0.89。B 超示肝左叶 10cm \times 7cm 液性暗区。最可能的诊断是

- A. 肝血管瘤
- B. 肝癌
- C. 细菌性肝脓肿
- D. 肝囊肿
- E. 肝包虫病

94. 女, 26 岁。结婚 3 年未孕, 月经周期素来正常, 做宫颈黏液涂片检查, 见大量椭圆体结晶, 判断此时应为月经周期的第几天

- A. 第 3~5 天
- B. 第 10~12 天
- C. 第 14~15 天
- D. 第 18~20 天
- E. 第 22~27 天

95. 男, 20 岁。3 天前患感冒后发热 38°C, 左侧胸部刺痛。查体: 左腋下, 左下胸可听到胸膜摩擦音。最合适的诊断是

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 葡萄球菌肺炎
- C. 癌性胸膜炎
- D. 干性胸膜炎
- E. 渗出性胸膜炎

96. 女, 48 岁。发热伴对称性多关节肿痛, 晨僵 3 个月, 查抗核抗体 (ANA) 低效价阳性, RF (+), IgG 和补体升高。最可能的诊断是

- A. 多发性肌炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 类风湿关节炎
- D. 干燥综合征
- E. 混合性结缔组织病

E. 混合性结缔组织病

97. 男, 38 岁。突然呕血 1 天。呕吐物为血混有食物, 共 4 次, 每次约 100ml, 伴头晕。既往消化性溃疡病史 6 年。查体: P110 次/分, BP100/70mmHg, 贫血貌, 巩膜无黄染, 腹平软, 无压痛, 未触及包块。腹水征 (-)。临床确定出血部位应特别注意检查

- A. 贲门部和十二指肠前壁
- B. 胃底部和十二指肠球后壁
- C. 胃小弯和十二指肠后壁
- D. 幽门和十二指肠前壁
- E. 胃大弯和十二指肠侧壁

98. 女, 49 岁, 于 2 年前曾行胆总管探查取石, T 形管引流术, 术后至今先后发作性右上腹绞痛, 黄疸 4 次, 每次均经消炎疗法而愈。此次又发作性疼痛, 黄疸, 肝大肋下 2cm, 血清胆红素为 20mmol/L, BUS 显示直径为 1.0cm, 为进一步诊断应采用何种方法

- A. PTC
- B. ERCP
- C. 低张性十二指肠造影
- D. MRI
- E. 静脉法胆道造影

99. 女, 48 岁。肝炎肝硬化 8 年, 近 2 个月腹围明显增大, 1 周来少尿, 血肌酐升高, 无腹痛及发热, CT 提示肝硬化腹水, AFP 及血常规正常, 最可能的情况是

- A. 肝癌
- B. 肝炎活动
- C. 肝肾综合征
- D. 腹膜转移癌
- E. 原发性胸膜炎

前能进半流食。胃镜检查: 食管距门齿 20cm 处发现一长约 6cm 菜花样肿物, 病理报告为鳞状细胞癌。其最佳治疗方法为

- A. 食管癌根治术
- B. 姑息食管癌切除术
- C. 化疗
- D. 胃造瘘术
- E. 放疗

101. 男, 29 岁。排便时肛门剧痛 1 周。有鲜血滴入便池, 排便后肛门疼痛加重。造成便后肛门疼痛加重的机制是

- A. 截石位的 12 点处神经敏感
- B. 肛门括约肌痉挛
- C. 肛管皮肤全层裂开并形成慢性溃疡
- D. 粪便干燥, 排使用力过度
- E. 继发肛窦炎

102. 25 岁女性, 原发不育, 月经量减少 1 年, 诊断性刮宫未发现异常。妇科检查子宫稍小, 活动欠佳, 双侧可触及腊肠样不规则包块, 质硬。本例最可能的诊断是

- A. 子宫内膜异位症
- B. 慢性盆腔炎
- C. 卵巢肿瘤
- D. 输卵管结核
- E. 月经失调

103. 男, 45 岁。左右腿车轮碾压伤 2 小时。查体: T37.2°C, P145 次/分, R28 次/分, BP89/55mmHg。神情淡漠, 面色苍白, 口唇干燥。两肺呼吸音清。腹软, 无压痛。左小腿中部开放性外伤, 伤口近端在院外已用止血带缚扎 30 分钟, 伤口无明显渗血。足背动脉搏动

100. 男, 75 岁。进行性吞咽困难 2 月余。口

弱。此时该患者处理措施中错误的

- A. 补充血容量
- B. 放开止血带，以免远端肢体缺血
- C. 做好术前准备，急诊手术
- D. 备血
- E. 中心静脉置管

104. 男，35岁，温度计厂工人。主诉：易激动、易怒（提示情感障碍）；2年前有唇、手指等细小震颤，现发展到全身震颤，并出现书写震颤，有口腔炎反复发作。该病人的可能诊断为

- A. 汞中毒
- B. 铅中毒
- C. 苯中毒
- D. 镉中毒
- E. 砷中毒

105. 女，25岁。间断牙龈出血、皮肤瘀斑2个月，反复发生口腔溃疡。查体：双下肢和腹部散在瘀斑，浅表淋巴结无肿大，巩膜无黄染，腹软，肝肋下未触及，脾肋下刚可触及。化验：

Hb121g/L, WBC $4.5 \times 10^9/L$, PLT $25 \times 10^9/L$ 。为除外继发免疫性血小板减少性紫癜，最重要的检查是

- A. 血小板功能
- B. 血小板抗体
- C. 抗核抗体谱
- D. 腹部B超
- E. 胸部X线片

106. 男性，40岁，发热伴鼻出血1周。检查牙龈肿胀，肝脾轻度肿大；血红蛋白40g/L，白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $15 \times 10^9/L$ ，骨髓象原始细胞占60%，过氧化物酶染色阳性，非特异性酯酶阳性，阳性反应可被氟化钠抑制，应诊断为

- A. 急性粒细胞性白血病
- B. 急性早幼粒细胞白血病
- C. 急性淋巴细胞性白血病
- D. 急性红白血病
- E. 急性单核细胞性白血病

A3/A4型选择题（107~135题）

（107~108题共用题干）

女，68岁。下腹痛、腹泻半年，呈隐痛，无明确定位，近2月来感乏力，便中带血，入院检查。查体：口唇面色苍白，右下腹压痛，可触及5cm×3cm，边界欠清的包块，质地硬，轻压痛，Hb78g/L。

107. 为明确诊断，最有价值的检查方法是

- A. 纤维结肠镜检查
- B. 大便潜血试验
- C. 钡剂灌肠检查
- D. 直肠指诊

E. CEA测定

108. 该患者最可能的诊断是

- A. 结肠息肉
- B. 结肠癌
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 肠结核
- E. 肠梗阻

（109~110题共用题干）

男，22岁。因黑粪1天来诊。既往无胃病及肝病史。查体：面色稍苍白，BP100/60mmHg

109. 最可能的诊断是

- A. 食管静脉曲张破裂出血
- B. 十二指肠溃疡并发出血
- C. 胃癌出血
- D. Zollinger-Ellison 综合征并发出血
- E. 食管贲门撕裂综合征

110. 药物治疗首选

- A. 质子泵抑制剂
- B. 硫糖铝
- C. 生长抑素制剂
- D. 枸橼酸铋钾
- E. 米索前列醇

(111~112 题共用题干)

女, 37 岁。患胆囊结石 6 年。饱餐后持续上腹疼痛 12 小时, 向腰背部放射, 伴恶心、呕吐、发热。查体: 上腹明显压痛, 莫菲征阴性, 肋脊角无压痛、叩痛。

111. 诊断首先考虑为

- A. 急性胃炎
- B. 泌尿系结石
- C. 消化性溃疡
- D. 肠梗阻
- E. 急性胰腺炎

112. 首选下列哪项检查

- A. 胃镜
- B. 尿常规
- C. 血脂肪酶
- D. 血淀粉酶
- E. X 线钡餐检查

(113~114 题共用题干)

气, 偶有吞咽不畅。口服奥美拉唑治疗 2 周后疼痛缓解。

113. 应首先考虑的诊断是

- A. 消化性溃疡
- B. 食管癌
- C. 心绞痛
- D. 贲门失弛缓综合征
- E. 胃食管反流病

114. 目前首选的检查是

- A. 心电图
- B. 冠状动脉造影
- C. 胃镜
- D. 24 小时食管 pH 监测
- E. 超声心动图

(115~116 题共用题干)

男, 60 岁。因胃溃疡合并多次大出血, 行胃大部切除术。

115. 该患者术后 5 天出现黑粪, 最可能的原因是

- A. 小弯侧关闭止血不确切
- B. 吻合口出血
- C. 吻合口部分黏膜坏死脱落
- D. 应激性溃疡
- E. 术后胃内残余血

116. 术后 10 天, 已进流质饮食, 突然出现呕吐, 禁食后症状好转。钡餐检查见吻合口延及输出段有较长狭窄, 形似漏斗和一细线形的漏斗尾。该患者可选择的治疗措施不包括

- A. 胃肠减压
- B. 输血

- D. 肌肉注射新斯的明
E. 即刻手术

(117~119 题共用题干)

男, 59 岁。半个多月来双颈部淋巴结无痛性进行性肿大, 不规则发热达 38°C 以上。查体见双颈部各一个 3cm×2cm 肿大淋巴结, 左腋下和右腹股沟各一个 2cm×1cm 肿大淋巴结, 均活动, 无压痛。临床考虑为非霍奇金淋巴瘤。

117. 为了明确诊断, 采用的最佳检查方法是
A. 骨髓穿刺
B. 骨髓活检
C. 淋巴结活检
D. 胸部 CT
E. 腹部 CT

118. 根据提供的资料, 临床分期和分组是
A. II 期 A 组
B. II 期 B 组
C. III 期 A 组
D. III 期 B 组
E. IV 期 B 组

119. 该病人首选的化疗方案是
A. COP
B. COPP
C. CHOP
D. B-CHOP
E. ABVD

(120~121 题共用题干)

女, 30 岁, 已婚。平时月经规律, 停经 40 天, 右下腹剧痛 4 小时伴头晕及肛门坠胀感。查体: BP80/56mmHg, 面色苍白, 痛苦貌, 下

张不明显, 移动性浊音 (+)。妇科检查: 子宫颈举痛, 宫体稍大。右附件区触及不规则包块, 大小约 4cm×3cm×3cm, 压痛 (+), 血红蛋白 100g/L。

120. 该患者最可能的诊断是
A. 卵巢滤泡囊肿破裂
B. 卵巢黄体囊肿破裂
C. 卵巢囊肿蒂扭转
D. 输卵管妊娠破裂
E. 卵巢子宫内膜异位囊肿破裂

121. 该患者简单可靠的辅助检查是
A. 腹部 X 线检查
B. 宫腔镜检查
C. 腹部 CT 检查
D. 腹腔镜检查
E. 阴道后穹窿穿刺

(122~124 题共用题干)

男, 58 岁。进行性贫血、消瘦、乏力半年。有时右腹隐痛, 无腹泻。查体: 右中腹部扪及肿块, 肠鸣音活跃。

122. 下列各项检查可明确诊断的是
A. 纤维结肠镜
B. CEA
C. CT
D. B 超
E. X 线钡餐检查

123. 如果需要手术治疗, 术前准备最重要的是
A. 纠正营养
B. 肠道准备
C. 心肺功能检查

E. 心理准备

124. 该患者最可能的诊断为

- A. 乙状结肠癌
- B. 升结肠癌
- C. 阑尾类癌
- D. 横结肠癌
- E. 降结肠癌

(125~126 题共用题干)

女, 28 岁。左乳皮肤水肿、发红 2 个月, 口服抗生素未见好转。查体: T37.0°C, 左乳皮肤发红、水肿, 呈“橘皮样”, 乳头内陷, 乳房质地变硬, 无触痛。未扪及肿块。左腋下扪及多个肿大淋巴结、质硬、融合, 无触痛。血常规: WBC $8.0 \times 10^9/L$, N0.67。

125. 首先考虑的诊断是

- A. 乳汁淤积
- B. 急性乳腺炎
- C. 乳腺囊性增生
- D. 乳房后脓肿
- E. 炎性乳腺癌

126. 最佳治疗方案是

- A. 局部按摩
- B. 静脉应用广谱抗生素
- C. 穿刺活检后行左乳房切除术
- D. 局部热敷、理疗
- E. 穿刺后活检化疗

(127~128 题共用题干)

男, 33 岁。急性腹膜炎术后 7 天。发热, 为弛张热, 伴乏力、盗汗、食欲缺乏, 右上腹、肋下持续性钝痛, 深呼吸及咳嗽时疼痛加重。

6cm×4cm 液气平面, 诊断性穿刺可抽出脓液。

127. 如决定行切开引流, 为防止脓液流入腹腔再次引起弥漫性腹膜炎, 最主要的措施是

- A. 进入脓腔分离时, 不要破坏粘连层
- B. 切开引流同时应用有效抗生素
- C. 选择合理切口, 显露充分
- D. 吸净脓液, 低压灌洗后留置负压引流
- E. 麻醉效果良好, 便于操作

128. 最常用的抗生素是

- A. 半合成青霉素
- B. 克林霉素
- C. 第二代头孢菌素
- D. 氨基糖苷类
- E. 第三代头孢菌素

(129~130 题共用题干)

男, 32 岁。右大腿枪弹伤 4 小时。伤口已经在院外经过初步处理。查体: T37.8°C, P141 次/分, R28 次/分, BP72/43mmHg。面色苍白, 呼吸急促。双肺呼吸音清晰, 心律齐。腹软, 无压痛。大腿中下 1/3 处对穿性伤口, 已经用纱布覆盖包扎, 无明显渗血。足背动脉搏动弱。

129. 该患者首要的处理措施是

- A. 拆开纱布, 检查伤口
- B. 急诊清创缝合
- C. 注射 TAT
- D. 建立静脉通道, 补充血容量
- E. DSA 检查了解有无血管损伤

130. 若对该患者行清创术, 以下措施不正确的是

- A. 沿大腿纵轴切开探查, 切除创缘皮肤 1~

- B. 若有大血管损伤，尽量修补
- C. 伤口内放置引流物
- D. 伤口内近端绕扎止血带
- E. 若清创彻底，一期缝合伤口

(131~132 题共用题干)

男，46岁。发热5天，于9月16日入院。体温维持在39°C以上，伴寒战，全身乏力，头痛明显。近2天出现腹泻，每日3~5次，水样便。既往体健。查体：T39.5°C，P102次/分，R22次/分，BP135/78mmHg。结膜充血，巩膜轻度黄染，咽红。腹股沟淋巴结轻度肿大，有压痛，质软。心肺未见异常，腹软，压痛及反跳痛(-)。肝肋下触及边缘，有触痛，脾肋下未触及。腓肠肌压痛明显，双侧Babinski征(-)。实验室检查：血WBC 10.4×10⁹/L，N0.80，L0.20。ALT 210U/L，Tbil 40μmol/L。尿蛋白(+)。

131. 该患者最可能的诊断是

- A. 败血症
- B. 伤寒
- C. 钩端螺旋体病
- D. 病毒性肝炎急性黄疸型
- E. 肾综合征出血热

132. 引起本病的病原是

- A. 汉坦病毒
- B. 伤寒杆菌
- C. 肝炎病毒
- D. 钩端螺旋体
- E. 痢疾杆菌

(133~135 题共用题干)

男性，22岁，既往有HBsAg阳性史。10天前无诱因发烧，体温逐渐上升，波动于37.5~39°C，近3天体温持续在38.5~39.5°C不降，伴有食欲不振、乏力、腹胀及尿黄，查体：T39.5°C、P88次/分，BP110/70mmHg，神清，表情淡漠，未见皮疹，巩膜轻度黄染，心肺未见异常，腹软，右下腹压痛(+)，肝右肋下2cm，脾未触及，肝浊音区不小，移动性浊音阴性，双下肢无水肿。化验：WBC3.5×10⁹/L，N60%，L40%，血HBsAg(+)，抗HAV-IgG(+)。

133. 该患者最可能的诊断是

- A. 病毒性肝炎，乙型，慢性轻度
- B. 病毒性肝炎，甲型，急性黄疸型，乙肝表面抗原携带者
- C. 伤寒，病毒性肝炎，乙型，急性黄疸型
- D. 伤寒，病毒性肝炎，甲型，亚急性重型
- E. 伤寒，乙肝表面抗原携带者

134. 为确诊该病例，首选的检查是

- A. 肝功能化验
- B. 肝炎病毒血清学
- C. 血培养
- D. 肥达反应
- E. 肝胆脾彩超

135. 病人治疗的首选方案是

- A. 卧床休息，保肝治疗
- B. 卧床休息避免用肝损伤药物，戒酒
- C. 用激素退热，减轻中毒症状
- D. 用喹诺酮类药物进行病原治疗
- E. 用干扰素治疗

(136~137 题共用备选答案)

- A. 低钾血症
 - B. 高钾血症
 - C. 高钠血症
 - D. 低钙血症
 - E. 低钠血症
136. 大量输注葡萄糖和胰岛素时容易发生的电解质紊乱是
137. 心电图可出现 T 波高尖的电解质紊乱是

(138~140 题共用备选答案)

- A. 动力性肠梗阻
 - B. 绞窄性肠梗阻
 - C. 低位肠梗阻
 - D. 急性完全性肠梗阻
 - E. 慢性肠梗阻
138. 肠管呈代偿性肥厚并可引起低渗性缺水的原因是
139. 肠管迅速膨胀, 肠管变薄, 可引起等渗性缺水的原因是
140. 持续性腹痛血便, 肠鸣音减弱或消失, 有腹膜刺激征的是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 接触传播
 - B. 虫媒传播
 - C. 血液传播
 - D. 呼吸道传播
 - E. 消化道传播
141. 戊型肝炎的主要传播途径是
142. 丙型肝炎的主要传播途径是

(143~144 题共用备选答案)

- A. 边缘区淋巴瘤

- B. 间变性大细胞淋巴瘤
 - C. Burkitt 淋巴瘤
 - D. 弥漫性大 B 细胞淋巴瘤
 - E. 套细胞淋巴瘤
143. 属于 T 细胞淋巴瘤的是
144. 属于惰性淋巴瘤的是

(145~146 题共用备选答案)

- A. 苍白密螺旋体
 - B. 人乳头瘤病毒
 - C. 沙眼衣原体
 - D. 解脲支原体
 - E. 人免疫缺陷病毒
145. 梅毒的病原体是
146. 艾滋病的病原体是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 列兵样排列
 - B. 形成管状结构
 - C. 形成乳头状结构
 - D. 有角化珠
 - E. 有假菊形团结构
147. 最符合小细胞癌组织学特点的是
148. 最符合高分化鳞癌组织学特点的是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 抑制胃酸分泌
 - B. 保护胃黏膜
 - C. 早期手术
 - D. 减少胆汁反流
 - E. 根除幽门螺杆菌 Hp
149. 十二指肠球部溃疡的治疗最主要的是
150. 胃溃疡恶变的治疗

第四单元

A1 型选择题 (1~50 题)

- 营养性维生素 D 缺乏性手足搐搦症的治疗步骤应该是
 - 补钙-止惊-维生素 D
 - 止惊-补钙-维生素 D
 - 维生素 D-止惊-补钙
 - 补钙-维生素 D-止惊
 - 维生素 D-补钙-止惊
- 小儿重型腹泻最易发生的酸碱平衡紊乱是
 - 呼吸性酸中毒
 - 代谢性酸中毒
 - 代谢性碱中毒
 - 呼吸性碱中毒
 - 代谢性酸中毒合并呼吸性酸中毒
- 临产后第一产程的活跃期是指
 - 宫口扩张 1~3cm
 - 宫口扩张 4~10cm
 - 宫口扩张 1~6cm
 - 宫口扩张 2~7cm
 - 宫口扩张 3~8cm
- 额叶中央区(前回)胶质瘤最常见的临床表现是
 - 肢体无力
 - 弱视
 - 象限盲
 - 命名性失语
 - 失认
- 各种补体成分浓度达到成人水平的月龄是
 - 3 个月
 - 4 个月
 - 5 个月
 - 6 个月
- 高血压脑出血最常出血的动脉是
 - 大脑中动脉
 - 豆纹动脉
 - 大脑前动脉
 - 后交通动脉
 - 大脑后动脉
- 全血在保存期内,仍可保持功能的血液成分是
 - 红细胞
 - 凝血因子 V
 - 白细胞
 - 血小板
 - 凝血因子 VII
- 在雌、孕激素作用下,出现周期变化显著的是
 - 卵巢表面上皮
 - 阴道黏膜
 - 子宫内膜
 - 输卵管黏膜
 - 子宫颈上皮
- 属于孕激素生理作用的是
 - 使阴道上皮细胞脱落加快
 - 使子宫内膜增生

- D. 使子宫颈黏液变稀薄
- E. 使血液循环中胆固醇水平降低

10. 下列属于川崎病诊断标准的是

- A. 卡介苗接种处发红
- B. 球结膜充血伴脓性分泌物
- C. 肛周皮肤发红、脱皮
- D. 肝脾肿大
- E. 指/趾末端膜状脱皮

11. 化脓性脑膜炎的致病菌可通过多种途径进入脑膜，以下哪种途径最多见

- A. 呼吸道侵入血流，通过血型播散
- B. 皮肤黏膜
- C. 新生儿脐部
- D. 消化道
- E. 腰骶部皮肤窦道使脑脊液与外界交通

12. 感染性心内膜炎最常累及的部位是

- A. 室间隔缺损处
- B. 心脏瓣膜
- C. 动静脉瘘
- D. 房间隔缺损处
- E. 未闭动脉导管

13. 不属于器官特异性自身免疫病的是

- A. 原发性免疫性血小板减少症
- B. 恶性贫血
- C. 重症肌无力
- D. 慢性甲状腺炎
- E. 类风湿关节炎

14. 有关小儿肠道菌群建立的论述，正确的是

- A. 肠道菌群受食物成分影响
- B. 母乳喂养以大肠杆菌为主

D. 肠道菌群可以合成维生素 D

E. 人工喂养者以双歧杆菌为主

15. 正常枕先露分娩时，仰伸发生于

- A. 胎头拨露时
- B. 胎头着冠时
- C. 胎头枕骨在耻骨弓后时
- D. 胎头枕骨下部达耻骨联合下缘时
- E. 胎头后凶在耻骨弓后时

16. 属于卵巢上皮性肿瘤的是

- A. 畸胎瘤
- B. 颗粒细胞瘤
- C. 卵黄囊瘤
- D. 浆液性肿瘤
- E. 纤维瘤

17. 孕足月活胎不能经阴道试产的胎方位是

- A. 枕左后位
- B. 枕右横位
- C. 肩左前位
- D. 骶左前位
- E. 枕左前位

18. 胎头跨耻征阳性的初产妇于临产后检查，不可能出现的是

- A. 子宫收缩力异常
- B. 病理性缩复环
- C. 胎头衔接
- D. 胎膜早破
- E. 胎位异常

19. 采用吲哚美辛治疗动脉导管未闭的最佳年龄段是

- A. 新生儿期

- C. 青春期
- D. 幼儿期
- E. 学龄前期

20. 老年人脊髓压迫症最常见的病因是

- A. 淋巴瘤
- B. 脊索瘤
- C. 脊膜瘤
- D. 转移癌
- E. 胶质瘤

21. 卵巢肿瘤最常见的并发症是

- A. 恶变
- B. 破裂
- C. 瘤体内出血
- D. 感染
- E. 蒂扭转

22. 雌激素水平低下的最常见症状是

- A. 阴道干涩
- B. 潮热
- C. 情绪低落
- D. 失眠
- E. 月经稀少

23. 滴虫阴道炎的治愈标准是

- A. 临床症状消失
- B. 局部用药 3 个疗程
- C. 连续 3 次月经后检查滴虫阴性
- D. 连续 3 次月经前检查滴虫阴性
- E. 治疗后悬滴法检查滴虫阴性

24. 中度缺氧缺血性脑病的临床表现是

- A. 出生 24 小时内症状最明显
- B. 淡漠与激惹交替

- D. 瞳孔扩大
- E. 出现惊厥、肌阵挛

25. 能引起子宫内膜增生过长的卵巢肿瘤是

- A. 成熟囊性畸胎瘤
- B. 卵泡膜细胞瘤
- C. 内膜样肿瘤
- D. 内胚窦瘤
- E. 浆液性囊腺瘤

26. 诊断神经性厌食时，BMI 不高于

- A. 18.5kg/m²
- B. 17.5kg/m²
- C. 25.0kg/m²
- D. 22.5kg/m²
- E. 15.5kg/m²

27. 小儿生命中，死亡率最高的时期是

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

28. 急性脑综合征最多见的幻觉是

- A. 视幻觉
- B. 听幻觉
- C. 味幻觉
- D. 触幻觉
- E. 嗅幻觉

29. 躁狂发作的睡眠障碍特点是

- A. 早醒
- B. 多梦
- C. 睡眠浅

E. 入睡困难

30. Asherman 综合征属于

- A. 子宫性闭经
- B. 卵巢性闭经
- C. 垂体性闭经
- D. 下丘脑性闭经
- E. 精神性闭经

31. 6 个月以后婴儿容易发生小细胞低色素性贫血的最主要原因是

- A. 添加淀粉类食品过多
- B. 膳食总热量不足
- C. 生长发育需要量增大
- D. 未及时添加含铁丰富的辅食
- E. 人工喂养铁的吸收率低

32. 婴儿从母体获得的抗体开始消失的月龄是

- A. 1~2 个月以后
- B. 3~4 个月以后
- C. 5~6 个月以后
- D. 7~8 个月以后
- E. 9~10 个月以后

33. 应用高效孕激素和假孕疗法治疗效果较差的是

- A. 卵巢巧克力囊肿
- B. 直肠子宫陷凹病灶
- C. 膀胱的子宫内膜异位
- D. 远处转移的子宫内膜
- E. 子宫腺肌病

34. 关于多囊卵巢综合征的内分泌特征, 错误的是

- A. 胰岛素过多

C. 雄激素过多

D. 孕酮过多

E. LH/FSH 比值升高

35. 以下治疗蛛网膜下腔出血的措施不妥的是

- A. 卧床休息 4~6 周
- B. 应用止血药物
- C. 低分子量肝素注射
- D. 静滴 20%甘露醇
- E. 口服尼莫地平

36. 下列哪项不是妊娠期子宫的变化

- A. 妊娠之初, 子宫增大以前后径增加为最明显表现
- B. 早期妊娠, 子宫峡部变软最显著
- C. 妊娠后期, 子宫大多有不同程度右旋
- D. 妊娠中期, 子宫肌壁逐渐增厚直至足月
- E. 足月妊娠时子宫下段可伸长至 7~10cm

37. 颅内压增高的常见原因不包括

- A. 硬膜外血肿
- B. 脑水肿
- C. 梗阻性脑积水
- D. 颅骨缺损
- E. 脑肿瘤

38. 法洛三联症患者青紫的程度主要取决于

- A. 肺动脉狭窄的程度
- B. 室间隔缺损的大小
- C. 室间隔缺损的部位
- D. 主动脉骑跨的程度
- E. 右心室肥厚的程度

39. 关于滴虫性阴道炎, 哪项错误

- A. 滴虫可侵入尿道、尿道旁腺、膀胱及肾盂

见散在红色斑点

C. 有外阴瘙痒、性交疼痛、尿频、尿痛等症状，可导致不育

D. 阴道分泌物悬滴法找到滴虫即可诊断

E. 若悬滴法找不到滴虫，可用酸性溶液灌洗阴道后复查

40. 消除支气管哮喘气道炎症最有效的药物是

A. 糖皮质激素

B. 抗生素

C. 色甘酸钠

D. β_2 受体激动剂

E. 抗组胺药

41. 提示结核性脑膜炎进入晚期的临床表现是

A. 昏迷、频繁惊厥

B. 脑膜刺激征

C. 脑神经障碍

D. 性格改变

E. 肢体瘫痪或偏瘫

42. 关于维生素 D 缺乏性佝偻病的预防措施，不正确的是

A. 及时添加辅食

B. 生后 2 周即应补充维生素 D

C. 提倡母乳喂养

D. 增加户外活动

E. 每日补充维生素 D1000IU 预防

43. 当某一感官处于功能状态时，另一感官出现幻觉，此现象是

A. 功能性幻觉

B. 内脏性幻觉

C. 假性幻觉

D. 反射性幻觉

44. 脑血管畸形中最常见的类型是

A. 毛细血管扩张

B. 静脉畸形

C. 动静脉瘘

D. 海绵状血管畸形

E. 动静脉畸形

45. 下列不属于戒断综合征表现的是

A. 肢体震颤

B. 情绪改变

C. 幻觉或错觉

D. 失眠

E. 近记忆增强

46. 关于前置胎盘，下述哪项错误

A. 妊娠晚期无痛性阴道流血

B. 完全性胎盘前置，阴道流血出现较早

C. 常致胎头高浮及胎位异常

D. 凡确诊为前置胎盘，均应行剖宫产终止妊娠

E. 胎盘娩出后常发现胎盘边缘有凝血块

47. 界限性遗忘常见于

A. 脑外伤

B. 颅内器质性疾病

C. 精神分裂症

D. 分离（转换）障碍

E. 情感性精神障碍

48. 关于小儿年龄分期，错误的是

A. 婴儿期是指自出生 28 天后到满 1 周岁前

B. 胎儿期是指从受精卵开始到胎儿出生为止

C. 学龄前期是指自 3 周岁到 6~7 周岁入小学前

D. 新生儿期是指自胎儿出生脐带结扎到满 28 天

49. 营养不良的最初症状是

- A. 智力发育迟滞
- B. 肌张力低下
- C. 运动功能发育迟缓
- D. 身高低于正常
- E. 体重不增或下降

A2 型选择题 (51~100 题)

51. 女孩, 4 岁。夏季突然发病, 高热 4 小时, T39.5°C, 惊厥 1 次, 无呕吐、腹泻。病前有可疑不洁饮食史。实验室检查: WBC $21.0 \times 10^9/L$, N0.86。最可能的诊断是

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 流行性乙型脑炎
- D. 热性惊厥
- E. 中毒型细菌性痢疾

52. 男, 70 岁。2 年来经常不能完整叙述新近发生的事情, 且常常无中生有地讲述了一些从未发生过的事情。患者意识清楚, 但经常记错时间和地点。最可能的症状是

- A. 急性脑综合征
- B. 脑衰弱综合征
- C. 遗忘综合征
- D. 精神自动症
- E. 紧张综合征

53. 女, 25 岁。初产妇, 妊娠 40 周, 阵发性下腹痛 6 小时, 自然破膜 5 小时, 羊水清。胎心 110 次/分, 宫口开大 2cm, 头先露。产时胎心监护显示多次晚期减速。此时最恰当的处理是

- A. 静滴缩宫素

50. 提示上运动神经元损害最有意义的体征是

- A. 病理征阳性
- B. 腱反射减弱
- C. 浅反射消失
- D. 肌张力正常
- E. 瘫痪肌肉不萎缩

- C. 吸氧并继续观察产程
- D. 宫颈注射地西泮
- E. 静滴硫酸镁

54. 初产妇, 30 岁。妊娠 30 周, 视物模糊 1 天, 孕前体健。查体: BP 160/105mmHg, 胎心率 150 次/分, 双下肢明显水肿。蛋白尿定量 2g/24h。最可能的诊断是

- A. 妊娠合并慢性肾炎
- B. 妊娠期高血压
- C. 重度子痫前期
- D. 轻度子痫前期
- E. 子痫

55. 男, 70 岁。乏力、纳差 2 个月。近一个月睡眠不佳。查体: T36.5°C, P80 次/分, R18 次/分, BP120/80mmHg, 巩膜黄染。腹软, 肝肋下未触及, 脾肋下 2cm, 无压痛。实验室检查: ALT 105U/L, Alb 29g/L, HBV-DNA 3.15×10^2 拷贝/ml。腹部 B 超: 脾脏轻度肿大, 肝脏边缘不光滑, 实质回声不均匀, 腹腔中等量积液。目前不宜给予的治疗药物是

- A. 水飞蓟宾
- B. 甘草酸二铵
- C. 地西泮
- D. 多烯磷脂酰胆碱

56. 女, 26 岁。感冒后出现全身无力、双眼睑下垂 3 天。晨起症状较轻, 活动后加重。对该患者不必要的检查是

- A. 新斯的明试验
- B. 重复神经刺激
- C. 胸腺 CT
- D. 甲状腺功能检查
- E. 肌肉活检

57. 女, 35 岁。宫内节育器避孕 10 年, 阴道不规则流血 2 个月, 要求取环, 妇科检查: 外阴阴道充血, 阴道少量流血, 伴异味, 宫颈光滑, 子宫及双侧附件未触及异常, 下列处理不正确的是

- A. 需先治疗生殖道炎症
- B. 血 hCG 检查排除妊娠
- C. 取样同时建议刮宫
- D. 需血止后 3~7 天取环
- E. 取环前需盆腔超声检查

58. 女, 25 岁。近半年来反复担心自己会拿刀具伤人, 害怕自己会拿锋利的菜刀剪刀伤害家人。自己知道这些想法不合理, 努力控制不去想, 但非常痛苦。该患者最可能的诊断是

- A. 抽动障碍
- B. 强迫障碍
- C. 精神分裂症
- D. 恐惧性焦虑障碍
- E. 广泛性焦虑障碍

59. 病人诉自己的血液凝固了, 身体干枯了, 变成了僵尸。该症状属于

- A. 思维联想障碍
- B. 思维逻辑障碍
- C. 思维内容障碍

- D. 妄想
- E. 人格解体

60. 女婴, 2 个月。过期产, 出生体重 4kg, 出生后吃奶慢, 便秘, 大便 6~7 天 1 次, 至今黄疸尚未完全消退。检查: 哭声低哑, 手脚凉, 腹部膨隆。最可能的诊断是

- A. 先天性甲状腺功能减退症
- B. 新生儿肝炎综合征
- C. 低血糖
- D. 习惯性便秘
- E. 先天性巨结肠

61. 女, 30 岁, 已婚。停经 48 天, 剧烈腹痛 2 天, 阴道不规则流血 1 天, 今晨从阴道排出三角形膜样组织。检查: 贫血外貌, 下腹部压痛、反跳痛明显。正确治疗措施应选择

- A. 立即行刮宫术
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 肌注麦角新碱
- D. 行剖腹探查术
- E. 应用止血药

62. 产妇, 现产后 3 天, 出现急性腹痛伴发热 2 天, 腹部包块增大, 曾诊断患“子宫肌瘤”。本例应考虑的诊断是

- A. 产褥感染
- B. 子宫肌瘤囊性变
- C. 子宫肌瘤玻璃样变
- D. 子宫肌瘤红色变
- E. 子宫肌瘤恶性变

63. 女孩, 7 个月。因逗笑少, 对玩具不感兴趣。矮小, 而去医院检查, 医生疑为智能低下。对其病因如先天性甲状腺功能低下未能肯定

- A. 干血滴纸片检测 TSH 浓度
- B. 测血清 T₄ 和 TSH 浓度
- C. TRH 刺激试验
- D. X 线腕骨片判定骨龄
- E. 核素检查 (甲状腺 SPECT)

64. 初产妇, 21 岁。妊娠 38 周, 双胎妊娠, 第二胎儿娩出后 10 分钟, 突然多量阴道流血, 色暗红。本例阴道流血最可能的原因是

- A. 胎盘剥离不全
- B. 凝血功能障碍
- C. 胎盘植入
- D. 子宫收缩乏力
- E. 软产道裂伤

65. 女孩, 12 岁。反复水肿半年。BP150/100mmHg。尿常规: 蛋白(+++~++++), 红细胞 8~18/HP, 血尿素氮 10.8mmol/L (30mg/dl), 血清总蛋白 40g/L (4g/dl), 白蛋白 15g/L (1.5g/dl)。诊断考虑为

- A. 急性链球菌感染后肾炎
- B. 单纯型肾病
- C. 病毒性肾炎
- D. 急进性肾炎
- E. 肾炎型肾病

66. 男孩, 4 岁。头大颈短, 皮肤苍黄粗糙, 毛发稀少, 经常便秘, 3 岁才会走路, 说话语言不清。查体: 身矮、眼距宽、鼻梁低, 心率 70 次/分, 心音低钝, 双肺 (-), 腹较膨胀, 肝脾不大。对明确诊断最有帮助的检查是

- A. 血钙、磷、碱性磷酸酶
- B. 血总蛋白、白蛋白、胆红素
- C. 染色体核型分析

E. 血氨基酸分析

67. 男婴, 5 个月。母乳喂养, 腹泻 2 个月, 大便 5~6 次/天, 稀糊便, 无脓血, 食欲好, 面有湿疹, 体重 7.6kg。最可能的诊断是

- A. 迁延性腹泻
- B. 过敏性腹泻
- C. 饮食性腹泻
- D. 生理性腹泻
- E. 感染性腹泻

68. 27 岁经产妇, 妊娠 39 周, 双胎妊娠。第一胎儿枕先露自然分娩, 第二胎儿间隔 8 分钟臀助产娩出, 历经 10 分钟娩出胎盘, 随后阴道流血量达 600ml。最可能的诊断是

- A. 子宫颈裂伤
- B. 胎盘残留
- C. 子宫收缩乏力
- D. 副胎盘残留
- E. 凝血功能障碍

69. 女婴, 10 个月。发热 2 天, 呕吐 4 次, 烦躁, 今日惊厥 1 次。查体: 精神差, 双眼凝视, 前囟膨隆, 双膝腱反射亢进。化验: 外周血 WBC $18 \times 10^9/L$, N0.82。首选的药物是

- A. 青霉素
- B. 利福平
- C. 阿昔洛韦
- D. 头孢曲松钠
- E. 两性霉素 B

70. 女, 28 岁。风湿性心脏病二尖瓣狭窄病史 2 年。平时不用药, 登三楼无明显不适。孕 5 个月起活动时常有轻度心悸、气促。现孕 38 周, 因心悸、咳嗽、夜间不能平卧、心功能 III 级而

- A. 积极控制心力衰竭后终止妊娠
- B. 积极控制心力衰竭，同时行剖宫产术
- C. 积极控制心力衰竭，同时行引产术
- D. 适量应用抗生素后继续妊娠
- E. 纠正心功能，等待自然临产

71. 男，45岁。右眼睑下垂伴复视2个月。既往有蛛网膜下腔出血病史。查体：右眼球外斜位，右侧瞳孔散大，对光反射消失。增强CT检查显示鞍旁右侧有一直径约0.5cm圆形高密度影，其周围无脑水肿征。首先考虑的诊断是

- A. 鞍旁脑膜瘤
- B. 颈内动脉、后交通动脉瘤
- C. 三叉神经鞘瘤
- D. 颞叶胶质瘤
- E. 颞叶脑脓肿

72. 25岁妇女，停经3个月，阴道不规则出血1月余，查体：血红蛋白7g/dl，阴道前壁有紫蓝色结节，大小如胡桃，宫颈口松，子宫如4个半月妊娠大小，血hCG大于20000U/L，应考虑为

- A. 良性葡萄胎
- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 双胞胎妊娠
- D. 妊娠合并子宫肌瘤
- E. 先兆流产

73. 女，35岁。不规则阴道流血4个月。妇科检查发现阴道壁上有一红色结节。病理检查见大量血块及坏死组织中散在一些异型的滋养层细胞团，无绒毛结构。应诊断为

- A. 水泡状胎块
- B. 子宫颈癌
- C. 绒毛膜癌

- D. 子宫内膜癌
- E. 侵蚀性葡萄胎

74. 男，32岁。因患再生障碍性贫血需要输血，当输入红细胞悬液约200ml时，突然畏寒，发热，呕吐1次，尿呈酱油样，血压75/45mmHg。该患者最有可能是下列哪一种输血不良反应

- A. 非溶血性发热性输血反应
- B. 溶血性输血反应
- C. 过敏反应
- D. 细菌污染反应
- E. 循环超负荷

75. 女，48岁。放置宫内节育器10年，近6个月出现不规则阴道流血。妇科检查：子宫颈光滑，宫体正常大，表面光滑，附件区未触及包块。子宫颈细胞学检查无异常，对症治疗无明显改善。首选的处理措施是

- A. 止血药治疗
- B. 抗生素治疗
- C. 取出宫内节育器+分段诊刮
- D. 取出宫内节育器
- E. 人工周期治疗

76. 男，35岁。突发剧烈头痛伴恶心、呕吐、烦躁不安1天。查体：双眼视力重度减退、双颞侧偏盲。急诊CT示鞍区椭圆形占位性病变，3cm×2cm×2cm大小，内呈高密度影，可见气液平面；幕上脑室扩大。应采取的有效治疗措施是

- A. 立即给予神经营养药
- B. 急诊手术视神经减压
- C. 立即给予糖皮质激素治疗
- D. 保守治疗，病情稳定后手术治疗
- E. 迅速给予镇痛处理

77. 男, 26 岁。近 1 个月来兴高采烈, 话多, 自觉脑子聪明, 无疲倦感。其主要表现为

- A. 焦虑症状
- B. 不协调性精神运动兴奋
- C. 协调性精神运动兴奋
- D. 强迫症状
- E. 思维内容障碍

78. 男, 40 岁。车祸外伤后 10 小时, 当时无昏迷, 入院时查体: 神志清楚, 答话切题。右侧肢体肌力 4 级, 霍夫曼征阳性。头颅 X 线平片及 CT 均提示左顶骨凹陷性骨折, 直径 3cm, 深度 2cm。正确的治疗是

- A. 抗感染治疗
- B. 手术摘除凹陷的骨折碎片, 解除对脑组织的压迫
- C. 观察病情变化, 决定下一步的治疗方案
- D. 脱水治疗
- E. 保守治疗, 应用神经营养剂

79. 男孩, 9 岁。尿少、水肿 1 天。查体: 眼睑部水肿, 血压 140/100mmHg, 尿蛋白(+), 尿红细胞(++++)。该患儿诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 泌尿系感染
- C. 单纯型肾病
- D. 肾炎型肾病
- E. 继发性肾病

80. 女婴, 早产儿。生后 3 天, 出现反应低下, 不吃、不哭、不动、体温不升、皮肤黏膜斑点, 皮肤呈大理石花纹。考虑最可能的是

- A. 新生儿寒冷损伤综合征
- B. 新生儿败血症

- D. 新生儿缺氧缺血性脑病
- E. 生理性黄疸

81. 女, 25 岁。妊娠 8 周出现剧烈呕吐, 呕吐数次胃内容物后呕出鲜血 100ml, 诊断考虑是

- A. 消化性溃疡
- B. 急性胃炎
- C. 食管贲门黏膜撕裂综合征
- D. 食管胃底静脉曲张破裂
- E. 食管炎

82. 女, 42 岁。G₄P₁。继发性痛经, 进行性加重 8 年, 痛经剧烈, 服用镇痛药物不能缓解。伴性交痛。查体: 子宫后倾后屈, 如 60 天妊娠大小, 质硬不活动; 子宫后壁触及米粒大小触痛结节, 子宫右后方扪及约 8cm×8cm 大小包块, 不活动, 张力较大。该患者可能的诊断是

- A. 阑尾周围脓肿
- B. 卵巢子宫内膜异位囊肿
- C. 输卵管卵巢脓肿
- D. 卵巢系膜囊肿
- E. 子宫肌瘤

83. 女, 33 岁。继发性痛经 3 年, 检查子宫后倾屈, 7.5cm×7.0cm 大, 质硬。本例不可能出现的临床表现为

- A. 不孕
- B. 性交疼痛
- C. 经量过多
- D. 经期延长
- E. 月经稀发

84. 男孩, 5 岁。面容特殊, 眼距宽, 鼻梁平, 手厚肥大, 面部臃肿, 皮肤粗糙, 头发干稀

C. 新生儿溶血症

枚骨化中心。最可能的诊断是

- A. 唐氏综合征
- B. 先天性甲状腺功能减低症
- C. 黏多糖病
- D. 苯丙酮尿症
- E. 软骨发育不良

85. 初产妇，28岁。妊娠39周，临产后宫缩强，产程进展较快，6小时后宫口开大9cm，自然破膜后不久出现寒战、呛咳、气急、呼吸困难、血压下降，血涂片见羊水有形物质。此时首选的应急措施是

- A. 立即气管切开正压给氧
- B. 静脉缓注氨茶碱 250mg
- C. 静脉推注地塞米松 20mg
- D. 静脉滴注多巴胺 20mg
- E. 静脉滴注低分子右旋糖酐 500ml

86. 一小儿，身长76cm，体重9.5kg，头围46cm，胸围46cm，出牙6颗。最可能的月龄是

- A. 10个月
- B. 15个月
- C. 24个月
- D. 12个月
- E. 18个月

87. 男，21岁。早晨起后全身无力，3小时。发病前一天参加了学校1500米长跑，较疲劳。去年有类似发作2次，均为发作1~2天完全恢复。查体：神志清、脑神经检查无异常，双上肢肌力4级，双下肢肌力2级，肌张力低，腱反射对称，病理反射未引出，深浅感觉无异常。心电图示窦性心律，出现U波。最可能的诊断是

- B. 多发性肌炎
- C. 周期性瘫痪
- D. 吉兰-巴雷综合征
- E. 癫痫

88. 女，50岁。因外伤骨盆骨折急诊入院手术治疗。术后第5天，查体：P100次/分，BP100/60mmHg。实验室检查：Hb75g/L。当日子女两人各献出全血200ml给患者输注。术后第15天，患者出现腹泻，4~6次/日。查体：T39°C，皮肤出现斑丘疹。实验室检查：Hb56g/L，WBC $2.36 \times 10^9/L$ ，PLT $20 \times 10^9/L$ ，ALT300U/L，该患者可能发生了

- A. 急性溶血反应
- B. 输血相关移植物抗宿主病
- C. 细菌性反应
- D. 严重过敏反应
- E. 输血传播艾滋病

89. 女，48岁。1年来常无故出现紧张不安、多虑、失眠、头晕、头痛、注意力不集中、阵发性心悸、胸闷、四肢无力。在多家医院就诊，ECG、心电图负荷试验、冠状动脉造影、头颅MRI检查均未发现异常。该患者最可能的诊断是

- A. 广泛性焦虑障碍
- B. 躯体形式障碍
- C. 疑病障碍
- D. 恐惧性焦虑障碍
- E. X综合征

90. 女婴，5个月。高热、频繁呕吐2天。查体：面色青灰、两眼凝视，前囟隆起，心肺无异常，无脑膜刺激征。血象：WBC $16 \times 10^9/L$ ，

10.00 1.0-1.0 患儿最可能的诊断是

- A. 上呼吸道感染
- B. 急性胃炎
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 结核性脑膜炎
- E. 病毒性脑膜炎

91. 女, 45 岁。G2P1, 继发性痛经 6 年。查体: 子宫如妊娠 12 周大小, 质硬, 活动受限。

药物治疗后症状无缓解。最佳手术治疗方案是

- A. 子宫切除加双附件切除术
- B. 子宫切除术
- C. 改良广泛性子宫切除术
- D. 广泛性子宫切除术
- E. 骶神经切断术

92. 患儿, 8 岁。胸骨左缘第 3、4 肋间听到响亮而粗糙的收缩期杂音。应考虑为

- A. 室间隔缺损
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 动脉导管未闭
- E. 肺动脉瓣狭窄

93. 女孩, 2 岁。生长发育迟缓及智力发育落后。查体: 眼裂小, 眼外眦上斜, 眼距宽, 外耳小、鼻梁低平, 皮肤细腻。为明确诊断首选的检查是

- A. 尿三氯化铁试验
- B. 尿蝶呤分析
- C. 血 T_3 、 T_4 、TSH
- D. 骨龄测定
- E. 染色体核型分析

94. 女, 25 岁, 足月妊娠。因前置胎盘发生 DIC, 阴道大出血入院。查体: $T35.0^{\circ}\text{C}$, $P130$ 次/分

Hb55g/L, RBC $20 \times 10^6/\text{L}$, 血纤维蛋白原 1.6g/L。不正确的输血处理措施是输注

- A. 新鲜冷冻血浆
- B. 浓缩血小板
- C. 普通冷冻血浆
- D. 冷沉淀
- E. 悬浮红细胞

95. 男, 73 岁。3 年前出现右侧肢体活动不灵、右手静止性震颤, 被诊断为帕金森病, 复方左旋多巴治疗后病情稳定。近半年出现白天药效维持时间短缩, 震颤明显。患者有肾功能不全、前列腺肥大病史。对该患者最适当的处理是

- A. 改用培高利特
- B. 加用金刚烷胺
- C. 增加复方左旋多巴剂量或次数
- D. 加用苯甲托品
- E. 加用苯海索

96. 男婴, 5 个月, 因咳喘 4 天, 诊断为支气管肺炎, 体温持续 $39 \sim 40^{\circ}\text{C}$ 。近 2 小时来两眼上翻, 惊厥多次, 神志半昏迷, 前囟门紧张。可能合并

- A. 癫痫
- B. 高热惊厥
- C. 中毒性脑病
- D. 婴儿手足搐搦症
- E. 低血糖

97. 男, 68 岁。2 年前出现过短暂的意识混浊, 清醒后有几天听到空中有人在向他打招呼, 思维迟缓, 情感脆弱, 几周后症状明显减轻。近半年来类似症状发作过 2 次, 记忆力明显减退。

头颅 MRI 示大脑多发性腔隙性梗死。最可能的诊断是

- A. 精神分裂症
- B. 血管性痴呆
- C. 抑郁发作
- D. 阿尔茨海默病
- E. 癫痫所致精神障碍

98. 初孕妇，25岁。妊娠40周，规律宫缩8小时，宫缩40~50秒/4~5分，检查胎心率140次/分，枕左前位，胎头双顶径10cm，先露9，宫口开大2cm，坐骨棘间径9cm。该患者正确的处理是

- A. 剖宫产
- B. 肌内注射哌替啶
- C. 静脉滴注缩宫素
- D. 继续观察产程进展
- E. 静脉注射5%葡萄糖注射液

99. 一个健康儿前囟2.0cm×2.0cm，体重7kg，

能独坐一会、用手摇玩具，能认识熟人和陌生人，其月龄为

- A. 3个月
- B. 6个月
- C. 8个月
- D. 10个月
- E. 12个月

100. 病人男性，21岁，右侧肢体抽搐2年，突然昏迷1小时。查体：神志浅昏迷，左侧肢体偏瘫。CT显示右额叶脑内血肿，临床诊断可能是

- A. 原发性癫痫
- B. 脑动脉硬化
- C. 脑动脉瘤
- D. 脑血管畸形
- E. 高血压脑出血

A3/A4型选择题（101~134题）

（101~103题共用题干）

女，30岁。阴道不规则流血20天，咳嗽5天。半年前行人工流产，吸出物见到绒毛组织。妇科检查：子宫如40天妊娠大小，质软，双侧附件区均可触及大小约5cm的囊性包块，胸部X线片示双侧中下野多发棉球状阴影。

101. 对明确诊断意义最大的检查是

- A. 胸部CT
- B. 血功能
- C. 脑MRI
- D. 血β-hCG
- E. 盆腔超声

102. 首先考虑的诊断是

- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 葡萄胎
- D. 先兆流产
- E. 稽留流产

103. 主要的治疗方式是

- A. 药物流产
- B. 保胎治疗
- C. 手术治疗
- D. 放射治疗
- E. 化学治疗

（104~106题共用题干）

初孕妇，26岁。妊娠38周，自觉胎动减少10小时入院

104. 应立即采取的措施不包括

- A. 胎儿电子监护
- B. 间歇吸氧
- C. 左侧卧位
- D. 胎儿生物物理评分
- E. 立即停止妊娠

105. 入院后 B 超检查提示羊水平段 5cm, 无应激试验无反应型, 此时正确的处理措施是

- A. 人工破膜
- B. 间歇吸氧并严密观察
- C. 复查无应激试验
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 米索前列醇引产

106. 5 小时后, 产程发动, 听诊胎心率 100 次/分, 此时最恰当的处理措施是

- A. 加压给氧
- B. 产钳助产
- C. 给予宫缩抑制剂
- D. 继续观察
- E. 剖宫产

(107~109 题共用题干)

男, 30 岁。1 年前下岗。近 5 个月来觉得邻居都在议论他, 常不怀好意地盯着他, 有时对着窗外大骂, 自语、自笑, 整天闭门不出, 拨 110 电话要求保护。

107. 该病例最可能的诊断是

- A. 反应性精神病
- B. 躁狂抑郁症
- C. 偏执性精神病
- D. 分裂样精神病
- E. 精神分裂症

108. 该患者不存在

- A. 幻听
- B. 关系妄想
- C. 被害妄想
- D. 情绪低落
- E. 行为退缩

109. 有诊断意义的症状还包括

- A. 思维奔逸
- B. 意识障碍
- C. 木僵
- D. 自杀
- E. 妄想知觉

(110~112 题共用题干)

女, 28 岁。孕 36 周, 发现血压升高 3 周, 今晨突然腹痛, 诉为持续性, 阵发加重。查体: 血压 150/98mmHg, 心率 112 次/分。尿蛋白(++), 阴道有少量流血。

110. 体格检查最可能发现的子宫体征是

- A. 子宫有规则阵发收缩, 宫缩间期子宫完全放松
- B. 子宫局部隆起似包块状, 有压痛
- C. 子宫上段硬, 下段膨隆压痛, 交界处有环状凹陷
- D. 子宫不规则收缩, 较硬, 压痛, 宫缩间歇不完全放松
- E. 子宫柔软, 有压痛, 无宫缩

111. 此时对诊断最有用的检查是

- A. 血红蛋白
- B. 白细胞计数+分类
- C. 血细胞比容
- D. B 超

112. 此时最有可能的诊断是

- A. 先兆早产
- B. 胎盘早剥
- C. 先兆子宫破裂
- D. 前置胎盘
- E. 子宫肌瘤红色变性

(113~114 题共用题干)

女, 46 岁。主诉排便时阴道脱出一物块。检查见用力时阴道前壁膨出, 子宫颈延长, 子宫颈外口露于阴道口外, 宫体仍在阴道内, 后倾屈, 附件未扪及。

113. 本例应诊断为

- A. 阴道前壁膨出
- B. 子宫脱垂I度合并膀胱膨出
- C. 阴道后壁膨出
- D. 子宫脱垂II度重型
- E. 子宫脱垂II度轻合并膀胱膨出

114. 本例选择恰当的手术为

- A. Manchester 手术
- B. 阴道前后壁修补术
- C. 阴式子宫全切除术
- D. 阴式子宫全切除术+阴道壁修补术
- E. 经腹子宫全切除术

(115~116 题共用题干)

女, 28 岁。产后 8 个月, 哺乳。厌食 1 周。妇科检查: 子宫软, 如妊娠 40 天大小。人工流产术中, 探针探宫腔深度 14cm。患者无明显腹痛, 无阴道流血。

115. 应该考虑

- A. 子宫肌瘤

C. 子宫后位

- D. 子宫畸形
- E. 子宫穿孔

116. 应采取的处理是

- A. 继续操作吸宫
- B. 请上级大夫再次探宫腔深度
- C. 立即剖腹探查
- D. 后穹窿穿刺确定有无内出血
- E. 严密观察 1 周后再吸宫

(117~119 题共用题干)

8 个月男孩, 生后一直牛奶喂养, 未添加辅食。近 1 周来, 患儿每天腹泻 5~6 次, 质稀, 伴吵闹不安, 睡眠差, 出汗多, 尚不能扶站, 未出牙。考虑为维生素 D 缺乏性佝偻病。

117. 体检时最可能存在的体征是

- A. 鸡胸
- B. 肌张力正常
- C. 颅骨软化
- D. 方颅及前囟增大
- E. “O”形腿

118. 患儿 X 线长骨检查示骨骺软骨明显增宽, 干骺端临时钙化带消失, 呈毛刷状及杯口样病变, 则应属维生素 D 缺乏性佝偻病的

- A. 初期
- B. 激期
- C. 恢复期
- D. 后遗症期
- E. 以上都不是

119. 若该患儿在住院过程中, 突然抽搐一次, 表现为四肢抽动, 肌张力增高, 双眼上翻凝视,

清楚，精神正常，但体温肛温为 38°C。为明确抽搐原因，首选检查为

- A. 血常规
- B. 血糖
- C. 血钙、磷
- D. 脑脊液常规
- E. 头颅 CT 或 MRI 检查

(120~121 题共用题干)

女孩，8 岁。3 周前曾患脓疱病。水肿、少尿、肉眼血尿 3 天。BP: 150/105mmHg。尿常规：蛋白 (+)，大量红细胞，管型 1~2/HP。ASO 升高，血沉增快，血补体 C3 下降。

120. 首选的降压药是

- A. 卡托普利
- B. 二氮嗪
- C. 硝苯地平
- D. 哌唑嗪
- E. 硝普钠

121. 应限制钠摄入量直到

- A. 血沉正常
- B. 尿常规正常
- C. 水肿消退，血压正常
- D. 补体恢复正常
- E. 肉眼血尿消失

(122~123 题共用题干)

男孩，2 岁。因呕吐、频繁水样便 3 天伴发热于 10 月底入院。12 小时无尿。查体：T38°C，颜面苍白，皮肤弹性差，眼窝凹陷，心肺听诊无异常，腹稍胀，肝脾不大，膝腱反射未引出，四肢末端厥冷。实验室检查：血钠 138mmol/L。

- A. 侵袭性大肠埃希菌肠炎
- B. 轮状病毒肠炎
- C. 致病性大肠埃希菌肠炎
- D. 真菌性肠炎
- E. 产毒性大肠埃希菌肠炎

123. 最可能合并的电解质紊乱是

- A. 低镁血症
- B. 低钾血症
- C. 低磷血症
- D. 低氯血症
- E. 低钙血症

(124~126 题共用题干)

男婴，3 天。黄疸迅速加重 2 天。足月儿，母乳喂养。母亲血型为 O 型 Rh 阳性，父亲血型为 AB 型 Rh 阳性。实验室检查：TBil289 μ mol/L。

124. 为确诊最有效的检查

- A. 血涂片查红细胞
- B. 改良直接抗人球蛋白抗体
- C. 血型
- D. 血培养
- E. 肝功能

125. 最可能的诊断

- A. 新生儿败血症
- B. 新生儿肝炎综合征
- C. Rh 血型不合溶血病
- D. ABO 血型不合溶血病
- E. 新生儿母乳性黄疸

126. 首先应采取的治疗措施是

- A. 使用抗生素

- C. 输白蛋白
- D. 换血
- E. 口服苯巴比妥

(127~128 题共用题干)

男, 17 岁。骑摩托车不慎摔倒, 左颞顶着地, 短暂昏迷后清醒, 伤后 30 分钟入院, 急诊 CT 左颞顶颅骨骨折, 2 小时后头疼加重, 逐渐昏迷, 左侧瞳孔散大, 右肢体瘫痪。

127. 首选检查为

- A. 颅骨及颈部的 X 线片
- B. 颈部的 CT
- C. 头颅 MRI
- D. 脑电图
- E. 头颅 CT

128. 首先考虑的诊断为

- A. 颈损伤, 脊髓受压
- B. 脑挫伤, 脑干损伤
- C. 急性硬膜外血肿, 小脑幕切迹疝
- D. 急性硬膜下血肿, 脑挫伤
- E. 急性硬膜下血肿, 枕骨大孔疝

(129~131 题共用题干)

女, 20 岁。1 个月前因工作差错被领导批评后出现心情烦躁, 经常哭泣, 认为自己没有能力, 什么事都干不好, 周围人的眼神不怀好意, 看她笑话。失眠, 早醒。近 1 周病情加重, 觉得生不如死, 在家中拒食等死。

129. 该患者最可能的诊断是

- A. 广泛性焦虑障碍
- B. 急性应激障碍
- C. 分裂情感性精神障碍

E. 精神分裂症

130. 入院治疗 1 个月后, 情绪好转, 在病室中经常哼哼小曲, 好管闲事, 喜欢指责他人, 精力旺盛, 睡眠减少。该患者当前最可能的情况是

- A. 躁狂发作
- B. 病情加重
- C. 环性人格
- D. 病情复燃
- E. 病情缓解

131. 该患者不宜使用的药物是

- A. 喹硫平
- B. 文拉法辛
- C. 卡马西平
- D. 碳酸锂
- E. 丙戊酸钠

(132~134 题共用题干)

男孩, 4 岁。因怀疑先天性心脏病就诊。

132. 首先检查的是

- A. 血常规
- B. 脑电图
- C. 血钙、磷测定
- D. 胸部 X 线摄片
- E. 腹部 B 超

133. 该患儿口唇黏膜青紫, 轻度杵状指(趾), 胸骨左缘 2~4 肋间听到 2~3 级收缩期杂音, 肺动脉第二音减弱。为确诊应做的检查是

- A. 脑电图
- B. 头颅 CT
- C. 心肌酶谱

E. 腹部 B 超

134. 2 个月后患儿出现发热伴咽痛, 2 周后出现头痛。右侧巴氏征 (+), WBC $18 \times 10^9/L$, 中性 0.86, 淋巴 0.14。考虑合并

B1 型选择题 (135~150 题)

(135~136 题共用备选答案)

- A. 基础体温呈双相型, 下降缓慢
- B. 基础体温呈双相型, 上升缓慢
- C. 基础体温呈双相型, 持续高温期
- D. 基础体温呈双相型, 高温期短于 11 天
- E. 基础体温呈单相型

135. 女, 15 岁。阴道淋漓流血 2 个月。既往月经不规律, 周期长短不一。尿妊娠试验阴性。其基础体温最可能是

136. 女, 35 岁。近半年经期延长至 8~10 天, 月经第 3~4 天量多。既往月经规律, 周期 28 天。8 年前顺产分娩。其基础体温最可能是

(137~138 题共用备选答案)

- A. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症
- B. 缺铁性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 巨幼细胞贫血
- E. 自身免疫性溶血性贫血

137. 外周血中全血细胞减少, Ham 试验阴性

138. 血红蛋白 50g/L, 血小板 $100 \times 10^9/L$, Coombs 试验阳性

(139~140 题共用备选答案)

- A. 博来霉素+依托泊苷+顺铂
- B. EP-EMA
- C. EMA-CO

- A. 肺炎
- B. 脑出血
- C. 脑脓肿
- D. 心肌炎
- E. 结核性脑膜炎

E. 紫杉醇+卡铂

139. 恶性卵巢生殖细胞瘤最常用联合治疗方案

140. 卵巢上皮癌的一线化疗首选

(141~142 题共用备选答案)

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延长
- C. 活跃期停滞
- D. 第二产程延长
- E. 第二产程停滞

141. 初产妇, 妊娠 40 周, 于晨 5 时临产, 14 时宫口开大 5cm, 22 时宫口开大 7cm, 此时应诊断为

142. 初产妇, 宫口开全超过 3 小时, 此时应诊断为

(143~144 题共用备选答案)

- A. 带状疱疹病毒
- B. 柯萨奇病毒
- C. 腺病毒
- D. 呼吸道合胞病毒
- E. 人类疱疹病毒 6 型

143. 幼儿急疹的病原体是

144. 疱疹性咽峡炎的病原体是

(145~147 题共用备选答案)

A. 21 天

B. 8 天

-
- C. 5 天
 - D. 10 天
 - E. 15 天

- 145. 风疹隔离至出疹后
- 146. 麻疹隔离至出疹后
- 147. 麻疹并发肺炎隔离至出疹后

(148~150 题共用备选答案)

A. 分水岭脑梗死

B. 短暂性脑缺血发作

C. 脑栓塞

D. 脑血栓形成

E. 腔隙性脑梗死

148. 导致脑梗死最常见的原因是

149. 心房颤动引起的常见卒中类型是

150. 相邻两血管供血区分界处缺血所致的脑卒中类型是

