

# 中西医执业医师押题卷

## 第一单元

### A1 型题

1.证候不包括

- A.四诊检查所得
- B.内外致病因素
- C.疾病的特征
- D.疾病的性质
- E.疾病的全过程

答案:E

解析:中医证候是指疾病发生和演变过程中某阶段以及患者个体当时所处特定内、外环境本质的反映,它以相应的症、舌、脉、形、色、神表现出来,能够不同程度地揭示病因、病位、病性、邪正盛衰、病势等病机内容,为辨证论治提供依据。

2.诊断疾病时以气息分阴阳,属阳者为

- A.语声低微
- B.语声无力
- C.少言沉静
- D.语声高亢
- E.低声懒言

答案:D

解析:以气息分阴阳,语声高亢洪亮、多言而躁动者,属实、属热,为阳;语声低微无力、少言而沉静者,属虚、属寒,为阴。

3.“阴阳离决,精气乃绝”阐述的阴阳关系是

- A.阴阳消长
- B.阴阳交感
- C.阴阳转化
- D.阴阳对立
- E.阴阳互根

答案:E

解析:阴阳互根,是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面,具有相互依存,互为根本的关系。即阴和阳任何一方都不能脱离另一方而单独存在,每一方都以相对的另一方的存在作为自己存在的前提和条件。如果由于某些原因,阴和阳之间的互根关系遭到破坏,就会导致“独阴不生,独阳不生”,甚则“阴阳离决,精气乃绝”而死亡。

4.属于“子病犯母”的脏病传变是

- A.心病及肝
- B.心病及脾
- C.心病及肺
- D.心病及肾
- E.肝病及肺

答案:A

解析:子病及母指五行中某一行异常,影响其母行,终使子母两行皆异常。子病及母一般有三种规律:一是子行亢盛,引起母行亦亢盛,结果是子母两行皆亢盛,称为“子病犯母”;二是子行虚弱,上累母行,引起母行亦不足,终令子母俱不足;三是子行亢盛,损伤母行,

使得子盛母衰，一般称为“子盗母气”。心属火，肝属木，木生火，假设心有病，按照五行生克的规律，影响到肝，为子病及母。

5.见肝之病，知肝传脾的病机传变是

- A.木克土
- B.木乘土
- C.土侮木
- D.母病及子
- E.子病犯母

答案:B

解析:肝属木，脾属土，木与土之间为相克的关系，正常的生克关系受到破坏后就会出现不正常的相克关系导致的偏盛偏衰的情况，当对被克制的“一行”因克制太过引起异常的反应，称为相乘；当五行中的“一行”过于强盛，对原来克制自己的“一行”进行反克，称为相侮。所以肝病及脾为相乘关系。

6.五脏六腑的病理特点及治疗原则是

- A.脏病多虚，五脏宜补
- B.脏病多实，五脏宜泻
- C.腑病多虚，六腑宜泻
- D.腑病多实，六腑宜补
- E.脏病多实，五脏宜补

答案:A

解析:一般说来，病理上“脏病多虚”，“腑病多实”；治疗上“五脏宜补”，“六腑宜泻”。

7.与血液生成及运行关系密切的是

- A.心与肺
- B.心与肾
- C.心与脾
- D.脾与肝
- E.肺与肝

答案:C

解析:心主血而脾生血，心主行血而脾主统血。心与脾的关系，主要表现在血液生成方面的相互为用及血液运行方面的相互协同。

8.在肾主闭藏的功能活动中，最具有生理意义的是

- A.纳气归肾，促进元气之生成
- B.固摄二便，防止二便之失禁
- C.固摄水液，防止水液无故流失
- D.固摄精气，防止精气无故散失
- E.摄纳阳气，防止阳气浮越于上

答案:D

解析:肾主闭藏，是肾的藏精、主纳气、主生殖和主二便等功能的高度概括。其中，肾所封藏之精，是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质，是生命之本原，是脏腑形体官窍功能活动的物质基础，故肾藏精、固摄精气的功能最具生理意义。

9.“一运一纳，化生精气”指的是

- A.脾与胃的关系
- B.肺与大肠的关系
- C.肝与胆的关系



D.肾与膀胱的关系

E.肺与肾的关系

答案:A

解析:脾主运化,胃主受纳,受纳与运化相辅相成。二者一纳一运,紧密配合,完成饮食物的消化吸收,正如《景岳全书》说:“胃司受纳,脾司运化,一运一纳,化生精气。”

10.临床出现自汗多尿,是气的哪一种功能减退的表现

A.推动与调控作用

B.温煦与凉润作用

C.防御作用

D.固摄作用

E.中介作用

答案:D

解析:气具有固摄汗液、尿液、唾液、胃液、肠液,控制其分泌量、排泄量,使其有度而规律地排泄,防止其过多排出及无故流失所以临床上出现自汗多尿是气固摄作用功能的减退。气的推动作用是指阳气的激发、兴奋、促进等作用;气的调控作用,是指阴气的减缓、抑制、宁静等作用。气的温煦作用,是指阳气的促进产热,消除寒冷,使人体温暖的作用。气的防御作用,气既能护卫肌表,防御外邪入侵,同时也可以祛除侵入人体内的病邪。气的中介作用,主要指气能感应传导信息以维系机体的整体联系。

11.循行于上肢内侧中线的经脉是

A.手太阳经

B.手少阳经

C.手厥阴经

D.手少阴经

E.手太阴经

答案:C

解析:手经循行于上肢,足经循行于下肢;阳经循行于四肢外侧,阴经循行于四肢内侧;分布于四肢内侧前缘的称太阴经;分布于四肢内侧中间的称厥阴经;分布于四肢内侧后缘的称少阴经;分布于四肢外侧前缘的称阳明经;分布于四肢外侧中间的称少阳经;分布于四肢外侧后缘的称太阳经。

12.内踝上8寸以上,循行于下肢内侧前缘的经脉是

A.足少阳胆经

B.足少阴肾经

C.足太阳膀胱经

D.足太阴脾经

E.足阳明胃经

答案:D

解析:下肢内侧,内踝尖上八寸以下为厥阴在前,太阴在中,少阴在后;内踝尖上八寸以上则太阴在前,厥阴在中,少阴在后;下肢外侧为阳明在前,少阳在中,太阳在后。

13.在血液和精神情志方面关系密切的两脏是

A.心与肺

B.心与肾

C.心与脾

D.心与肝

E.肺与脾

答案:D

解析:心主行血,肝主藏血;心主神志,肝主疏泄、调畅情志。因此,心与肝的关系,主要表现在行血与藏血以及精神调节两个方面。

14.“决渎之官”指的是

- A.胆
- B.胃
- C.小肠
- D.三焦
- E.膀胱

答案:D

解析:津液自胃肠经三焦下渗膀胱,三焦水道通畅,则津液源源不断渗入膀胱,成为尿液生成之源。《素问·灵兰秘典论》说:“三焦者,决渎之官,水道出焉。”

15.小肠的生理功能,描述不正确的是

- A.主受盛化物
- B.主泌别清浊
- C.主液
- D.主津
- E.吸收水谷精微和津液

答案:D

解析:小肠的生理功能包括:①主受盛化物,小肠接受由胃腑下传的食糜而盛纳之,即受盛作用;由脾气对食糜进一步消化,化为精微和糟粕两部分,即化物作用。②主泌别清浊,指小肠中的食糜在作进一步消化的过程中,随之分为清浊两部分:清者,即水谷精微和津液,由小肠吸收,经脾气的转输输布全身;浊者,即食物残渣和部分水液,经胃和小肠之气的作用通过阑门传送到大肠。③小肠主液。

16.与女子月经来潮关系最密切的是

- A.肾阳
- B.脾阳
- C.天癸
- D.冲脉
- E.任脉

答案:C

解析:天癸,是肾精肾气充盈到一定程度时体内出现的一种精微物质,有促进生殖器官发育成熟、女子月经来潮及排卵、男子精气溢泻,因而具备生殖能力的作用。女子胞的发育成熟、月经按时来潮及其后定期排卵,与天癸的来至和其对胞宫的作用有极其密切的关系。

17.下列各项,与机体易感外邪的原因密切相关的是

- A.气推动的功能减弱
- B.气温煦的功能减弱
- C.气营养的功能减弱
- D.气固摄的功能减弱
- E.气防御的功能减弱

答案:E

解析:气的防御功能,气既能护卫肌表,防御外邪入侵,同时也可以祛除侵入人体内的病邪。若气防御功能减弱,邪气易于侵入机体,使机体易感外邪。

18.在奇经八脉中,其循行多次与手、足三阳经及阳维脉交会的是



- A.冲脉
- B.任脉
- C.督脉
- D.阴维脉
- E.阳跷脉

答案:C

解析:督脉循行于背部正中,背为阳,多次与手、足三阳经及阳维交会,起总督一身阳气的作用,而其他经脉不具备此特点。

19.手三阳经的走向为

- A.从头走足
- B.从足走腹
- C.从胸走手
- D.从手走头
- E.从手走足

答案:D

解析:十二经脉的走向,《灵枢·逆顺肥瘦》说:“手之三阴,从脏走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹。”

20.患者,男,40岁。腰酸膝软,眩晕耳鸣,精神萎靡,性机能减退,并有遗精、早泄。其病因是

- A.劳力过度
- B.房劳过度
- C.劳神过度
- D.思虑过度
- E.安逸过度

答案:B

解析:若房事不节则肾精、肾气耗伤,根本动摇,常见如腰膝酸软、眩晕耳鸣、精神萎靡、性机能减退等。《素问·生气通天论》说:“因而强力,肾气乃伤,高骨乃坏。”妇女早孕多育,亏耗精血,累及冲任及胞宫,易致月经失调,带下过多等妇科疾病。

21.二便失禁,滑精阳痿属于

- A.喜伤
- B.怒伤
- C.思伤
- D.悲伤
- E.恐伤

答案:E

解析:喜伤心、怒伤肝、思伤脾、悲伤肺、恐伤肾。恐,是一种胆怯、惧怕的心理作用。长期恐惧或突然意外惊恐,皆能导致肾气受损,肾气不固,气陷于下,故可出现二便失禁,滑精阳痿等。

22.痰浊为病,随气上逆易致

- A.流注经络,气机阻滞
- B.停滞胃腑,失于和降
- C.蒙蔽清窍,扰乱心神
- D.阻滞肺气,失于宣降
- E.留滞脏腑,升降失常

答案:C

解析:痰饮致病,随气上逆,易于蒙蔽清窍,扰乱心神,致使心神活动失常,出现头晕目眩、精神不振等。

23.肝阳上亢所致的中风,所属发病类型是

- A.感邪即发
- B.徐发
- C.伏而后发
- D.继发
- E.复发

答案:D

解析:继发首先本身有原发疾病,并且所产生的新的疾病与原发病在病理上有密切联系。而肝阳上亢所致的中风属于在中风之前就有肝阳上亢,后来又继发了中风,肝阳上亢又是中风的病因。

24.外邪侵袭是否发病在于

- A.正气的强弱
- B.邪气的盛衰
- C.阴阳之气的盛衰
- D.气血的盛衰
- E.脏腑功能的盛衰

答案:A

解析:邪气侵入机体,正气必然会与之抗争。若正气强盛,抗邪有力,则病邪难以入侵,故不发病。或虽邪气已经进入,但正气盛,能及时抑制或消除邪气的致病力,亦不发病。

25.热者寒之属于

- A.正治、逆治
- B.反治、从治
- C.正治、从治
- D.反治、逆治
- E.标本同治

答案:A

解析:正治指采用与疾病的证候性质相反的方药以治疗的一种原则。适用于疾病的征象与其本质相一致的病证。由于采用的方药与疾病证候性质相逆,如热证用寒药,故又称“逆治”。包括寒者热之、热者寒之、虚者补之、实者泻之。

26.湿热熏蒸的面色是

- A.黄而鲜明
- B.黄如烟熏
- C.苍黄
- D.淡黄消瘦
- E.淡黄浮肿

答案:A

解析:黄色,主虚证,湿证。黄而鲜明如橘子色者,属“阳黄”,因湿热熏蒸所致。黄如烟熏即黄而晦暗如烟熏者,属“阴黄”,因寒湿郁阻所致。苍黄,即黄中透青,因肝郁脾虚所致。淡黄消瘦,多因胃病虚热所致。淡黄浮肿,即“黄胖”,多因脾气虚衰,湿邪内阻所致。

27.四肢皮肤出现白斑,其临床意义是

- A.脾虚湿困,血瘀气滞

- B.阴津耗伤，营血亏虚
- C.风湿侵袭，气血失和
- D.外感风热，热入营血
- E.湿热蕴结，复感风邪

答案:C

解析：“四肢、面部等处出现白斑，大小不等，界限清楚，病程缓慢者，为白驳风，多因风湿侵袭，气血失和，血不荣肤所致”。脾虚湿困，血瘀气滞可见黄疸。阴津耗伤，营血亏虚可见皮肤干燥。外感风热，热入营血可见疹，常见于麻疹、风疹、瘾疹等病。湿热蕴结，复感风邪可见湿疹。

28.垂危病人突然出现神清多语、两颧泛红如妆、意欲进食的表现的是

- A.神乱
- B.少神
- C.失神
- D.假神
- E.得神

答案:D

解析：“望神就是观察人体生命活动的整体表现来判断病情的方法。假神，临床表现为原本目光晦滞，突然目似有光，但却浮光外露；本为面色晦暗，一时面似有华，但为两颧泛红如妆；本已神昏或精神极度萎靡，突然神识似清，想见亲人，言语不休，但精神烦躁不安；原本身体沉重难移，忽思起床活动，但不能自己转动；本来毫无食欲，久不能食，突然索食，且食量大增等。

29.唇边生疮，红肿疼痛多为

- A.燥热津伤
- B.阴虚火旺
- C.心脾积热
- D.胃火亢盛
- E.湿热熏蒸

答案:C

解析:唇之形态：①口唇干裂为津液损伤，多属燥热伤津或阴虚液亏。②口唇糜烂多为脾胃积热上蒸。③唇内溃烂，其色淡红为虚火上炎。④唇边生疮，红肿疼痛为心脾积热。⑤唇角生疔，麻木痒痛，多为锁口疔；人中部生疔，多为人中疔。⑥人中满唇反：久病而人中沟变平，口唇翻卷不能覆齿，称“人中满唇反”，为脾气将绝，属病危。

30.下列哪项不是邪盛失神的临床表现

- A.神昏谵语
- B.喉中痰鸣
- C.两手握固
- D.呼吸气微
- E.牙关紧闭

答案:D

解析:邪盛失神的临床表现：神昏谵语，躁扰不宁；或壮热神昏，呼吸气粗，喉中痰鸣；或猝然昏倒，双手握固，牙关紧闭等。

31.阳虚湿盛的舌象是

- A.舌红苔白滑
- B.舌淡嫩苔白滑



- C.舌边红苔黑润
- D.舌红瘦苔黑
- E.舌绛苔黏腻

答案:B

解析:舌红多为湿热或阴虚,苔白滑为外感寒湿或脾肾阳虚,水湿内停。舌淡嫩为阳虚水湿内停,苔白滑为外感寒湿或脾肾阳虚,水湿内停,舌淡嫩苔白滑为阳虚湿盛。舌边红多为肝经有热,苔黑润为寒湿内盛所致。舌红瘦为阴虚火旺,苔黑为阴寒内盛或里热炽盛。舌绛为里热亢盛或阴虚火旺,苔黏腻为湿浊所致。

32.邪入营血证的舌象是

- A.舌色淡红
- B.舌质淡白
- C.舌质绛红
- D.舌质紫暗
- E.舌起粗大红刺

答案:C

解析:舌质绛红多因热入营血,气血沸腾,耗伤营阴,血液浓缩而瘀滞,虚火上炎,舌体脉络充盈所致;故邪入营血证可见舌质绛红。舌色淡红为气血调和的征象。舌质淡白多因气血亏虚,血不荣舌,或阳气虚衰,运血无力,不载血以上充舌质所致;故淡白舌主气血两虚、阳虚,非邪入营血证。舌质紫暗多因气血运行不畅所致;故舌质紫暗主血气瘀滞。舌起粗大红刺多因热毒炽盛,深入血分所致;故舌起粗大红刺主脏腑热极,或为血分热盛。

33.郑声的病因多为

- A.心气大伤
- B.心气不足
- C.痰火扰心
- D.风痰阻络
- E.热扰心神

答案:A

解析:郑声指神识不清,语言重复,时断时续,语声低弱模糊的症状。多因久病心气大伤,精神散乱所致,属虚证。因心气不足,神失所养,多可见独语。因痰火扰心,多可见狂证。因风痰阻络,多可见语言謇涩。因热扰心神,多可见谵语。

34.下列除哪项外,均可出现口臭

- A.龋齿
- B.心火
- C.胃热
- D.宿食
- E.内痈

答案:B

解析:口臭是指从口中散发臭气者。口臭多与口腔不洁、龋齿、便秘或消化不良有关。故龋齿可见口臭。口气臭秽者,多属胃热。故胃热可见口臭。口气酸臭,并伴食欲不振,脘腹胀满者,多属食积胃肠。故宿食可见口臭。口气腐臭,或兼咳吐脓血者,多是内有溃腐脓疡。故内痈可见口臭。心火可见口舌生疮非口臭。

35.下列各项,不能导致妇女月经先期的是

- A.肾气不足
- B.阳盛血热





- C.营血亏损
- D.阴虚火旺
- E.脾气亏虚

答案:C

解析:肾气不足,冲任不固,不能制约经血,可致月经先期。阳盛血热,热扰冲任、胞宫,迫血下行,可致月经先期。营血亏损,冲任不充,血海不能按时满溢,可致月经后期。阴虚火旺则虚热内生,热伏冲任,血海不宁,可致月经先期。脾气亏虚则中气虚弱,冲任不固,经血失统,可致月经先期。

36.自汗、盗汗并见,其病机是

- A.精血亏虚
- B.阴阳两虚
- C.阳气不足
- D.津液不足
- E.肾阴不足

答案:B

解析:精血亏虚,化汗乏源,可致里证无汗。阴虚则内热,入睡则卫阳由表入里,肌表不固,内热加重,蒸津外泄而汗出,见盗汗。自汗常见于气虚证和阳虚证,阳虚多在气虚的基础上发展而来。阳气亏虚,不能固护肌表,玄府不密,津液外泄,可见自汗,故自汗可见于气阴两虚证和阴阳两虚证。阳气不足,不能固护肌表,玄府不密,津液外泄,可见自汗。津液不足,化汗乏源,可见少汗或无汗。

37.渴不多饮,身热不扬,多属

- A.阳明腑实
- B.阴虚内热
- C.湿热内蕴
- D.热入营血
- E.血瘀发热

答案:C

解析:渴不多饮,兼身热不扬,心中烦闷,苔黄腻者,属湿热证。因热邪伤津则口渴,体内有湿故不多饮。日晡潮热为阳明腑实证。口渴咽干,夜间尤甚,颧赤盗汗,五心烦热者,是阴虚津亏,虚火内炽的表现。渴不多饮,兼身热夜甚,心烦不寐,舌红绛者,属温病营分证。口干,但欲漱水不欲咽,兼面色黧黑,或肌肤甲错者,为淤血的表现。

38.以下哪项不是便秘的常见原因

- A.胃肠积热
- B.食滞胃肠
- C.阳虚寒凝
- D.阴津亏损
- E.腹内癥块

答案:B

解析:便秘可因热结肠道,或津液亏少,或阴血不足,导致肠道燥化太过,肠失濡润,传导不利所致;也可因气虚传送无力,或阳虚寒凝,传化乏力,肠道气机滞塞所致。

39.濡脉与弱脉的主要不同点,在于

- A.脉位的浮沉
- B.脉力的大小
- C.脉形的长短



D.脉率的快慢

E.脉律的齐否

答案:A

解析:濡脉的脉象特点是位浮、形细、势软;弱脉的脉象特点是位沉、形细、势软。故濡脉和弱脉的主要不同点在于脉位的浮沉。濡脉和弱脉的脉力都是小的。濡脉与弱脉的脉形细,非长非短。濡脉与弱脉的脉率是慢的。濡脉与弱脉脉律是整齐的。

40.切脉时三指沿寸口脉长轴循行,诊察脉之长短,比较寸关尺三部脉象特点的方法是

A.循法

B.寻法

C.总按

D.举法

E.按法

答案:A

解析:三指平布,同时用力按脉,称为总按,目的是总体体会三部九候脉象;分别用一指单按其中一部脉象,重点体会某一部脉象特征,称为单按;用指轻按在皮肤上称为举,又称为浮取或轻取;用指重按在筋骨间,称为按,又称为沉取或重取;指力从轻到重,从重到轻,左右前后推寻,以寻找脉动最明显的特征,称为寻。切脉时三指沿寸口脉长轴循行,诊察脉之长短,比较寸关尺三部脉象特点为循法。

41.腹胀满,无压痛,叩之作空声,可见于

A.水臌

B.气胀

C.痰饮

D.积聚

E.内痈

答案:B

解析:气胀属鼓胀的一类,气胀为一手轻轻叩拍腹壁,另一手无波动感,以手叩击如击鼓之膨膨然,腹胀满却无压痛,叩之有空声。水鼓也属于鼓胀的一类,一手轻轻叩拍腹壁,另一手有波动感,按之如囊裹水者。胃中有痰饮者,腕部按之有形而胀痛,推之辘辘有声。凡腹部肿块推之不移,肿块痛有定处者,为积,病属血分;肿块推之可移,或痛无定处,聚散不定者,为聚,病属气分。腹部肿胀拒按,多为内痈。

42.虚里按之其动微弱者属于

A.心阳不足

B.心肺气绝

C.宗气内虚

D.外感热邪

E.惊恐所致

答案:C

解析:虚里按诊内容包括有无搏动、搏动部位及范围、搏动强度和节律、频率、聚散等,以了解宗气之强弱、疾病之虚实、预后之吉凶,尤其当危急病证寸口脉不明显时,诊虚里更具有重要的诊断价值。虚里按之其动微弱者为宗气内虚,或饮停心包之支饮。

43.能缓和拘急疼痛的药物大多具有的药味是

A.苦味

B.咸味

C.辛味

D.甘味

E.酸味

答案:D

解析:甘味能补、能和、能缓,具有补益,和中、调和药性和缓急止痛的作用。

44.七情配伍中,具有协同作用能提高药效的配伍方法是

A.相须、相使

B.相须、相畏

C.相须、相杀

D.相使、相畏

E.相使、相杀

答案:A

解析:七情除单行外,相须、相使可以起到协同作用,能提高药效,是临床常用的配伍方法;相畏、相杀可以减轻或消除毒副作用,以保证安全用药,是使用毒副作用较强药物的配伍方法,也可用于有毒药物的炮制及中毒解救。

45.下列除哪味药物外,均是妊娠禁用药物

A.牵牛

B.桃仁

C.巴豆

D.莪术

E.水蛭

答案:B

解析:妊娠禁忌药的分类与使用原则①禁用药物指毒性较强或药性猛烈的药物,如巴豆、牵牛子、大戟、商陆、麝香、三棱、莪术、水蛭、斑蝥、雄黄、砒霜等。②慎用的药物包括通经祛瘀、行气破滞及辛热滑利之品,如桃仁、红花、牛膝、大黄、枳实、附子、肉桂、干姜、木通、冬葵子、瞿麦等。慎用的药物可以根据病情需要酌情使用,禁用的药物绝对不能使用。

46.车前子、旋覆花入汤剂宜

A.久煎

B.先煎

C.布包煎

D.另行熔化

E.另煎

答案:C

解析:包煎:主要指那些黏性强、粉末状及带有绒毛的药物,宜先用纱布袋装好,再与其他药物同煎,以防止药液混浊或刺激咽喉引起咳嗽及沉于锅底,加热时引起焦化或糊化。如蛤粉、滑石、青黛、旋覆花、车前子、蒲黄及灶心土等。

47.下列具有透疹功效的药物是

A.桂枝、柴胡、辛夷

B.升麻、葛根、香薷

C.升麻、柴胡、藁本

D.薄荷、葛根、升麻

E.荆芥、麻黄、薄荷

答案:D

解析:薄荷、葛根、升麻都属于发散风热药。薄荷的功效是疏散风热,清利头目,利咽透疹,疏肝行气;葛根的功效是解肌退热,透疹,生津止渴,升阳止泻;升麻的功效是解表透疹,

清热解毒，升举阳气，三味药均具有透疹功效。桂枝、柴胡、辛夷三味药无透疹之功，香薷无透疹之功，柴胡和藁本无透疹之功，麻黄无透疹之功。

48.具有明目，息风止痉功效的药物是

- A.钩藤
- B.熊胆
- C.水牛角
- D.决明子
- E.夏枯草

答案:B

解析:熊胆粉(熊胆)性味苦寒，清热解毒之效颇佳，又能消散痈肿，故常用于热毒蕴结所致之疮疡痈疽、痔疮肿痛、咽喉肿痛等，且本品主入肝经，又善于清肝明目退翳，故可用治肝热目赤肿痛，羞明流泪，目生翳膜等症。

49.青蒿的功效是

- A.退虚热，除疳热，清湿热
- B.清热凉血，活血解毒，透疹消斑
- C.清热凉血，解毒，定惊
- D.清虚热，除骨蒸，解暑热
- E.清热凉血，利尿通淋，解毒疗疮

答案:D

解析:青蒿属于清虚热药。青蒿的功效是清透虚热，凉血除蒸，解暑，截疟，无除疳热、清湿热的功效。

50.治疗湿热黄疸，应首选的药物是

- A.夏枯草
- B.淡竹叶
- C.马齿苋
- D.地骨皮
- E.龙胆草

答案:E

解析:龙胆草应用于湿热黄疸，阴肿阴痒，带下，湿疹瘙痒，肝火头痛，目赤肿痛，耳鸣耳聋，胁痛口苦，强中，惊风抽搐。

51.桑寄生、五加皮除均可祛风湿外，还具有的功效是

- A.清热安胎
- B.利尿消肿
- C.定惊止痉
- D.温通经络
- E.补肝肾，强筋骨

答案:E

解析:桑寄生祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎；五加皮祛风湿，补肝肾，强筋骨，利水。桑寄生、五加皮除均可祛风湿外，还能补肝肾、强筋骨。

52.具有敛肺止咳，利咽开音的药物是

- A.五味子
- B.五倍子
- C.五加皮
- D.椿皮

E.诃子

答案:E

解析:诃子功效:涩肠止泻,敛肺止咳,利咽开音。

53.补气养血药中加入适量肉桂,其主要目的是

- A.引火归原
- B.鼓舞气血生长
- C.散寒止痛
- D.补而不滞
- E.补气

答案:B

解析:久病体虚气血不足者。在补益气血方中加入少量肉桂,可鼓舞气血生长。

54.以下除哪项外均是陈皮的功效

- A.理气
- B.健脾
- C.燥湿
- D.疏肝
- E.化痰

答案:D

解析:陈皮功效:理气健脾,燥湿化痰。

55.以下哪组药均可用于治疗水火烫伤

- A.地榆、槐角、小蓟
- B.地榆、大黄、虎杖
- C.大黄、芒硝、丹参
- D.黄芩、黄连、黄柏
- E.紫草、地榆、郁金

答案:B

解析:地榆苦寒能泻火解毒,味酸涩能敛疮,为治水火烫伤之要药,可单味研末麻油调敷,或配大黄粉,或配黄连、冰片研末调敷;用治湿疹及皮肤溃烂,可以浓煎外洗,或用纱布浸药外敷,亦可配煅石膏、枯矾研末外掺患处;大黄治烧烫伤,可单用粉,或配地榆粉,用麻油调敷患处;虎杖治水火烫伤,痈肿疮毒,毒蛇咬伤。本品入血分,有凉血清热解毒作用。

56.具有息风镇痉、攻毒散结、通络止痛功效的药物是

- A.全蝎、蜈蚣
- B.地龙、僵蚕
- C.龙骨、牡蛎
- D.石决明、决明子
- E.天麻、钩藤

答案:A

解析:全蝎、蜈蚣的功效都是息风止痉,攻毒散结,通络止痛,两味药相须有协同增效作用,与题意相符。地龙与僵蚕都有息风之效;天麻与钩藤都有平息肝风止痉之效;龙骨与牡蛎都有重镇安神、平肝潜阳、收敛固涩之效,石决明与决明子都有清肝明目之效。

57.治疗血瘀经闭,癥瘕,应首选的药物是

- A.酸枣仁
- B.石菖蒲
- C.僵蚕

D.麝香

E.冰片

答案:D

解析:麝香具有开窍醒神,活血通经,消肿止痛的功效,可用于闭证神昏;疮疡肿毒,瘰疬痰核;血瘀经闭,癥瘕。

58.上述反佐药涵义的表述,正确的是

A.针对主病或主证起主要治疗作用

B.针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用

C.针对次要兼证起直接治疗作用

D.消减或制约君、臣药的毒性和峻烈之性

E.防止病重邪甚时药病格拒

答案:E

解析:针对主病或主证起主要治疗作用的为君药。针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用为臣药。针对次要兼证起直接治疗作用为佐助药。消减或制约君、臣药的毒性和峻烈之性的为佐制药。防止病重邪甚时药病格拒的为反佐药。

59.桂枝汤服已须臾,啜热稀粥的意义是

A.防止脾胃受损

B.滋汗源,以防伤阴

C.滋汗源,以防伤阳

D.助汗并祛除外邪

E.既防亡阴又防亡阳

答案:D

解析:桂枝汤中五味药配伍发中有补,散中有收,邪正兼顾,阴阳并调。服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力,借水谷之精气,充养中焦,不但易为酿汗,更可使外邪速去而不致复感。

60.大承气汤用治热厥,体现的治法是

A.通因通用

B.寒因寒用

C.热因热用

D.塞因塞用

E.以泻代清

答案:B

解析:大承气汤用治热厥,体现的治法是寒因寒用。通因通用之法在芍药汤中应用。热因热用之法在白通汤中应用。塞因塞用之法在半夏泻心汤中使用。以泻代清之法在凉膈散中使用。

61.手足不温,腹痛,泄利下重,脉弦者,治宜选用

A.健脾丸

B.保和丸

C.四逆散

D.痛泻要方

E.葛根黄芩黄连汤

答案:C

解析:手足不温,腹痛,泄利下重,脉弦为阳郁厥逆证,是因外邪传经入里,气机郁遏,不得疏泄,导致阳气内郁,不能达于四末的假外寒证。四逆散功能透邪解郁,疏肝理脾主治阳郁厥逆证和肝脾气郁证。

62.香薷散的功用是

- A.祛暑解表，化湿和中
- B.祛暑解表，清热化湿
- C.清暑解热，化气利湿
- D.清暑化湿，理气和中
- E.祛暑化湿，健脾和中

答案:A

解析:香薷散祛暑解表、化湿和中，主治夏月乘凉饮冷，外感于寒，内伤于湿。

63.葛根黄芩黄连汤中配伍黄芩的用意是

- A.和解清热
- B.清热燥湿
- C.清热止血
- D.清热安胎
- E.凉血解毒

答案:B

解析:葛根黄芩黄连汤中以苦寒之黄连、黄芩为臣，清热燥湿，厚肠止利。黄芩的功效，清热燥湿、泻火解毒、止血、安胎。因此，主要取清热燥湿的功效。

64.桑螵蛸散与天王补心丹两方组成中均含有的药物是

- A.龙骨、人参
- B.人参、菖蒲
- C.菖蒲、远志
- D.远志、当归
- E.当归、石斛

答案:D

解析:桑螵蛸散的组成是桑螵蛸、远志、菖蒲、龙骨、人参、茯神、当归、炙龟甲（人参汤调下）。方歌：桑螵蛸散用龙龟，参苓菖远及当归；尿频遗尿精不固，滋肾宁心法勿违。天王补心丹组成是人参、茯苓、玄参、丹参、桔梗、远志、当归、五味、麦门冬、天门冬、柏子仁、炒酸枣仁、生地、朱砂、竹叶。方歌：补心丹用柏枣仁，二冬生地当归身；三参桔梗朱砂味，远志茯苓养心神。

65.下列方剂组成药物中含有石膏与知母的是


- A.大定风珠
- B.消风散
- C.川芎茶调散
- D.地黄饮子
- E.羚角钩藤汤

答案:B

解析:大定风珠：鸡子黄，再合加减复脉汤，三甲并同五味子，滋阴熄风是妙方。加减复脉汤：炙甘草、干地黄、生白芍、麦冬、阿胶、麻仁。消风散：当归、生地、防风、蝉蜕、知母、苦参、胡麻仁、荆芥、苍术、牛蒡子、石膏、甘草木通。川芎茶调散：薄荷、川芎、荆芥、羌活、白芷、防风、细辛、炙甘草、细茶末。地黄饮子：熟地黄、巴戟天、山茱萸、石斛、肉苁蓉、附子、五味子、官桂、白茯苓、麦门冬、石菖蒲、远志、生姜、大枣、薄荷。羚角钩藤汤：羚羊角、钩藤、桑叶、菊花、茯神、地黄，贝母、甘草、竹茹、芍药。

66.适宜用开窍剂治疗的症候是

- A.阳明腑实，神昏谵语



- B.阴虚风动，神倦瘵痲
- C.痰热扰神，谵语如狂
- D.热陷心包，窍闭神昏
- E.火毒扰神，错语不眠

答案:D

解析:热陷心包，窍闭神昏，治益清心凉营，开窍醒神，故选用开窍药。阳明腑实，神昏谵语，治宜清热泻火，故选用泻下药。阴虚风动，神倦瘵痲由肝阴虚引起，治益滋养阴液，故选用补阴药。痰热扰神，谵语如狂，本症见于痰火内盛，闭扰心神之痰火扰神证，故应选用清热化痰药。火毒扰神，错语不眠，治益清解火热毒邪，故选用清热解毒药。

67.百合固金汤中的玄参是

- A.君药
- B.臣药
- C.佐药
- D.使药
- E.佐使药

答案:B

解析:方中百合、麦冬相合，润肺止咳，清虚火而固肺金，共为君药；生地、熟地、玄参壮水制火，兼凉血止血，又能润燥利咽，合为臣药；君臣相配，有金水相生之妙用。当归、白芍相配，能够养血补肝，柔肝疏肝，贝母化痰止咳，桔梗载药上行，俱为佐药；甘草调药为使。全方滋养肺肾，有金水相生之用，有兼以柔肝疏肝，寓五行制化之理。

68.主治风痰上扰证的方剂是

- A.二陈汤
- B.定喘汤
- C.大定风珠
- D.大秦芩汤
- E.半夏白术天麻汤

答案:E

解析:主治风痰上扰证的是半夏白术天麻汤。二陈汤主治湿痰证。定喘汤主治风寒外束，痰热内蕴证。大定风珠主治阴虚风动证。大秦芩汤主治风邪初中经络证。

69.下列各项，不属于保和丸组成药物的是

- A.山楂
- B.麦芽
- C.半夏
- D.茯苓
- E.神曲

答案:B

解析:保和丸的组成有山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子，没有麦芽。

70.白术与苍术并用的方剂是

- A.健脾丸
- B.完带汤
- C.参苓白术散
- D.藿香正气散
- E.九味羌活汤

答案:B





解析:完带汤的药物组成:白术、山药、人参、白芍、车前子、苍术、甘草、黑芥穗、柴胡。

71.下列各项,不属苏合香丸主治证候的是

- A.心腹卒痛
- B.高热烦躁
- C.牙关紧闭
- D.苔白
- E.脉迟

答案:B

解析:苏合香丸主治寒闭证。症见突然昏倒,牙关紧闭,不省人事,苔白,脉迟。亦治心腹卒痛,甚则昏厥,属寒凝气滞者。

72.半夏厚朴汤中,体现“治痰不理脾胃非其治也”的药物是

- A.半夏
- B.厚朴
- C.茯苓
- D.生姜
- E.苏叶

答案:C

解析:虽然痰饮的生成与肺的宣肃通调、肾的蒸化水液,以及三焦津液的通道等功能失常有关,但脾不健运是重要的一环,故临床治疗痰饮当时注意调理脾胃,除其生痰之源。脾为生痰之源,肺为贮痰之器,茯苓渗湿健脾,以助半夏化痰。半夏为君药辛温入肺胃,化痰散结,降逆和胃。厚朴下气除满,助半夏散结降逆。生姜为佐药辛温散结,和胃止呕,且制半夏之毒。苏叶芳香行气,理肺舒肝,助厚朴行气宽胸,宣通郁结之气。

73.具有温肺化饮功用的方剂是

- A.半夏白术天麻汤
- B.苏子降气汤
- C.半夏厚朴汤
- D.苓甘五味姜辛汤
- E.二陈汤

答案:D

解析:苓甘五味姜辛汤具有温肺化饮的功效,主治寒饮咳嗽。半夏白术天麻汤具有化痰息风,健脾祛湿的功效。苏子降气汤具有降气平喘,祛痰止咳的功效。半夏厚朴汤具有行气散结,降逆化痰的功效。二陈汤具有燥湿化痰,理气和中的功效。

74.乌梅丸可出现的临床表现是

- A.久泻久痢
- B.渴欲饮冷
- C.赤多白少
- D.里急后重
- E.肛门灼热

答案:A

解析:乌梅丸具有温脏安蛔的功效,主治脏寒蛔厥证,其临床表现为脘腹阵痛,烦闷呕吐,时发时止,得食则吐,甚则吐蛔,手足厥冷;或久泻久痢。渴欲饮冷是里热炽盛的表现。赤多白少、里急后重是热毒血痢的临床表现。肛门灼热是大肠湿热的临床表现。

75.下列方剂组成药物中,不含有附子的是

- A.实脾散

- B.真武汤
- C.乌梅丸
- D.温脾汤
- E.阳和汤

答案:E

解析:实脾散的药物组成:厚朴、白术、木瓜、木香、草果、大腹子、附子、茯苓、干姜、甘草。真武汤的药物组成:茯苓、芍药、白术、生姜、附子。乌梅丸的药物组成:乌梅、细辛、干姜、黄连、当归、附子、蜀椒、桂枝、人参、黄柏。温脾汤的药物组成:大黄、附子、干姜、人参、当归、芒硝、甘草。阳和汤的药物组成:熟地、肉桂、麻黄、鹿角胶、白芥子、姜炭、生甘草。阳和汤中不含附子。

76.主治胸中血瘀证的是

- A.小活络丹
- B.血府逐瘀汤
- C.酸枣仁汤
- D.炙甘草汤
- E.失笑散

答案:B

解析:血府逐瘀汤主治胸中血瘀证。

77.外感风邪头痛、头风,治宜选用

- A.消风散
- B.二陈汤
- C.川芎茶调散
- D.天麻钩藤饮
- E.半夏白术天麻汤

答案:C

解析:川芎茶调散主治外感风邪头痛。消风散主治风疹、湿疹,不能用于治疗外感风邪头痛、头风。二陈汤主治湿痰证,不能用于治疗外感风邪头痛、头风。天麻钩藤饮主治肝阳偏亢,肝火上扰证,不能用于治疗外感风邪头痛、头风。半夏白术天麻汤主治风痰上扰证,不能用于治疗外感风邪头痛、头风。趣记:川芎茶调散薄荷老戒放枪,穷仔细。一一薄荷老芥防羌,芎芷细。

78.下列病证中不宜使用下法治疗的是

- A.宿食
- B.结痰
- C.积水
- D.蓄血
- E.痞块

答案:E

解析:痞块用消法。消法与下法均可消除有形之邪,但两者作用不同。下法是在燥屎、瘀血、停痰、留饮等有形实邪必须急于排除,且有可能排除的情况下使用;消法则是在慢性的积聚,尤其是气血积聚而成的痞块,不可能且无条件排除的时候采用。下法是猛攻急下,消法是渐消缓散,方法不同,用药也各异。

79.下列方剂中,麻黄用量最大的是

- A.麻黄汤
- B.麻杏甘石汤

- C.葛根汤
- D.大青龙汤
- E.小青龙汤

答案:D

解析:大青龙汤麻黄六两最多。麻黄汤麻黄三两。麻黄杏仁甘草石膏汤麻黄四两。葛根汤麻黄三两。小青龙汤麻黄三两。

80.芍药汤与白头翁汤的组成中均含有的药物是

- A.黄芩
- B.黄连
- C.黄柏
- D.大黄
- E.秦皮

答案:B

解析:芍药汤的组成为芍药,当归,黄连,槟榔,木香,甘草,大黄,黄芩,官桂。白头翁汤的组成为白头翁,黄柏,黄连,秦皮。而两方的组成中均含有的药物是黄连。

81.炙甘草汤中配伍桂枝、生姜的主要用意是

- A.温阳化气
- B.温经散寒
- C.温经通脉
- D.通阳复脉
- E.通阳化气

答案:D

解析:炙甘草汤中炙甘草、人参、大枣益心气,补脾气,以资气血生化之源;阿胶、麦冬、麻仁滋阴,养心血,充血脉,共为臣药。佐以桂枝、生姜辛行温通,温心阳,通血脉,诸厚味滋腻之品得姜、桂则滋而不腻。用法中加清酒煎服,以清酒辛热,可温通血脉,以行药力,是为使药。诸药合用,滋而不腻,温而不燥,使气血充足,阴阳调和,则心动悸、脉结代,皆得其平。

82.下列各项,属天王补心丹组成药物的是

- A.西洋参
- B.元参
- C.沙参
- D.党参
- E.苦参

答案:B


解析:天王补心丹的组成为人参,茯苓,元参,丹参,桔梗,远志,当归,五味,麦门冬,天门冬,柏子仁,酸枣仁,生地黄。以上选项中只有元参是天王补心丹中的药物。

83.适宜用开窍剂治疗的症候是

- A.阳明腑实,神昏谵语
- B.阴虚风动,神倦瘵疢
- C.瘀热扰神,谵语如狂
- D.热陷心包,窍闭神昏
- E.火毒扰神,错语不眠

答案:D

解析:热陷心包,窍闭神昏,治益清心凉营,开窍醒神,故选用开窍药。阳明腑实,神昏谵



语，治宜清热泻火，故选用泻下药。阴虚风动，神倦癡瘖由肝阴虚引起，治益滋养阴液，故选用补阴药。痰热扰神，谵语如狂，本症见于痰火内盛，闭扰心神之痰火扰神证，故应选用清热化痰药。火毒扰神，错语不眠，治益清解火热毒邪，故选用清热解毒药。

84.下列方剂组成药物中含有石膏与知母的是

- A.大定风珠
- B.消风散
- C.川芎茶调散
- D.地黄饮子
- E.羚角钩藤汤

答案:B

解析:大定风珠：鸡子黄，再合加减复脉汤，三甲并同五味子，滋阴熄风是妙方。加减复脉汤：炙甘草、干地黄、生白芍、麦冬、阿胶、麻仁。消风散：当归、生地、防风、蝉蜕、知母、苦参、胡麻仁、荆芥、苍术、牛蒡子、石膏、甘草木通。川芎茶调散：薄荷、川芎、荆芥、羌活、白芷、防风、细辛、炙甘草、细茶末。地黄饮子：熟地黄、巴戟天、山茱萸、石斛、肉苁蓉、附子、五味子、官桂、白茯苓、麦门冬、石菖蒲、远志、生姜、大枣、薄荷。羚角钩藤汤：羚羊角、钩藤、桑叶、菊花、茯神、地黄，贝母、甘草、竹茹、芍药。

85.《医疗机构管理条例、医疗机构管理条例实施细则、麻醉药品管理法》、《医疗事故处理条例》等规范性文件，在我国卫生法律体系中，属于

- A.卫生行政法规
- B.卫生专门法律
- C.卫生法律
- D.基本法律
- E.卫生技术法规

答案:A

解析:《医疗机构管理条例、医疗机构管理条例实施细则、麻醉药品管理法》、《医疗事故处理条例》等规范性文件，在我国卫生法律体系中，属于卫生行政法规。卫生法律包括：传染病防治法、国境卫生检疫法、职业病防治法、精神卫生法、食品安全法、药品管理法、执业医师法、母婴保健法、献血法、人口与计划生育法和红十字会法。基本法律包括：宪法、刑法、民法通则、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法。我国不存在卫生专门法律和卫生技术法规。

86.下列关于卫生法的基本原则错误的是

- A.公平原则
- B.尊重原则
- C.预防为主原则
- D.卫生保护原则
- E.患者自主原则

答案:B

解析:卫生法的基本原则是指反映卫生法立法精神、适用于卫生法律关系的基本原则。主要有以下五个方面：①卫生保护原则；②预防为主原则；③公平原则；④保护社会健康原则；⑤患者自主原则。

87.下列各项，不属卫生行政处罚的是

- A.警告
- B.停止损害
- C.罚款



D.没收违法所得

E.责令停产停业

答案:B

解析:卫生行政处罚程序所指行政处罚,是指县级以上卫生行政机关依据卫生法律、法规、规章,对应受制裁的违法行为,作出的警告、罚款、没收违法所得、责令停产停业、吊销许可证以及卫生法律、行政法规规定的其他行政处罚。停止损害不属于卫生行政处罚范围。

88.除下列哪项外,其余各项均不给予执业医师注册

A.不具有完全民事行为能力

B.因受刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满1年

C.有国务院卫生行政部门规定不宜从事医疗、预防、保健业务的其他情形

D.因受刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满2年

E.受吊销医师执业证书行政处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止已满1年

答案:D

解析:执业医师注册中,有下列情形之一的,不予注册:①不具有完全民事行为能力的;②因受刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满二年的;③受吊销医师执业证书行政处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满二年的;④有国务院卫生行政部门规定不宜从事医疗、预防、保健业务的其他情形的。

89.医疗机构发现甲类传染病时,对疑似病人应依法及时采取的措施是

A.采取预防措施

B.进行医学观察

C.予以隔离治疗

D.在指定场所进行医学观察

E.确诊前在指定场所进行单独隔离治疗

答案:E

解析:医疗机构发现甲类传染病时,应当及时采取下列措施:①对病人、病原携带者,予以隔离治疗,隔离期限根据医学检查结果确定;②对疑似病人,确诊前在指定场所单独隔离治疗;③对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者,在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。

90.突发公共卫生事件严重危害

A.公众权益

B.社会公众利益

C.经济秩序

D.社会秩序

E.社会公众健康

答案:E

解析:突发公共卫生事件是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

A2型题

91.患者,男,60岁。形寒便溏,完谷不化,夜尿频多清长,下肢不温,舌质淡白,脉沉细。其舌苔应是

A.透明苔

B.白干苔

C.黄苔

D.黄膩苔

E.灰苔

答案:A

解析:先辨证,患者形寒,下肢不温,出现一派虚寒症状,脾阳虚,不能腐熟水谷,则完谷不化;脾肾阳虚,不能温化水液,则便溏,夜尿频多,故本题证型是脾肾阳虚证。而淡白舌,透明苔主病脾胃虚寒。淡白舌,白干苔主脾胃热滞,热结津伤。黄苔主热证、里证。黄膩苔主湿热或痰热内蕴,或为食积化腐所致。灰苔主阴寒内盛,或里热炽盛。患者形寒便溏、舌质淡白为虚寒证,而不是阴寒内盛的实寒证。

92.患者,男,54岁。咳嗽气粗,痰多痰黄,面赤身热,口干欲饮,舌红苔黄,脉滑数。其证候是

A.痰热郁肺

B.肺阴亏耗

C.风燥伤肺

D.风热犯肺

E.风寒袭肺

答案:A

解析:患者咳声气粗伴痰多痰黄,面赤身热,口干欲饮,舌红苔黄,脉滑数提示为痰热郁肺证。为痰热郁肺,郁久化火,火灼津液所致。B以干咳为特点。C则同时并见形体干燥失濡润的症候。D、E应同时并见表证。

93.患者,女,42岁。眩晕昏蒙,头重如裹,胸闷恶心,纳呆多寐,舌苔白膩,脉濡滑。其病机是

A.风湿

B.气虚

C.血虚

D.痰浊

E.肾虚

答案:D

解析:患者昏蒙、头重如裹,乃痰湿内阻清阳不升之象;胸闷恶心,纳呆多寐乃痰湿内阻于心胸、中焦脾胃所致。舌苔白膩,脉濡滑亦为痰湿作祟所致。

94.感冒患者,恶寒发热轻微,但以脘腹冷痛,呕吐,腹泻为主要症状,舌苔薄,脉紧。其病机是

A.寒邪伤及卫阳

B.寒邪伤及太阴

C.寒邪直中少阴

D.寒邪直中脾胃

E.寒邪伤及厥阴

答案:D

解析:患者有发热恶寒提示外邪致病,有表证。见脘腹冷痛、腹泻等为寒邪留滞胃肠,寒凝气阻、传导失司之象。故此病机为寒邪直中脾胃,表证未解。寒邪伤及卫阳以表证为主要临床表现。寒邪伤及太阴病变特点以里虚寒为主。邪直中少阴以脉微细,但欲寐为主要脉症。寒邪伤及厥阴以上热下寒为其提纲。

95.患者恶寒发热,无汗,头痛,身痛,喘咳,舌苔薄白,脉浮紧。其证候是

A.湿淫

B.暑淫

- C.寒淫
- D.风淫
- E.燥淫

答案:C

解析:根据患者临床表现,可以得出患者所患为表寒证,属于寒淫证的范畴。寒为阴邪,其性清冷,遏制并损伤阳气,寒性凝滞、收引,阻碍气血运行,郁闭肌肤,阳气失却温煦,故出现恶寒、头身疼痛、无汗、脉浮紧等症状。

96.患者曾发高热,热退而见口鼻、皮肤干燥,形瘦,目陷,唇舌干燥,舌紫绛边有瘀斑、瘀点。其病机是

- A.津液不足
- B.津亏血瘀
- C.津枯血燥
- D.津停气阻
- E.气阴两亏

答案:B

解析:津亏血瘀是津亏与血瘀并见。口鼻、皮肤干燥,形瘦,目陷,唇舌干燥,均多因高热使津液耗损过多,不能充养,濡润脏器、组织、官窍,皮肤枯瘪而缺乏弹性所致;舌紫绛边有瘀斑、瘀点,多因热毒炽盛,内入营血,营阴受灼,津液耗损,气血壅滞所致。故病机是津亏血瘀。津液不足的辨证要点以口渴尿少,口、鼻、唇、舌、皮肤、大便干燥等为主要表现,不见舌紫绛边有瘀斑、瘀点。

97.患者呕吐吞酸,暖气频繁,胸胁闷痛,脉弦。治疗应选用

- A.干姜
- B.高良姜
- C.吴茱萸
- D.丁香
- E.小茴香

答案:C

解析:“患者呕吐”,病位在胃,胁肋为肝经所过,故肝郁气滞可见“暖气频繁,胸胁闷痛,脉弦。”综合判断,该患者为肝郁犯胃,治宜疏肝解郁,降逆止呕。吴茱萸不但可散寒止痛,同时可以疏肝解郁,降逆止呕,兼能制酸止痛。治肝郁犯胃的胁痛口苦,与黄连配伍,如左金丸。干姜温中散寒,回阳通脉,温肺化饮。高良姜温中止痛,温中止呕。丁香温中降逆,散寒止痛,温肾助阳。小茴香散寒止痛,理气和胃。

98.患者咳嗽痰多,痰白清稀,食少便溏,近日下肢轻度浮肿,舌淡苔白,脉弱。治疗应选用

- A.党参
- B.薏苡仁
- C.山药
- D.白术
- E.黄精

答案:D

解析:患者咳嗽痰多,痰白清稀,食少便溏,下肢轻度浮肿,舌淡苔白,脉弱,为脾气不足,运化失健引起,治以健脾补气,燥湿利水。白术具有益气健脾,燥湿利水,止汗,安胎的功效,被誉为“脾脏补气健脾第一要药”。

99.患者痰壅气逆,咳嗽喘逆,痰多胸闷,食少难消,舌苔白腻,脉滑。治疗宜选用

- A.山楂

- B.莱菔子
- C.神曲
- D.鸡内金
- E.麦芽

答案:B

解析:该题考查莱菔子的临床应用。患者痰壅气逆,咳嗽喘逆,痰多胸闷,治以降气化痰,止咳平喘,食少难消,舌苔白腻,脉滑,治以消食化积。莱菔子具有消食除胀,降气化痰的功效,尤善行气消胀。

100.患者癆嗽,干咳无痰,颧红,盗汗,午后及夜间低热,治疗方中不应出现的药物是

- A.知母
- B.麦冬
- C.鳖甲
- D.地骨皮
- E.石膏

答案:E

解析:据题干所述,患者干咳无痰,颧红,盗汗,午后及夜间低热,均为阴虚内热的表现,治疗方中应以滋阴清热药为主,石膏生用清热泻火,除烦止渴,煨用收湿,生肌,敛疮,止血,不具备滋阴清热的功效。

101.患者自幼患有痫证,近期发作较频,并见心神不安,心悸,失眠,健忘,舌淡白,脉滑。治疗应选用

- A.竹茹
- B.茯苓
- C.琥珀
- D.党参
- E.远志

答案:E

解析:患者自幼患有痫证,近期发作频繁,舌淡白,脉滑治以补益心肾,祛痰开窍;心神不安,心悸,失眠,健忘,治以交通心肾、安神定志、益智强识。远志味辛通利,能利心窍,逐痰涎,故可用治痰阻心窍所致之癫痫抽搐、惊风发狂等证,并且远志苦辛性温,性善宣泄通达,既能开心气而宁心安神,又能通肾气而强志不忘,为交通心肾、安神定志、益智强识之佳品。

102.患者外感风寒,恶寒发热,头身疼痛,无汗,喘咳。治疗宜选用

- A.麻黄
- B.桂枝
- C.细辛
- D.杏仁
- E.白前

答案:A

解析:该题考查麻黄的临床应用。患者外感风寒,恶寒发热,头身疼痛,无汗为伤寒表实证,治以发散风寒,咳喘以宣肺平喘。麻黄具有发散风寒,宣肺平喘,利水消肿的功效,宜用于风寒外郁,腠理密闭无汗的外感风寒表实证,并且麻黄味辛为治疗肺气壅遏所致喘咳的要药。

### B1 型题

(共用备选答案题)





- A.母病及子
- B.子病及母
- C.相乘传变
- D.相侮传变
- E.母子同病

103.脾病及肾，体现的关系是

答案:C

解析:脾属土，肾属水，肝属木。土克水，脾病及肾为相乘传变。

104.土壅木郁，体现的关系是

答案:D

解析:脾属土，肾属水，肝属木。土克水，脾病及肾为相乘传变；木克土，土病及木为相侮传变。

(共用备选答案题)

- A.心、肺
- B.心、肝
- C.肺、脾
- D.肺、肝
- E.肺、肾

105.与气的生成关系最密切的是

答案:C

解析:肺主气，指肺为五脏中与气关系最密切的内脏，亦指肺对全身气机的调节作用。肺主呼吸，是指肺是气体交换的场所，通过肺的呼吸作用，不断吸进清气，排出浊气，吐故纳新，实现机体与外界环境的气体交换。脾为气血化生之源，指脾将饮食水谷精微传输布散，把水谷精气上输于肺，再由肺通过经脉布散全身，以营养五脏六腑和全身，维持正常的生命活动。

106.与呼吸运动关系最密切的是

答案:E

解析:肺主气，指肺为五脏中与气关系最密切的内脏，亦指肺对全身气机的调节作用。肺主呼吸，是指肺是气体交换的场所，通过肺的呼吸作用，不断吸进清气，排出浊气，吐故纳新，实现机体与外界环境的气体交换。肾主纳气，指肾有帮助肺保持吸气的深度，防止呼吸浅表的作用。

(共用备选答案题)

- A.气能生血
- B.气能摄血
- C.气能行血
- D.血能载气
- E.血能生气

107.治疗血虚，常配伍补气药，其根据是

答案:A

解析:能生血，气能行血，气能摄血，气为血帅。治疗血虚，常配伍补气药，是由于气能生血。

108.气随血脱的生理基础是

答案:D

解析:气随血脱的生理基础是血能载气。

(共用备选答案题)



- A.阴跷脉、阳跷脉
- B.阴维脉、阳维脉
- C.督脉、任脉
- D.冲脉、任脉
- E.阴跷脉、阴维脉

109.患者，女。因流产而失血过多，导致月经不调，久不怀孕。其病在

答案:D

解析:任脉具有调节阴经气血的作用，“任主胞胎”；冲脉具有调节十二经气血的作用，“冲为血海”。

110.患者久病，眼睑开合失司，下肢运动不利。其病在

答案:A

解析:阴阳跷脉主肢节运动，司眼睑开合；阴阳维脉具有维系、联络全身阳经或阴经的作用；督脉具有调节阳经气血的作用，反映脑、髓和肾的功能。

(共用备选答案题)

- A.体质因素
- B.精神刺激
- C.工作环境
- D.气候因素
- E.精神状态

111.“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。”指出与防病关系密切的因素是

答案:E

解析:“恬淡虚无……病安从来。”讲的是精神调节方面的要点。可理解为:身心平静，不会得病。精神刺激是致病因素。此句话讲的是精神状态与发病的关系。

112.“肉不坚，腠理疏，则善病风。”指出与发病关系密切的因素是

答案:A

解析:“肉为墙”，意即肌肉起着屏障作用。肌肉既可保护内在脏器，缓冲外力的损伤，又可抗拒外邪的侵袭。“肉”为身体的组成部分。此句话讲的是体质与发病的关系。

(共用备选答案题)

- A.刺痛拒按，固定不移，舌暗，脉涩
- B.气短疲乏，脘腹坠胀，舌淡，脉弱
- C.胸胁胀闷窜痛，时轻时重，脉弦
- D.面色淡白，口唇爪甲色淡，舌淡，脉细
- E.少气懒言，疲乏无力，自汗，舌淡，脉虚

113.血瘀证可见的症状是

答案:A


解析:血瘀证可见疼痛状如针刺刀割，痛处不移而固定。在腹内者，可触及较坚硬而推之不移的肿块(称为癥积)，出血反复不止，色紫暗或夹有血块，或大便色黑如柏油状，可见面色黧黑，或唇甲青紫，或皮下紫斑，或肌肤甲错，或腹部青筋显露，或皮肤出现丝状红缕(皮肤显露红色脉络)，或下肢筋青胀痛，妇女可见经闭。

114.气陷证可见的症状是

答案:B

解析:气陷证主要表现为头晕目花，少气倦怠，久痢久泄，腹部有坠胀感，脱肛或子宫脱垂等。舌淡苔白，脉弱。以气虚证伴有内脏下垂为辨证要点。

(共用备选答案题)



- A.表寒证
- B.真寒假热证
- C.虚寒证
- D.实寒证
- E.亡阳证

115.脘腹冷痛拒按，大便秘结，多见于

答案:D

解析:脘腹冷痛为寒象，题干中无热象表现，其中实证疼痛特点为拒按。

116.脘腹冷痛喜按，大便溏软，多见于

答案:C

解析:脘腹冷痛为寒象，题干中无热象表现，虚证疼痛特点为喜按。

(共用备选答案题)

- A.痄毒痢初期，高热烦渴，舌红脉数，急骤出现四肢厥冷，面色苍白
- B.咳嗽吐痰、息粗而喘、苔腻脉滑，久之气短而喘、声低懒言
- C.初为关节冷痛、重着，病久见患处红肿灼痛
- D.自觉发热、欲脱衣揭被，下肢厥冷，面色浮红如妆
- E.神识昏沉，四肢厥冷、胸腹灼热，口鼻气灼，舌红苔黄

117.热证转寒的临床表现是

答案:A

解析:热证转寒是指原为热证，后出现寒证，而热证随之消失的病变。痄毒痢初期，高热烦渴，舌红脉数，急骤出现四肢厥冷，面色苍白，原为热证后出现寒证。

118.真寒假热的临床表现是

答案:D

解析:真寒假热证其表现既有四肢厥冷，下利清谷、小便清长，舌淡苔白等一派真寒之象，又有面赤，身热，口渴，脉大的热象。但面虽赤，仅颧红如妆，时隐时现，与热证之满面通红不同；身虽热而反欲盖衣被，或自感烦热而胸腹必无灼热，下肢必厥冷；口虽渴但不欲饮或不多饮或喜热饮，与热证之渴喜冷饮不同；脉虽浮大但按之必无力，与热证之脉洪大有力不同。由此可以判定其面赤、身热、口渴、脉大均为假热。

(共用备选答案题)

- A.寒证或实热证
- B.邪闭
- C.阴寒内盛
- D.气虚
- E.虚热证

119.迟脉见于

答案:A

解析:迟脉多主寒证、也可见于邪热结聚的里实热证。

120.数脉见于

答案:E

解析:数脉主热证，有力为实热，无力为虚热，亦可见于虚阳外浮之时。

(共用备选答案题)

- A.气滞血瘀
- B.气不摄血
- C.气随血脱

D.气血两虚

E.气血失和

121.肝病日久，两胁胀满疼痛，并见舌质瘀斑、瘀点。其病机是

答案:A

解析:肝病日久，导致肝的功能失常，肝气瘀滞，进而出现血瘀症状。胁胀疼痛，是血瘀之象。且舌质出现瘀点瘀斑，更加印证了气滞血瘀的病理改变。

122.产后大出血，继则冷汗淋漓，甚则晕厥。其病机是

答案:C

解析:产后大出血，导致血液丢失过多，使气随血脱，不能顾护人体，出现冷汗淋漓和晕厥的表现。

(共用备选答案题)

A.腹痛腹胀，暴泻如水，肛门灼热

B.大便溏薄，时干时稀，排便不爽

C.下痢脓血，里急后重，身热口渴

D.腹满硬痛，大便秘结，日晡潮热

E.大便燥结，艰涩难下，口干口臭

123.肠热腑实证的临床表现是

答案:D

解析:肠热腑实证的临床表现:脐腹胀满疼痛，拒按，大便秘结或热结旁流，小便短赤，高热或日晡潮热，汗出口渴;或失眠狂乱，其则神昏谵语，舌红苔黄厚干焦;或起芒刺甚则焦黑燥裂，脉沉迟有力或滑数。

124.肠燥津亏的临床表现是

答案:E

解析:肠燥津亏的临床表现:大便干结难解，数日一行，口干咽燥，或伴头晕、口臭、暖气、腹胀，舌红少津苔黄燥，脉细涩。

(共用备选答案题)

A.合欢皮

B.酸枣仁

C.远志

D.琥珀

E.磁石

125.既能活血消肿，又能解郁安神的药物是

答案:A

解析:合欢皮解郁安神，活血消肿;酸枣仁养心益肝，安神，敛汗;远志宁心安神，祛痰开窍，消散痈肿。

126.既能活血散瘀，又能镇惊安神的药物是

答案:D

解析:琥珀镇惊安神，活血散瘀，利尿通淋;磁石镇惊安神，平肝潜阳，聪耳明目，纳气定喘。

(共用备选答案题)

A.甘、咸，温

B.酸、苦，温

C.苦、咸，温

D.甘、淡，温

E.辛、甘，温

127.鹿茸的性味

答案:A

解析:鹿茸为补阳药，味甘，性温。而鹿茸味咸，功偏益精血，强筋骨。

128.淫羊藿的性味

答案:E

解析:淫羊藿为补阳药，味甘，性温；淫羊藿味辛，功偏祛风除湿。

(共用备选答案题)

A.补阳

B.通阳

C.升阳

D.潜阳

E.固阳

129.石决明具有的功效是

答案:D

解析:石决明平肝潜阳，清肝明目。

130.桂枝具有的功效是

答案:B

解析:桂枝发汗解肌，温经通脉，助阳化气。

(共用备选答案题)

A.活血行气，祛风止痛

B.活血行气，清心凉血

C.活血调经，除烦安神

D.活血通经，清热解毒

E.活血通经，祛瘀止痛

131.郁金具有的功效是

答案:B

解析:郁金活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄。

132.红花具有的功效是

答案:E

解析:红花活血通经，祛瘀止痛。

(共用备选答案题)

A.泽泻

B.滑石

C.茵陈

D.萆薢

E.地肤子

133.具有利湿去浊，祛风除痹功效的药物是

答案:D

解析:茵陈利湿退黄，解毒疗疮；萆薢利湿去浊，祛风除痹。

134.具有利湿退黄，解毒疗疮功效的药物是

答案:C

解析:泽泻利水渗湿，泄热；滑石利尿通淋，清热解暑，祛湿敛疮；地肤子清热利湿，利尿通淋，止痒。

(共用备选答案题)

- A.化湿和胃
- B.凉血消肿
- C.活血止痛
- D.清热解毒
- E.清退虚热

135.豨莶草具有的功效是

答案:D

解析:豨莶草祛风湿、利关节、解毒。

136.络石藤具有的功效是

答案:B

解析:络石藤祛风通络、凉血消肿。

(共用备选答案题)

- A.白及
- B.仙鹤草
- C.棕榈炭
- D.血余炭
- E.炮姜

137.具有止痢功效的药物是

答案:B

解析:仙鹤草收敛止血、止痢、截疟、补虚、解毒杀虫，治疗身体各部位出血均可，又能收涩止泻，杀虫。

138.具有杀虫功效的药物是

答案:B

解析:白及收敛止血、消肿生肌。棕榈炭收敛止血，止泻止带。血余炭功能收敛止血，化瘀利尿。炮姜可温经止血，温中止痛。

(共用备选答案题)

- A.麻黄汤
- B.桑菊饮
- C.银翘散
- D.麻杏石甘汤
- E.柴葛解肌汤

139.主治风温初起，邪客肺络证的方剂是

答案:B

解析:桑菊饮主治风温初起，邪客肺络证。

140.主治外感风寒表实证的方剂是

答案:A

解析:麻黄汤主治外感风寒表实证。

(共用备选答案题)

- A.肝火犯胃
- B.胃热阴虚
- C.湿热痢疾
- D.肺热喘咳
- E.胃火牙痛

141.清胃散主治

答案:E

解析:左金丸主治肝火犯胃证。玉女煎主治胃热阴虚证。芍药汤主治湿热痢疾。泻白散主治肺热喘咳证。清胃散主治胃火牙痛。

142.玉女煎主治

答案:B

解析:左金丸主治肝火犯胃证。玉女煎主治胃热阴虚证。芍药汤主治湿热痢疾。泻白散主治肺热喘咳证。清胃散主治胃火牙痛。

(共用备选答案题)

- A.具有调和方中诸药作用的药物
- B.引方中诸药至特定病所的药物
- C.针对主病或主证起主要治疗作用的药物
- D.针对兼病或兼证起主要治疗作用的药物
- E.直接治疗次要兼证的药物

143.上述各项,君药指的是

答案:C

解析:君药是针对主病或主证起主要治疗作用的药物,是方中不可或缺,且药力居首的药物。

144.上述各项,臣药指的是

答案:D

解析:臣药:一是辅助君药加强治疗主病或主证的药物;二是针对兼病或兼证起治疗作用的药物。其在方中之药力小于君药。

(共用备选答案题)

- A.当归
- B.木香
- C.厚朴
- D.栀子
- E.木通

145.越鞠丸的组成药物中含有

答案:D

解析:越鞠丸主治六郁证。功用为行气解郁。方中主要组成为香附、川芎、苍术、栀子、神曲。

146.暖肝煎的组成药物中含有

答案:A

解析:暖肝煎组成:当归、枸杞子、小茴香、肉桂、乌药、沉香或(木香亦可)茯苓。


(共用备选答案题)

- A.医疗事故损害后果与患者原有疾病状况之间的关系
- B.患者的经济状况
- C.患者亲友在纠纷处理过程中的态度
- D.无过错输血感染造成的不良后果
- E.医患双方协商解决

147.医疗事故赔偿确定具体赔偿数额,应当考虑的因素是

答案:A

解析:医疗事故赔偿确定具体赔偿数额,应当考虑的因素:医疗事故等级;医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度;医疗事故损害后果与患者原有疾病状况之间的关系,不属



于医疗事故的，医疗机构不承担赔偿责任。

148.对发生医疗事故的赔偿等民事责任争议问题处理时，可以考虑的方式是

答案:E

解析:《医疗事故处理条例》中第四十六条指出:发生医疗事故的赔偿等民事责任争议,医患双方可以协商解决;不愿意协商或者协商不成的,当事人可以向卫生行政部门提出调解申请,也可以直接向人民法院提起民事诉讼。

(共用备选答案题)

A.劣药

B.假药

C.保健药品

D.非处方用药

E.特殊药品

149.药品所含成分的名称与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的是

答案:B

解析:按照《药品管理法》规定,药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符的,以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的为假药。

150.药品成分的含量与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的是

答案:A

解析:药品成分的含量不符合国家药品标准的,为劣药。

## 第二单元

### A1 型题

1.下列关于少阴病提纲脉证的机理的描述最确切的一项是

A.心肾阳虚、阴血不足,神失所养

B.邪入少阴,心肾虚衰,水火失济

C.心肾阳虚,阴寒内盛,水气不化

D.心肾阳虚,阴寒内盛,阳不外达

E.心肾阳虚,阴寒内盛,浊阴上蒙

答案:A

解析:本条为少阴病辨证纲要。少阴包括心肾两脏。少阴为病,心肾亏虚,全身阴阳气血不足。脉微是阳气虚鼓动无力,脉细是阴血虚不能充盈脉道。故脉微细提示阴阳两虚,心肾不足。心阴阳亏虚,神衰不振则精神萎靡,肾阴阳亏虚则体力疲惫,致似睡而非睡状态。但欲寐反映心肾俱虚,以阳虚为重。本条脉微细,但欲寐,反映了少阴病全身阴阳气血不足的本质,见此两个症状,便可诊断为少阴病,故作为少阴病证的辨证纲要。

2.产后失血、多汗,复加寒邪外束,表气闭郁,里气不宣,逆而上冲而成

A.郁冒

B.痉病

C.大便难

D.脏躁

E.梅核气

答案:A

解析:问曰:新产妇人有三病,一者病痉,二者病郁冒,三者大便难,何谓也?师曰:新产血虚,多出汗,喜中风,故令病痉;亡血复汗,寒多,故令郁冒;亡津液,胃燥,故大便难。



3.《温热论》中指出：温病邪留三焦，治用

- A.达原饮
- B.小柴胡汤
- C.茯苓皮汤
- D.温胆汤
- E.大柴胡汤

答案:D

解析:论气病有不传血分，而邪留三焦亦如伤寒中少阳病也。彼则和解表里之半，此则分消上下之势，随证变法，如近时杏、朴、苓等类，或如温胆汤之走泄。

4.证见脉沉迟，身发热，胸满，四肢头面肿应诊断为

- A.皮水
- B.正水
- C.风水
- D.石水
- E.黄汗

答案:E

解析:黄汗，其脉沉迟，身发热，胸满四肢头面肿，久不愈，必致痈脓。

5.四逆散证之四逆，较合适的理解为

- A.心肾阳虚，阴寒内盛，阳气不达
- B.少阴阳虚，复感寒邪，寒凝气滞
- C.阴阳气不相顺接
- D.肝胃气滞，阳气内郁，不达四末
- E.肾虚水停，阳气被遏

答案:D

解析:四逆散证之四逆为气机阻滞，阳气郁遏于里，不能透达四肢导致手足冷。

6.喘而汗出伴利遂不止，脉促者，选用何方治疗

- A.葛根黄芩黄连汤
- B.白头翁汤
- C.麻黄杏仁甘草石膏汤
- D.大青龙汤
- E.大承气汤


答案:A

解析:太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表未解也；喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。（34条）。

7.《温病条辨》中指出温病邪在阳明久羁，或已下，或未下，身热面赤，口干舌燥，甚则齿黑唇裂，决定使用下法或滋肾法的主要依据是

- A.口渴或口不渴
- B.脉沉实或脉虚大，手足心热甚于手足背
- C.发热或不发热
- D.恶寒或不恶寒
- E.烦躁或不烦躁

答案:B



解析:风温、温热、温疫、温毒、冬温,邪在阳明久羁,或已下,或未下,身热面赤,口干舌燥,甚则齿黑唇裂,脉沉实者,仍可下之;脉虚大,手足心热甚于手足背者,加减复脉汤主之。(下焦1条)。

8.新产妇人症见脉微弱,呕不能食,大便反坚,但头汗出,眩晕头昏者,此属

- A.痉病
- B.郁冒
- C.大便难
- D.呕吐
- E.产后中风

答案:B

解析:产后血虚多汗,腠理开泄,自体阳气虚故感寒,寒邪闭表,阳郁上冲,胃失和降则郁冒,临床表现为:郁闷不舒,但头汗出,呕而不能食,脉微弱;血虚津亏,肠道失于濡养则大便干燥,难以排出。

9.身劳汗出,常衣里冷湿,日久腰部酸楚冷痛,身体沉重,腰重如带五千钱;但口不渴,小便自利,饮食如故,治宜选用

- A.甘草干姜汤
- B.茯苓桂枝五味甘草汤
- C.苓桂术甘汤
- D.甘姜苓术汤
- E.茯苓桂枝甘草大枣汤

答案:D

解析:《金匮要略》:“肾着之病,其人身体重,腰中冷,如坐水中,形如水状,反不渴,小便自利,饮食如故,病属下焦,身劳汗出,衣(一作表)里冷湿,久久得之,腰以下冷痛,腹重如带五千钱,甘姜苓术汤主之。”

10.桂枝芍药知母汤证的临床表现是

- A.肢节疼痛,身体魁羸,脚肿如脱,头眩短气,温温欲吐
- B.关节剧烈疼痛,不可屈伸
- C.身体疼烦,不能转侧,脉浮虚而涩
- D.一身尽痛,发热,日晡所剧
- E.风湿,脉浮,身重,汗出,恶风

答案:A

解析:《金匮要略》:“诸肢节疼痛,身体魁羸口,脚肿如脱,头眩短气,温温欲吐,桂枝芍药知母汤主之。”

11.身热,心烦不寐,舌红苔黄,脉细数。治疗宜选

- A.栀子豉汤
- B.清营汤
- C.翘荷汤
- D.黄连阿胶汤
- E.青蒿鳖甲汤

答案:D

解析:黄连阿胶汤证是心火亢旺,肾水不足所致,故其烦、失眠,伴有舌红少苔,脉细数等阴虚内热之证,此证属虚实夹杂,虚指阴虚,实指心火。

12.太阳病误下,出现下利不止,喘而汗出,脉促的,选用以下哪一方治疗

- A.麻杏石甘汤

- B.葛根汤
- C.黄芩汤
- D.葛根黄芩黄连汤
- E.桂枝人参汤

答案:D

解析:《伤寒论》原文:“太阳病,桂枝证,医反下之,利遂不止,脉促者,表未解也;喘而汗出者,葛根黄芩黄连汤主之。”

13.发热,汗自出,时时恶风,心烦,口燥渴,脉洪大,治用

- A.竹叶石膏汤
- B.栀子豉汤
- C.白虎汤
- D.桂枝汤
- E.白虎加人参汤

答案:E

解析:《伤寒论》原文:“伤寒若吐若下后,七八日不解,热结在里,表里俱热,时时恶风,大渴,舌上干燥而烦,欲饮水数升者,白虎加人参汤主之。”

14.梅核气治用

- A.半夏厚朴汤
- B.甘麦大枣汤
- C.小柴胡汤
- D.旋覆代赭汤
- E.百合地黄汤

答案:A

解析:妇人因情志不舒,郁而化火,炼液成痰,阻于咽喉,故自觉咽喉中有异物,不影响饮食,且因其病机临床可伴有脘腹胀闷,食少纳呆,脾气暴躁等症状。以半夏厚朴汤理气解郁,化痰散结的功效治之。

15.湿热郁蒸酿痰蒙蔽心包,其病变在

- A.气分
- B.营分
- C.血分
- D.气营
- E.营血

答案:A

解析:卫气营血四个阶段只是反映了温病演变的大致程度,每个阶段还有具体的证候类型。如卫分证还有风热、湿热、暑热、燥热等感邪性质之分;气分证有在肺、脾、胃、胆、肠、膜原、胸膈等病变部位之分;营分证可分为营热炽盛和营阴耗损;血分证可分为瘀热阻于下焦、瘀热交结于胸和热入血室。故选 A。

16.支饮的临床主症是

- A.其人素盛今瘦,水走肠间,沥沥有声
- B.心下痞坚,胸胁支满,目眩
- C.咳逆倚息,短气不得卧,其形如肿
- D.咳唾引痛,痛引缺盆,咳嗽则辄已
- E.身体疼重,四肢历节痛

答案:C



解析:咳逆倚息，短气不得卧，其形如肿的，谓之支饮。

17.既能治疗肠腑病，又能治疗妇科病的腧穴是

- A.归来
- B.梁门
- C.丰隆
- D.天枢
- E.内庭

答案:D

解析:天枢穴既能治疗肠腑病，又能治疗妇科病。归来主治①小腹痛，疝气；②月经不调、带下、阴挺等妇科疾患。梁门“主治纳少、胃痛、呕吐等胃疾。丰隆主治①头痛，眩晕；②癫狂；③咳嗽痰多等痰饮病症；④下肢痿痹；⑤腹胀，便秘。内庭主治①齿痛、咽喉肿痛、鼻衄等五官热性病症；②热病；③吐酸、腹泻、痢疾、便秘等肠胃病症；④足背肿痛，跖趾关节痛。

18.以下哪项不属于《四总穴歌》的内容

- A.腰背委中求
- B.肚腹三里留
- C.胸胁内关谋
- D.面口合谷收
- E.头项寻列缺

答案:C

解析:《四总穴歌》所载“肚腹三里留，腰背委中求，头项寻列缺，面口合谷收”。

19.下列不属于八会穴的是

- A.阳陵泉
- B.血海
- C.中脘
- D.膻中
- E.章门

答案:B

解析:八会穴为脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓等精气交会的8个腧穴，简易歌诀为：腑会中脘脏章门，髓会绝骨筋阳陵，血会膈俞骨大杼，脉太渊气膻中寻。血海非特定穴。

20.在腕前区，腕掌侧远端横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘的穴位是


- A.太渊
- B.神门
- C.阳池
- D.阳溪
- E.养老

答案:B

解析:阳溪位于腕背横纹桡侧，当拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷中；太渊位于腕掌侧横纹桡侧端，桡动脉搏动处；神门位于腕部，腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处；阳池位于腕背部横纹中，指伸肌腱的尺侧凹陷处；养老位于前臂背面尺侧，当尺骨小头近端桡侧凹缘中。

21.可用于治疗咯血的穴位是

- A.商阳
- B.偏历



- C.少商
- D.地仓
- E.孔最

答案:E

解析:郄穴为气血深聚之处,阳经郄穴多治疗急性痛证,阴经郄穴多治疗血证,孔最为手太阴肺经郄穴,主治咯血、咳嗽、气喘、咽喉肿痛等肺系病证,以及肘臂挛痛。

22.以下哪穴不是足阳明胃经的五输穴

- A.厉兑
- B.解溪
- C.内庭
- D.陷谷
- E.丰隆

答案:E

解析:丰隆是足阳明胃经的络穴。

23.耻骨联合上缘至髌底的骨度分寸是

- A.18寸
- B.19寸
- C.20寸
- D.21寸
- E.22寸

答案:A

解析:耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘的骨度分寸为18寸。股骨大转子至腓横纹的骨度分寸为19寸。常用骨度分寸无20寸、21寸、22寸。

24.除近治作用、远治作用外,腧穴的主治特点还包括

- A.调和作用
- B.特殊作用
- C.平衡作用
- D.疏通作用
- E.扶正作用

答案:B

解析:腧穴的主治特点主要表现在三个方面,即近治作用、远治作用和特殊作用。

25.药物的首过消除发生于

- A.舌下给药后
- B.吸入给药后
- C.口服给药后
- D.静脉给药后
- E.皮下给药

答案:C

解析:首过消除是指从胃肠道吸收入门静脉系统的药物在到达全身血循环前必先通过肝脏,如果肝脏对其代谢能力很强,或由于胆汁排泄的量,则使进入全身血循环内的有效药物量明显减少,这种作用也称为首过效应。首过效应发生于药物进入体循环之前的胃肠道、肠黏膜细胞和肝脏,所以是在口服给药后。

26.高血压危象应选用药物

- A.ACEI类



- B.硝普钠
- C.β受体阻滞药
- D.卡托普利
- E.利血平

答案:B

解析:高血压危象患者宜给予静脉滴注或肌注快速起效的药物,如硝普钠,硝普钠通过释放NO直接舒张小动脉和静脉,降压作用强、起效快、维持时间短。

27.用于帕金森病、晕动病的抗胆碱药是

- A.山莨菪碱
- B.后马托品
- C.樟柳碱
- D.阿托品
- E.东莨菪碱

答案:E

解析:东莨菪碱的中枢镇静作用比阿托品强,有中枢抗胆碱作用,防晕防吐,可用于麻醉前给药、帕金森病、晕动病。

28.无明显中枢副作用的H<sub>1</sub>受体阻滞药是

- A.异丙嗪
- B.苯海拉明
- C.阿司咪唑
- D.曲吡那敏
- E.氯苯那敏(扑尔敏)

答案:C

解析:H<sub>1</sub>受体阻滞剂具有中枢抑制作用,多数药物可通过血脑屏障,产生不同程度的镇静、嗜睡等中枢抑制作用,可能是由中枢H<sub>1</sub>受体被阻断,拮抗了内源性组胺介导的觉醒反应所致。中枢抑制作用,以苯海拉明和异丙嗪最强,第二代药物如阿司咪唑无中枢抑制作用。

29.主要兴奋β受体的拟肾上腺素药是

- A.去甲肾上腺素
- B.肾上腺素
- C.间羟胺
- D.异丙肾上腺素
- E.多巴胺

答案:D

解析:异丙肾上腺素是主要兴奋β受体的拟肾上腺素药。去甲肾上腺素主要激动α受体,对β受体激动作用很弱。肾上腺素能激动α和β两类受体。间羟胺直接激动α受体。多巴胺低剂量激动多巴胺受体,中剂量具有β<sub>1</sub>受体激动作用。

30.关于氯解磷定的叙述,正确的是

- A.可迅速制止肌束颤动
- B.对乐果中毒疗效好
- C.属可逆性抗胆碱酯酶药
- D.不良反应较碘解磷定多
- E.对内吸磷中毒无效

答案:A



解析:胆碱酯酶复活药有氯解磷定、碘解磷定、双复磷等。以氯解磷定为首选药。碘解磷定为最早应用的 AchE 复活药, 不良反应较多, 作用较弱。氯解磷定主要用于中度和重度有机磷酸酯类中毒的解救。对酶复活的效果随不同的有机磷酸酯类而异, 对内吸磷、马拉硫磷和对硫磷中毒的疗效较好; 对敌百虫、敌敌畏中毒的疗效稍差; 对乐果中毒无效, 因乐果中毒时所形成的磷酰化胆碱酯酶比较稳定, 酶活性不易恢复, 加之乐果乳剂还含有苯, 可能同时有苯中毒。不良反应较少, 但剂量过大, 可直接与胆碱酯酶结合而抑制其活性, 加剧中毒。

31.可保护溃疡面, 并引起便秘的药物是

- A.氢氧化铝
- B.三硅酸镁
- C.碳酸氢钠
- D.碳酸钙
- E.氧化镁

答案:A

解析:氧化酶能中和胃酸保护溃疡面, 但产生的氯化镁可引起腹泻。氢氧化铝抗酸作用较强, 作用后产生的氧化铝具有收敛、止血和致便秘作用。

32.下列药物可产生“宿醉”现象的是

- A.地西洋
- B.丙磺舒
- C.卡马西平
- D.乙琥胺
- E.丙戊酸钠

答案:A

解析:地西洋常规用量下少有严重不良反应。常见有服药次日出现头昏、嗜睡、乏力等“宿醉”现象。长期使用可产生耐受性, 亦可产生依赖性, 突然停药可出现反跳或戒断症状如失眠、焦虑、震颤等。

33.室性心律失常危急病例的抢救可选用

- A.奎尼丁
- B.阿托品
- C.普萘洛尔
- D.维拉帕米
- E.利多卡因

答案:E

解析:利多卡因用于室性心律失常, 特别适用于危急病例, 是治疗急性心肌梗死引起的室性心律失常的首选药。

34.苯巴比妥治疗癫痫大发作, 疗效不佳, 后改用苯妥英钠, 结果反而病情加重, 可能的原因是

- A.苯妥英钠剂量太小
- B.苯妥英钠对大发作无效
- C.苯妥英钠剂量过大而中毒
- D.苯妥英钠诱导了肝药酶, 加速自身代谢
- E.苯妥英钠的血药浓度尚未达到有效血药浓度

答案:E



解析:苯妥英钠治疗癫痫大发作(强制-阵挛性发作)的首选药,起效慢,故常先用苯巴比妥等作用快的药物控制发作后长期使用本药。本题在改用苯妥英钠后,前药撤除过早,使血药浓度低于有效血药浓度,造成病情反而加重。

35.治疗肝性脑病的抗帕金森药是

- A.左旋多巴
- B.苯海索
- C.溴隐亭
- D.金刚烷胺
- E.司来吉兰

答案:A

解析:左旋多巴用于帕金森病、急性肝功能衰竭所致的肝昏迷辅助治疗等。苯海索抗震效果好,也能改善运动障碍和肌肉强直。溴隐亭用于抗震颤麻痹。金刚烷胺用于治疗原发性帕金森病、脑炎后的帕金森综合征、药物诱发的锥体外系反应、一氧化碳中毒后帕金森综合征及老年人合并有动脉硬化的帕金森综合征。司来吉兰与多巴胺相似。

36.酚妥拉明可用于治疗顽固性充血性心力衰竭的主要原因是其可

- A.兴奋心脏,增强心肌收缩力,使心率加快,心输出量增加
- B.抑制心脏,使其得到休息
- C.扩张肺动脉,减轻右心后负荷
- D.扩张外周小动脉,减轻心脏后负荷
- E.扩张外周小静脉,减轻心脏前负荷

答案:D

解析:酚妥拉明可用于治疗顽固性充血性心力衰竭的主要原因是其可扩张外周小动脉,减轻心脏后负荷。

37.抗结核病的合理化疗指的是

- A.早期、小剂量、联合、全程用药
- B.早期、大剂量、联合、全程用药
- C.早期、适量、联合、全程用药
- D.早期、适量、联合、规律及全程用药
- E.早期、大剂量、联合、规律及全程用药

答案:D

解析:合理化疗是指早期、适量、联合、规律及全程用药。

38.对胰岛功能完全丧失的糖尿病患者,仍有降血糖作用的药物是

- A.优降糖
- B.二甲双胍
- C.甲苯磺丁脲
- D.氯磺丙脲
- E.甲磺吡脲

答案:B

解析:二甲双胍可减少外源性葡萄糖吸收及糖原异生,促进脂肪组织摄取葡萄糖。常与磺酰脲类或胰岛素合用,如单用磺酰脲类无效者,加用本类药物常可获效。优降糖和甲苯磺丁脲均具有较强降糖作用。氯磺丙脲用于治疗轻、中度成年型糖尿病。甲磺吡脲降血糖作用比较缓和,适用于非胰岛素依赖型糖尿病患者,尤其是合并微血管病变者。

39.磺胺类药物作用机制是与细菌竞争

- A.二氢叶酸还原酶



- B.二氢叶酸合成酶
- C.一碳单位转移酶
- D.四氢叶酸还原酶
- E.叶酸还原酶

答案:B

解析:磺胺类药物的结构与对氨基苯甲酸(PABA)相似,可与PABA竞争二氢叶酸合成酶,妨碍二氢叶酸的合成,进而妨碍四氢叶酸的合成。

40.下列各项中不属于氟喹诺酮类药物特点的是

- A.抗菌谱广
- B.抗菌活性强
- C.口服吸收良好
- D.减少肝细胞糖异生
- E.与其他类别的抗菌药之间无交叉耐药

答案:D

解析:氟喹诺酮类具有抗菌谱广,抗菌活性强,口服吸收良好,与其他类别的抗菌药之间无交叉耐药等特点。减少肝细胞糖异生是二甲双胍的作用机制。

41.细菌耐药性产生的方式不包括

- A.产生灭活酶
- B.靶位的修饰和变化
- C.降低外膜的通透性
- D.加强主动流出系统
- E.抗生素的滥用

答案:E

解析:细菌耐药性产生的主要方式有:①产生灭活酶;②靶位的修饰和变化;③降低外膜的通透性;④加强主动流出系统。故根据题干要求,正确的选项是E。

42.大环内酯类抗生素不包括

- A.克拉霉素
- B.螺旋霉素
- C.阿奇霉素
- D.林可霉素
- E.罗红霉素

答案:D

解析:克拉霉素、罗红霉素为14元大环内酯类的药物,螺旋霉素为16元大环内酯类的药物,阿奇霉素为15元大环内酯类的药物。林可霉素不属于大环内酯类抗生素,其为林可霉素类。

43.临床上主要用于治疗五官、皮肤、阴道念珠菌感染的药物是

- A.甲硝唑
- B.咪康唑
- C.特比萘芬
- D.制霉菌素
- E.阿奇霉素

答案:B

解析:咪康唑为咪唑类广谱抗真菌药。对大多数真菌都有抑制作用,目前临床主要局部应用治疗五官、皮肤、阴道的念珠菌感染。

44.下列哪项不是抗肿瘤药物的不良反应



- A.脱发
- B.骨髓抑制
- C.过敏反应
- D.消化道反应
- E.呼吸道反应

答案:E

解析:抗恶性肿瘤药的不良反应:①骨髓抑制;②消化道反应;③脱发;④重要器官及神经系统损害;⑤过敏反应;⑥第二原发恶性肿瘤;⑦不育和致畸。

45.下列除哪项外,均对青霉素 G 易产生耐药

- A.金葡菌
- B.淋球菌
- C.放线杆菌
- D.肺炎球菌
- E.脑膜炎球菌

答案:C

解析:青霉素对敏感病菌有强大的杀菌作用,对宿主无明显毒性。抗菌谱为:①革兰阳性球菌:如溶血性链球菌、肺炎链球菌、草绿色链球菌等作用强,但对肠球菌的作用较差。②革兰阳性杆菌:如白喉杆菌、炭疽杆菌及革兰阳性厌氧杆菌(如产气荚膜杆菌、破伤风梭菌、难辨梭菌、丙酸杆菌、真杆菌、乳酸杆菌等)均对青霉素敏感。③革兰阴性球菌:对脑膜炎球菌和淋球菌敏感,但易耐药。④其他:如对梅毒螺旋体、钩端螺旋体、回归热螺旋体、鼠咬热螺旋菌、放线杆菌等高度敏感。对真菌、立克次体、病毒和原虫无效。金葡菌、肺炎球菌、脑膜炎球菌和淋球菌对本品易耐药。

46.治疗对沙门菌引起的伤寒或副伤寒,其首选药物是

- A.磺胺类
- B.青霉素 G
- C.头孢菌素
- D.万古霉素
- E.氟喹诺酮

答案:E

解析:对沙门菌引起的伤寒或副伤寒,应首选氟喹诺酮或头孢曲松。

47.下列疾病,表现为弛张热的是

- A.肺炎球菌肺炎
- B.疟疾
- C.布鲁斯菌病
- D.渗出性胸膜炎
- E.风湿热

答案:E

解析:弛张热:体温常在 39°C 以上,波动幅度大,24 小时内波动范围超过 2°C,但都在正常水平以内,常见于败血症、风湿热、肺结核及化脓性炎症等。

48.下列疾病,多表现为下垂性水肿的是

- A.肾小球肾炎
- B.肝硬化
- C.血管神经性水肿
- D.右心衰竭

E.甲状腺功能减退症

答案:D

解析:心源性水肿特点是下垂性水肿,心源性水肿见于右心衰竭、慢性缩窄性心肌炎等。肾小球肾炎表现为肾源性水肿,肝硬化表现为肝源性水肿,血管神经性水肿表现为局部性水肿,甲状腺功能减退症表现为内分泌源性水肿。

49.下列各项,不属肝细胞性黄疸特点的是

A.尿胆原可增加

B.粪便白陶土色

C.尿胆红素阳性

D.血清结合胆红素增高

E.血清非结合胆红素升高

答案:B

解析:肝细胞性黄疸的实验室检查特点:血清结合及非结合胆红素均增多。尿中尿胆原通常增多,尿胆红素阳性。大便颜色通常改变不明显。有转氨酶升高肝功能受损的表现。

50.下列不属于代谢性酸中毒原因的是

A.糖尿病酮症

B.肾功能衰竭

C.腹泻

D.摄入大量阿司匹林

E.肺通气功能障碍

答案:E

解析:代谢性酸中毒的原因包括:①酸性物质产生过多,如糖尿病酮症等;②肾脏排酸保碱功能障碍,如肾功能衰竭、肾小管性酸中毒、肾上腺皮质功能低下(艾迪生病)等;③肾外失碱,如腹泻、肠痿等;④酸性药物摄入过多,如阿司匹林等;⑤稀释性酸中毒,如大量输入生理盐水。肺通气功能障碍属于呼吸性酸中毒。

51.下列除哪项外,均是采集主诉所要求的内容

A.主诉是迫使患者就医的最主要的症状

B.一般不超过20个字

C.确切的主诉常可作为诊断的向导

D.主诉的记录,尽量使用诊断术语

E.症状不突出者,可把就医作为的主要目的主诉

答案:D

解析:主诉为患者感受最主要的痛苦或最明显的症状或(和)体征,也就是本次就诊最主要的原因及其持续时间。确切的主诉可初步反映病情轻重与缓急,并提供对某系统疾患的诊断线索。主诉应用一两句话加以概括,一般不超过20个字。记录主诉要简明,应尽可能用患者自己描述的症状,而不是医师对患者的诊断用语。对于症状不突出者,可把就医的主要目的作为主诉。

52.可引起反射性呕吐的疾病是

A.耳源性眩晕


B.洋地黄中毒

C.尿毒症

D.胆囊炎

E.妊娠反应

答案:D



解析:耳源性眩晕引起前庭障碍性呕吐;洋地黄中毒引起中枢性呕吐;尿毒症引起中枢性呕吐;胆囊炎引起反射性呕吐;妊娠反应引起中枢性呕吐。

53.大量腹腔积液的呼吸形式是

- A.腹式呼吸
- B.长吸式呼吸
- C.呼吸浅快
- D.呼吸深快
- E.呼吸深慢

答案:C

解析:大量腹腔积液的腹式呼吸变弱,呼吸形式呼吸浅快。

54.下列各项,可出现脉压减小的是

- A.主动脉瓣关闭不全
- B.缩窄性心包炎
- C.动脉导管未闭
- D.甲状腺功能亢进症
- E.严重贫血

答案:B

解析:脉压 $<30\text{mmHg}$ 称为脉压减小,见于主动脉瓣狭窄、心力衰竭、休克、心包积液、缩窄性心包炎等。主动脉瓣关闭不全、动脉导管未闭、甲状腺功能亢进症、严重贫血均见于脉压增大。

55.引起上消化道出血最常见的原因是

- A.消化性溃疡
- B.胆道感染
- C.胃癌
- D.血小板减少性紫癜
- E.肝硬化

答案:A

解析:引起上消化道出血的疾病,临床上前三位病因分别为:消化性溃疡、食管与胃底静脉曲张破裂、急性胃黏膜病变。

56.在下列疾病中,哪项不会导致意识障碍

- A.低血糖
- B.一度房室传导阻滞
- C.窒息
- D.一氧化碳中毒
- E.休克

答案:B

解析:意识障碍的常见病因有重症急性感染,颅脑非感染性疾病,内分泌与代谢障碍如尿毒症、肝性脑病、肺性脑病、甲状腺危象、甲状腺功能减退、糖尿病性昏迷、低血糖、妊娠中毒症等,水、电解质平衡紊乱,外源性中毒如安眠药、有机磷杀虫药、氰化物、一氧化碳、酒精和吗啡等中毒,物理性及缺氧性损害,窒息和严重休克的患者也会出现意识障碍,而一度房室传导阻滞以心悸为主,只有严重者才可出现暂时性意识丧失。

57.蜘蛛痣不应出现的部位是

- A.手背
- B.前胸

- C.面部
- D.腹部
- E.颈部

答案:D

解析:皮肤小动脉末端分支性扩张所形成的血管痣,形似蜘蛛,称为蜘蛛痣,多出现于上腔静脉分布的区域内,如面、颈、手背、上臂、前胸和肩部等处,大小不等。

58.能导致瞳孔扩大的疾病是

- A.有机磷杀虫药中毒
- B.吗啡中毒
- C.青光眼绝对期
- D.毒蕈中毒
- E.虹膜炎

答案:C

解析:瞳孔扩大见于外伤、青光眼绝对期、视神经萎缩、完全失明、濒死状态、颈交感神经刺激和阿托品、可卡因等药物影响;瞳孔缩小常见于虹膜炎、有机磷农药中毒、毒蕈中毒、吗啡中毒等。

59.下列疾病,常使气管移向患侧的是

- A.胸膜粘连
- B.大量胸腔积液
- C.胸腔积气
- D.肺气肿
- E.纵隔肿瘤

答案:A

解析:根据气管的偏移方向可以判断病变的性质。如大量胸腔积液、积气、纵隔肿瘤以及单侧甲状腺肿大可将气管推向健侧,而肺不张、肺硬化、胸膜粘连可将气管拉向患侧。

60.下列各项,对急性胰腺炎有诊断价值的是

- A.血清淀粉酶 $>800\text{U/L}$
- B.血清淀粉酶 $>1800\text{U/L}$
- C.血清淀粉酶 $>3000\text{U/L}$
- D.血清淀粉酶 $>5000\text{U/L}$
- E.血清淀粉酶 $<800\text{U/L}$

答案:D

解析:急性胰腺炎大多数患者于发病后6~12h血清淀粉酶开始升高,12~24h达高峰,2~5天后恢复正常,达3500U/L应怀疑此病,超过5000U/L即有诊断价值。

61.空洞型肺结核患者胸部的叩诊音为

- A.清音
- B.过清音
- C.实音
- D.浊音
- E.鼓音

答案:E

解析:清音为肺部正常叩诊音;过清音见于肺气肿或支气管哮喘发作时;实音见于肺实变、胸腔内巨大肿物等;浊音见于病灶范围较小,或较深、积液量较少的肺部疾病,如肺炎、胸腔积液、胸膜增厚粘连等;鼓音见于气胸及直径大于3~4cm的浅表肺空洞,如空洞型肺结

核。

62.下列各项，可出现外周血中性粒细胞减少的是

- A.糖尿病酮症酸中毒
- B.急性心肌梗死
- C.急性大出血
- D.脾功能亢进
- E.恶性肿瘤

答案:D

解析:中性粒细胞减少可见于病毒感染性疾病、再生障碍性贫血、粒细胞缺乏症、抗肿瘤药物、抗结核药物、自身免疫性疾病、脾功能亢进等。糖尿病酮症酸中毒、急性心肌梗死、急性大出血、恶性肿瘤可见中性粒细胞增多。

63.病理性蛋白尿，可见于

- A.剧烈活动后
- B.严重受寒
- C.直立性蛋白尿
- D.妊娠中毒
- E.正常儿童

答案:D

解析:病理性蛋白尿分为:肾前性蛋白尿,如本周蛋白尿、血红蛋白尿及肌红蛋白尿;肾性蛋白尿,如肾小球和肾小管炎症、血管病变、中毒等;肾后性蛋白尿,如肾盂、输尿管、膀胱和尿道炎症、肿瘤、结石等。故妊娠中毒出现的蛋白尿为病理性蛋白尿。剧烈活动、严重受寒、直立性蛋白尿为生理性蛋白尿。

64.上消化道大出血时,粪便的特点是

- A.水样稀便
- B.黏液脓血便
- C.米泔样便
- D.柏油样便
- E.鲜血便

答案:D

解析:水样稀便见于各种感染性或非感染性腹泻,如急性胃肠炎、甲状腺功能亢进症等;黏液脓血便常见于痢疾、溃疡性结肠炎、直肠癌等;米泔样便见于霍乱;柏油样便见于各种原因引起的上消化道出血;鲜血便见于肠道下段出血,如痔疮、肛裂、直肠癌等。

65.漏出液的细胞总数为

- A. $<90 \times 10^6/L$
- B. $<100 \times 10^6/L$
- C. $<200 \times 10^6/L$
- D. $>500 \times 10^6/L$
- E. $>600 \times 10^6/L$

答案:B

解析:漏出液的细胞计数常 $<100 \times 10^6/L$ ,渗出液的细胞计数常 $>500 \times 10^6/L$ 。

66.丝虫病可引起的尿液改变是

- A.乳糜尿
- B.血红蛋白尿
- C.胆红素尿



D.脓尿

E.血尿

答案:A

解析:尿中混有淋巴液而呈稀牛奶状称为乳糜尿, 常见于丝虫病及肾周围淋巴管梗阻。血红蛋白尿主要见于严重的血管内溶血, 如溶血性贫血、血型不合的输血反应。胆红素尿由于尿中有大量的结合胆红素, 尿液呈豆油样改变, 常见于胆汁淤积性黄疸和肝细胞性黄疸。脓尿见于泌尿系统感染如肾盂肾炎、膀胱炎等。血尿多见于泌尿系统炎症、结石、肿瘤、结核、外伤等, 也可见于血液系统疾病, 如血友病、血小板减少性紫癜等。

67.高血压性心脏病左心室增大, 其心脏浊音界呈

A.靴形

B.梨形

C.烧瓶形

D.普大形

E.心腰部凸出

答案:A

解析:靴形为高血压、主动脉瓣关闭不全; 梨形为二尖瓣狭窄; 烧瓶形见于心包积液; 普大形见于扩心病; 心腰部凸出为左房与肺动脉段均增大, 心腰更为丰满或膨出。

68.许多疾病均可引起中性粒细胞增多, 但除了

A.糖尿病酮症酸中毒

B.类风湿关节炎

C.系统性红斑狼疮

D.肺炎

E.急性心肌梗死

答案:C

解析:系统性红斑狼疮为中性粒细胞减少。

69.方颅可见于

A.呆小症

B.先天性梅毒

C.脑膜炎

D.脑积水

E.小儿营养不良

答案:B

解析:方颅, 前额左右突出, 头顶平坦呈方形, 颈部静脉充盈, 对比之下颜面很小, 由于颅内压增高, 压迫眼球, 形成双目下视、巩膜外露的特殊表情, 常见于先天性梅毒。呆小症、脑膜炎、脑积水、小儿营养不良均不符合。

70.心尖区触及舒张期震颤, 提示

A.主动脉瓣狭窄

B.肺动脉瓣狭窄

C.室间隔缺损

D.二尖瓣狭窄

E.动脉导管未闭

答案:D

解析:二尖瓣狭窄时, 心尖部可闻及舒张中晚期隆隆样杂音, 呈递增型, 音调较低而局限, 左侧卧位呼气末时较清楚, 常伴有第一心音亢进、二尖瓣开放拍击音及舒张期震颤, 肺动脉

瓣第二心音亢进、分裂；主动脉瓣关闭不全所致的相对性二尖瓣狭窄的杂音，称为奥-弗杂音（Austin-Flint 杂音），性质柔和，不伴有第一心音亢进、开瓣音，无震颤。

71.X 线片见 Codman 三角，应首先考虑的是

- A.恶性骨肿瘤
- B.良性骨肿瘤
- C.化脓性骨髓炎
- D.骨关节结核
- E.长骨骨折

答案:A

解析:Codman 三角又称为骨膜三角。良性骨肿瘤多无骨膜增生；恶性骨肿瘤常有骨膜增生，并且骨膜新生骨可被肿瘤破坏，形成恶性骨肿瘤的特征性 X 线表现-Codman 三角。

72.具有胸膜摩擦音体征的疾病是

- A.结核性干性胸膜炎
- B.结核性渗出性胸膜炎
- C.肺结核并发气胸
- D.结核性脓胸
- E.肺结核

答案:A

解析:胸膜摩擦音是干性胸膜炎的重要体征，主要见于①胸膜炎症，如结核性胸膜炎、化脓性胸膜炎以及其他原因引起的胸膜炎症；②原发性或继发性胸膜肿瘤；③肺部病变累及胸膜，如肺炎、肺梗死等；④胸膜高度干燥，如严重脱水等；⑤其他如尿毒症等。

73.我国最常见的咯血原因是

- A.支气管扩张
- B.肺结核
- C.二尖瓣狭窄
- D.肺脓肿
- E.支气管肺癌

答案:B

解析:支气管扩张、肺结核、二尖瓣狭窄、肺脓肿、支气管肺癌都可出现咯血，但在我国最常见的咯血原因是肺结核，发生咯血的肺结核多为浸润型、空洞型肺结核和干酪样肺炎，急性血行播散型肺结核较少出现咯血。

74.糖尿病病人糖化血红蛋白的控制范围是

- A.2%~3%
- B.4%~6%
- C.5%~8%
- D.8%~10%
- E.10%~12%

答案:B

解析:血清糖化血红蛋白不受血糖浓度暂时波动的影响，是糖尿病诊断和监控的重要指标。其正常值约为 4%~6%。

75.体温在 39℃ 以上，一日内波动范围超过 2℃ 者，多见于

- A.风湿热
- B.伤寒
- C.疟疾



D.大叶性肺炎

E.中暑

答案:A

解析:体温在 39°C以上, 一日内波动范围超过 2°C者, 为弛张热, 又称败血症热型, 常见于风湿热、败血症、重症肺结核及化脓性炎症等。伤寒、大叶性肺炎表现为稽留热。疟疾表现为间歇热。中暑属于体温调节中枢功能失常。

76.下列各项, 可出现双肺满布湿啰音的是

A.肺炎链球菌肺炎

B.急性肺水肿

C.支气管哮喘

D.肺脓肿

E.支气管扩张症

答案:B

解析:湿啰音两肺散在性分布, 常见于支气管炎、支气管肺炎、血行播散型肺结核、肺水肿; 两肺底分布, 多见于肺淤血、肺水肿早期及支气管肺炎; 一侧或局限性分布, 常见于肺炎、肺结核、支气管扩张症、肺脓肿、肺癌及肺出血等。

77.出血量达何值以上可出现黑便

A.5mL

B.10mL

C.20mL

D.50mL

E.60mL

答案:E

解析:出血量达 5mL 以上出现大便隐血试验阳性, 达 60mL 出现黑便。

78.下列不属于代谢性酸中毒原因的是

A.糖尿病酮症

B.肾功能衰竭

C.腹泻

D.摄入大量阿司匹林

E.肺通气功能障碍

答案:E

解析:代谢性酸中毒的原因包括: ①酸性物质产生过多, 如糖尿病酮症等; ②肾脏排酸保碱功能障碍, 如肾功能衰竭、肾小管性酸中毒、肾上腺皮质功能低下(艾迪生病)等; ③肾外失碱, 如腹泻、肠痿等; ④酸性药物摄入过多, 如阿司匹林等; ⑤稀释性酸中毒, 如大量输入生理盐水。肺通气功能障碍属于呼吸性酸中毒。

79.伤寒最严重的并发症是

A.肠穿孔

B.肠出血

C.中毒性心肌炎

D.中毒性肝炎

E.急性胆囊炎

答案:A

解析:肠穿孔是伤寒最严重的并发症, 多见于病程第 2~3 周。多发生于回肠末端, 表现为右下腹剧痛, 伴有恶心、呕吐、冷汗、呼吸急促、体温与血压下降, 经 1~2 小时腹痛及其他

症状暂时缓解，不久体温又迅速上升并出现腹膜炎征象，表现为腹胀、腹痛、腹壁紧张，压痛和反跳痛，肠鸣音减弱，白细胞计数增高伴核左移。

80.病原体被局限化而不引起显性感染，但不足以将病原体清除，待机体免疫功能下降时，才引起疾病。此种表现属于

- A.显性感染
- B.病原携带状态
- C.机会性感染
- D.潜伏性感染
- E.隐性感染

答案:D

解析:潜伏性感染:病原体侵入人体后,寄生于机体的某些部位,机体的免疫功能使其局限化而不引起显性感染,但也不能将病原体清除,一旦机体免疫功能下降才引起显性感染。如单纯疱疹、带状疱疹、疟疾、结核病等。潜伏性感染期间病原体一般不排出体外。

81.下列各项中属乙类传染病的是

- A.霍乱
- B.鼠疫
- C.传染性非典型肺炎
- D.风疹
- E.流行性感冒

答案:C

解析:根据中华人民共和国传染病防治法及其实施细则,将法定传染病分为三类:甲类、乙类和丙类。其中,鼠疫和霍乱属于甲类,风疹和流行性感冒属于丙类,2003年4月卫生部通知,将传染性非典型肺炎列入法定传染病管理,按乙类传染病管理。

82.黄疸深,恶心呕吐重,肝脏小,伴昏迷、抽搐,有明显“胆酶分离”现象,应考虑的疾病是

- A.急性病毒性肝炎
- B.肝硬化
- C.胰头癌
- D.急性重型肝炎
- E.肝癌

答案:D

解析:重型肝炎患者可出现ALT快速下降,胆红素不断升高的“胆酶分离”现象,提示肝细胞大量坏死。

83.感染HBV后机体产生的唯一保护性抗体是

- A.抗-HBs
- B.抗-HBe
- C.抗-HBc-IgM
- D.抗-HBc-IgG
- E.抗-HBV-DNA

答案:A

解析:抗-HBs是感染HBV后机体产生的唯一保护性抗体,对HBV具有中和作用。一般在HBsAg消失后隔一段时间才出现,这段时间称为空窗期。抗-HBs阳性见于乙肝恢复期、HBV既往感染者和乙肝疫苗接种后。

84.下述哪项不是艾滋病的传播途径



- A.性接触
- B.注射及输血和血制品
- C.母婴传播
- D.器官移植
- E.消化道

答案:E

解析:艾滋病传播途径:①性接触传播:是本病主要传播途径。②血源传播:通过输血、器官移植、药瘾者共用针具等方式传播。③母婴传播:感染 HIV 的孕妇可以通过胎盘、产程中及产后血性分泌物、哺乳等传给婴儿。④其他途径接受 HIV 感染者的人工授精,医务人员被 HIV 污染的针头刺伤或皮肤破损处受污染等。目前尚无证据证明一般日常生活接触、食物、水、昆虫能够传播本病。

85.下列各项,不是狂犬病传染源的是

- A.病犬
- B.蝙蝠
- C.臭鼬
- D.浣熊
- E.患者

答案:E

解析:带狂犬病毒的动物是本病传染源,我国狂犬病主要传染源是病犬,蝙蝠、臭鼬、浣熊等野生动物也成为主要传染源,一般来说,狂犬患者不是传染源。

86.乙型脑炎(简称乙脑)的主要传染源是

- A.猪
- B.乙脑病毒携带者
- C.乙脑患者
- D.蚊虫
- E.野鼠

答案:A

解析:乙脑是人畜共患的自然疫源性疾病,人和动物感染乙脑病毒后可发生病毒血症,成为传染源。家畜、家禽和鸟类均可感染乙脑病毒。猪的感染率高,感染后血中病毒含量多,病毒血症期长,且猪的饲养范围广,更新快,是本病主要的传染源。

87.流行性脑脊髓膜炎的主要传染源是


- A.患者和带菌者
- B.苍蝇
- C.鼠类
- D.污染水源
- E.病毒

答案:A

解析:流行性脑脊髓膜炎传染源是带菌者和流脑患者,因脑膜炎球菌在外界生活力极弱,故间接传播极少。

88.鉴别流脑和乙脑最有意义的是

- A.意识障碍
- B.病理反射
- C.皮肤瘀斑
- D.体温升高



E.颅内高压

答案:C

解析:流行性乙型脑炎:有严格季节性,在7~9月间流行。无皮肤黏膜瘀点。流行性脑脊髓膜炎以突发高热、头痛、呕吐、皮肤黏膜瘀点和脑膜刺激征为主要临床表现。

89.中毒性菌痢最严重的临床表现是

A.起病急骤

B.高热

C.惊厥

D.循环衰竭和呼吸衰竭

E.昏迷

答案:D

解析:中毒性菌痢最严重的临床表现是循环衰竭和呼吸衰竭,为混合型的临床表现,其死亡率高达90%以上。起病急骤、高热可见于普通型菌痢;惊厥、昏迷可见于中毒性菌痢中的脑型;以上两者并非最严重的临床类型。

90.有关隔离的描述,错误的是

A.是控制传染病流行的重要措施

B.便于管理传染源

C.可防止病原体向外扩散给他人

D.根据传染病的平均传染期来确定隔离期限

E.某些传染病患者解除隔离后尚应进行追踪观察

答案:D

解析:传染病患者的隔离期限原则是根据传染病的 longest 传染期而确定的,同时尚应根据临床表现和微生物检验结果来决定是否可以解除隔离。某些传染病患者出院后尚应追踪观察。

91.对医学模式的理解不正确的是

A.医学模式即医学观,是对医学本质的概括

B.医学模式来源于医学实践

C.医学模式反映人们对医学的总体认识

D.医学模式不是一成不变的

E.医学模式只存在唯一的形式

答案:E

解析:医学模式即医学观,是对医学本质的概括。是指在特定历史时期内,人们关于健康和疾病的基本观点,或特定历史时期,人们在观察和处理人类健康和疾病问题时的思维方式和行为方式。医学模式来源于医学实践,是对医学实践的反映和概括,一定的医学模式与一定的社会发展和医学发展水平相适应。医学模式反映人们对医学的总体认识,它是医学临床实践活动和医学科学研究的指导思想和理论框架,它反映医学科学总的特征。在不同的历史时期有不同的医学模式。

92.生命质量的衡量标准不包括

A.个体生命健康程度

B.个体生命优化条件

C.个体生命治愈希望

D.个体生命预期寿命

E.个体生命德才素质

答案:B

解析:生命质量的衡量标准包括①主要质量:个体的身体和直立状态;②根本质量:生命的

意义和目的，与其他人在社会和道德上的相互作用；③操作质量：用来测知智能、生理方面的人性质量。个体生命健康程度，是个体的身体状态，属于主要质量；个体生命治愈希望、个体生命预期寿命，属于操作质量；个体生命德才素质，是个体与其他人在社会和道德上的相互作用，属于根本质量。个体生命优化条件，是寻求改变的途径，不是衡量标准。

93.医患冲突的化解方式不恰当的是

- A.不属于医疗事故的医疗纠纷通过医患沟通来化解
- B.医生在医患纠纷的化解中起主导作用
- C.遵循公开、公平、公正原则，坚持实事求是的科学态度
- D.医生以候诊病人多为由拒绝向病人解释病情，告知病人自行查阅相关资料
- E.由医疗事故引发的医疗纠纷，应该依据相关的法律、法规和制度进行处理

答案:D

解析:大部分的医患纠纷都是因为沟通方面存在问题，比如在知识、信息方面的不对称，医生在解释方面的欠缺，病人理解上的误区等等往往是产生纠纷的主要因素。在医患关系中医生起主导作用，在医患纠纷的化解上医生应当承担更大的责任。医生不能以任何理由侵害病人的知情权，应及时全面地向患者解释病情，并给予恰当指导以控制、治疗疾病。不属于医疗事故的医疗纠纷应当通过医患沟通来化解。

94.下列各项，符合体格检查道德要求的是

- A.尊重病人，心正无私
- B.全神贯注，语言得当
- C.客观求实，科学探索
- D.安全保密，谨慎行事
- E.综合分析，合理运用

答案:A

解析:体格检查的道德要求：①尊重患者的人格；②减轻患者的痛苦；③不怕麻烦、不嫌脏秽。

95.关于医德教育意义的叙述，不包括

- A.培养全面合格的医学人才
- B.树立正确的人生观价值观
- C.形成良好的医德医风
- D.形成稳定的人格倾向
- E.形成良好的医德行为和习惯

答案:D


解析:医德教育是培养全面、合格的医学人才的重要手段，有助于树立正确的人生观、价值观和道德观。医德教育是形成良好医德医风的重要环节，且是促进医学科学工作发展的重要措施。

96.在使用辅助检查手段时，不适宜的是

- A.认真严格地掌握适应证
- B.可以广泛积极地依赖各种辅助检查
- C.有利于提高医生诊治疾病的能力
- D.必要检查能尽早确定诊断和进行治疗
- E.应从患者的利益出发决定该做的项目

答案:B

解析:医学辅助检查是运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科，主要研究如何通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。但所有的方法都有其适用范围。



围，并非是诊断所必需的主要的依赖条件，对疾病的诊断还是需要结合疾病的特点诊断。

A2 型题

97.患者神情漠然，如寒无寒，如热无热，时欲饮食，时见纳呆，坐卧不安，口苦，尿赤，脉微数，治宜选用

- A.百合知母汤
- B.百合地黄汤
- C.甘草泻心汤
- D.甘麦大枣汤
- E.百合鸡子汤

答案:B

解析:百合病的临床表现主要为两方面:一为变幻不定之征,如“欲食复不能食、欲卧不能卧、欲行不能行、似寒非寒、似热非热、身形如和”等;二为客观可凭之征,如阴虚内热所致“口苦、小便赤、其脉微数”。《金匱要略》:“百合病不经吐、下、发汗,病形如初口者,百合地黄汤主之。”

98.风湿病患者身体消瘦,右膝踝关节肿大明显,无明显疼痛,胃纳欠佳,口干欲饮,舌红少苔,脉细略数。治疗宜选用

- A.黄芪桂枝五物汤
- B.桂枝附子汤
- C.桂枝芍药知母汤
- D.乌头汤
- E.防己黄芪汤

答案:C

解析:《金匱要略》:“诸肢节疼痛,身体魁羸口,脚肿如脱,头眩短气,温温欲吐,桂枝芍药知母汤主之。”身体魁羸:形容关节肿大,身体瘦弱。脚肿如脱:形容两脚肿胀,且麻木不仁,似乎与身体脱离一样。

99.患者心下痞满,恶心呕吐,肠鸣,便溏,舌质稍淡,舌苔淡黄而厚腻,脉滑,治宜

- A.生姜泻心汤
- B.大黄黄连泻心汤
- C.五苓散
- D.半夏泻心汤
- E.桂枝人参汤

答案:D

解析:因心下痞为主症,故其病位主在中焦,邪气内陷,寒热错杂于中焦,故心下痞满,中焦气机失常,则脾胃升降失常,胃气上逆为呕,脾气不升为肠鸣泄泻。半夏泻心汤可辛开苦降,散结除痞,和胃降逆。

100.面目俱赤,语声重浊,呼吸俱粗,大便闭,小便涩,舌苔老黄,甚则黑有芒刺,但恶热,不恶寒,日晡益甚者,是属何种温病

- A.阳明温病
- B.太阴温病
- C.下焦温病
- D.少阴温病
- E.少阳温病

答案:A



解析:面目俱赤,语声重浊,呼吸俱粗,大便闭,小便涩,舌苔老黄,甚则黑有芒刺,但恶热,不恶寒,日晡(益甚者,传至中焦,阳明温病也。脉浮洪躁甚者,白虎汤主之;脉沉数有力,甚则脉体反小而实者,大承气汤主之。暑温、湿温、温疟,不在此例。(中焦1条)。

101.患者,女性,53岁。右上齿痛半年,隐隐作痛,时作时止,脉沉。针灸治疗在合谷、颊车、下关的基础上,应加取

- A.太冲、二间
- B.外关、风池
- C.风池、太冲
- D.风池、侠溪
- E.太溪、行间

答案:E

解析:题干中患者齿痛半年,隐隐作痛,时作时止,脉沉为虚火牙痛。风火牙痛配外关、风池;胃火牙痛配内庭、二间;虚火牙痛配太溪、行间。

102.患者外感风寒,咽喉赤肿疼痛,吞咽困难,咽干,咳嗽。治疗应首选

- A.合谷
- B.内庭
- C.太溪
- D.鱼际
- E.廉泉

答案:A

解析:合谷为手阳明经原穴,主治五官诸疾、外感病证。内庭为足阳明胃经之荥穴,主治齿痛、咽喉肿痛、鼻衄等五官热性病证;太溪为足少阴肾经之输穴、原穴,可治疗咽喉肿痛、齿痛、耳聋、耳鸣等阴虚性五官病证;鱼际为手太阴肺经之荥穴,可治疗咳嗽、咯血、咽干、咽喉肿痛、失音等肺系热性病证;廉泉穴属任脉,可治疗中风失语、暴暗、吞咽困难、舌缓流涎、舌下肿痛、口舌生疮、喉痹等咽喉口舌病证。

103.患者,女,26岁。非周期性子宫出血,量多、色紫红、质稠,夹有血块,腹痛拒按,舌红苔黄,脉弦数。治疗除取关元、三阴交、隐白穴外,还应加

- A.气海、百会
- B.中极、阴交
- C.归来、合谷
- D.血海、水泉
- E.曲泉、血海

答案:D

解析:患者年轻女患者,非周期性子宫出血为崩漏;其量多、色紫红、质稠,夹有血块,腹痛拒按,舌脉亦是佐证,当为实热。故应加血海、水泉,可泄血中之热,以止血热之妄行。

104.患者,女性,50岁。因恼怒致胃脘胀痛,嗳气,呕酸,舌苔薄白,脉弦。依据“近部取穴”的原则,治疗应首选

- A.足三里
- B.膻中
- C.太冲
- D.天枢
- E.中脘

答案:E

解析:中脘既是胃募穴又是八会穴之腑会,位于任脉,在上腹部,前正中线上,当脐中上4

寸，近于胃脘部，可调中焦，理脾胃。

105.面部疼痛突然发作，呈闪电样、刀割样剧痛，持续数秒到2分钟，痛处有灼热感，流涎，目赤流泪，苔薄黄，脉数。治疗除取主穴外，还应选取

- A.丝竹空、阳白、外关
- B.颧髎、迎香
- C.列缺、太阳
- D.曲池、尺泽
- E.太冲、三阴交

答案:D

解析:本题考查常见的病症的辨证、处方。面部疼痛突然发作，呈闪电样、刀割样剧痛，持续数秒到2分钟可诊断为面痛。面痛多与外感邪气、情志不调、外伤因素有关，治法当以疏通经络，祛风止痛为主。以足太阳及手足阳明经穴为主，该患者痛处有灼热感，流涎，目赤流泪，苔黄，脉数为风热证，故选取风池、曲池为配穴，尺泽亦能泻热。

106.患者，女，59岁。两膝关节红肿热痛，尤以右膝部为重，痛不可触，关节活动不利，并见身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数。治疗除选用犊鼻、梁丘、阳陵泉、膝阳关外，还应加

- A.大椎、曲池
- B.肾俞、关元
- C.脾俞、气海
- D.脾俞、胃俞
- E.肾俞、合谷

答案:A

解析:本题考查常见的病症的辨证、处方。题中患者两膝关节红肿热痛，尤以右膝部为重，痛不可触，关节活动不利，可辨证为痹症，并见身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数可进一步辨证为热痹症。大椎、曲池合用可用于治疗热痹症。

107.患者，男，48岁。头胀痛近2年，时作时止，伴目眩易怒，面赤口苦，舌红苔黄，脉弦数。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A.头维、内庭、三阴交
- B.血海、风池、足三里
- C.风池、列缺、太阳
- D.太溪、侠溪、太冲
- E.丰隆、太阳、风门

答案:D

解析:太阳头痛配天柱、后溪、昆仑；阳明头痛配印堂、内庭；少阳头痛配率谷、外关、足临泣；厥阴头痛配四神聪、太冲、内关。风寒头痛配风门、列缺；风热头痛配曲池、大椎；风湿头痛配头维、阴陵泉；肝阳上亢头痛配太溪、太冲；痰浊头痛配中脘、丰隆；瘀血头痛配血海、膈俞；血虚头痛配脾俞、足三里。

108.患者，男，23岁。1周前外出淋雨受寒，3天前出现腰痛，并放射至小腿后侧。治疗的主穴是

- A.腰夹脊、秩边、委中、承山、昆仑、阿是穴
- B.腰夹脊、环跳、阳陵泉、悬钟、丘墟
- C.腰夹脊、肾俞、大肠俞、环跳、秩边、委中、阳陵泉
- D.阿是穴、肾俞、大肠俞、秩边、昆仑
- E.大肠俞、阿是穴、委中

答案:A





解析:坐骨神经痛以腰或臀、大腿后侧、小腿后外侧及足外侧的放射性、电击样、灼烧样疼痛为主症。患者腰痛放射至小腿后侧,属于足太阳经证。其治疗主穴为腰夹脊、秩边、委中、承山、昆仑、阿是穴。

109.患者,女,30岁。3天前因对着空调入睡,次日睡眠醒来时发现一侧面部肌肉板滞、麻木、瘫痪,额纹消失,针刺起远治作用的主穴是

- A.攒竹、丝竹空
- B.合谷、太冲
- C.阳白、四白
- D.颧髎、颊车
- E.丝竹空、阳白

答案:B

解析:本病患者属面瘫急性发作。治法为祛风通络,疏调经筋。取局部穴、手足阳明经穴为主。主穴为攒竹、阳白、四白、颧髎、颊车、地仓、合谷、太冲。面部诸穴可疏通局部经筋气血,活血通络。“面口合谷收”,合谷为循经远端取穴,可祛除阳明、太阳经筋之邪气,祛风通络。太冲为足厥阴原穴,肝经循行“上出额”,“下颊里,环唇内”,与合谷相配,具有加强疏调面颊部经气作用。

110.治疗风疹、风团风热证,在取主穴的基础上,应加

- A.风门、肺俞
- B.大椎、风门
- C.天枢、足三里
- D.脾俞、足三里
- E.天突、内关

答案:B

解析:治疗瘾疹的主穴是曲池、合谷、血海、膈俞、三阴交。风热犯表配大椎、风门;风寒束表配风门、肺俞;胃肠积热配天枢、足三里;血虚风燥配脾俞、足三里。呼吸困难配天突;恶心呕吐配内关。

111.某男,63岁,头晕目眩,甚则昏眩欲仆,伴耳鸣,腰膝酸软,遗精,舌淡,脉沉细。除风池、百会外,应加用

- A.内关、太冲、行间、侠溪、太溪
- B.内关、太冲、头维、丰隆、中脘
- C.肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞
- D.肝俞、肾俞、足三里、太溪、悬钟、三阴交
- E.头维、血海、膈俞、内关、足三里、太溪


答案:D

解析:根据题干症状诊断为:眩晕虚证之肾精不足证。主穴:百会风池肝俞肾俞足三里。配穴:肾精不足配太溪、悬钟、三阴交。

112.患者,女,45岁,失眠2个月,近日来入睡困难,有时睡后易醒,醒后不能再睡,甚至彻夜不眠,舌苔薄,脉沉细。治疗应首选

- A.神门、内关
- B.神门、胆俞
- C.神门、三阴交
- D.心俞、脾俞
- E.心俞、足三里

答案:C



解析:神门、内关、三阴交治疗失眠伴随脾胃不和之症状。神门、胆俞治疗失眠伴心胆气虚之症状。心俞、脾俞治疗失眠伴心脾亏虚之症状。神门为心经的原穴,功能补益心气,主治心痛心烦,惊悸怔忡,失眠健忘等心与神志病证。三阴交功用为健脾和胃,调理气血,通经活络,可治疗心悸、失眠、高血压等证。本题为不寐,治疗应补气养心安神。

113.某男,70岁,大便艰涩,排出困难,腹中冷痛,面色㿔白,四肢不温,畏寒喜暖,小便清长,舌淡苔白,脉沉迟。治疗本病,除主穴外,还应加用

- A.合谷、内庭
- B.太冲、中脘
- C.脾俞、气海
- D.神阙、关元
- E.足三里、三阴交

答案:D

解析:根据题干症状辨证为:便秘之冷秘。针灸治疗宜配神阙、关元。

114.患者,男,68岁。家属代诉患者于今日下午外出散步,突然昏仆,不省人事,半身不遂,目合口张,鼻鼾息微,遗尿,汗出,四肢厥冷,脉细弱。治疗应首选

- A.督脉经穴,灸法
- B.任脉经穴,灸法
- C.背俞穴,灸法
- D.足阳明经穴,灸法
- E.足厥阴经穴,针刺用泻法

答案:B

解析:本题考查常见的病症的辨证、处方。题中患者于今日下午外出散步,突然昏仆,不省人事,半身不遂,目合口张,鼻鼾息微,遗尿,汗出,四肢厥冷,脉细弱,可诊断为中风脱证。针刺任脉经穴主治少腹,脐腹,胃脘,胸,颈,咽喉,头面等局部病证和相应的内脏病证,部分腧穴有强壮作用或可治疗神志病。

115.治疗颈椎病兼见头痛,头晕,应配

- A.合谷、列缺
- B.肝俞、肾俞
- C.合谷、手三里
- D.百会或四神聪
- E.中脘、内关

答案:D


解析:颈椎病的治法为通经止痛,取局部腧穴和手足三阳经穴、督脉穴为主。主穴为颈夹脊、天柱、风池、曲池、悬钟、阿是穴。头晕头痛配百会或四神聪以疏通脉络,提神醒脑。

116.某男,40岁,阑尾手术后,出现小便闭塞不通,努责无效,小腹满痛,舌紫暗,脉涩。治疗应首选的主穴是

- A.关元、三阴交、肾俞
- B.中极、膀胱俞、秩边、阴陵泉、三阴交
- C.中脘、大肠俞、天枢、秩边
- D.关元、脾俞、肾俞、三焦俞、秩边
- E.天枢、大肠俞、上巨虚、支沟

答案:B

解析:根据患者的临床表现可诊断为癃闭实证。针灸治疗癃闭实证的主穴为中极、膀胱俞、秩边、阴陵泉、三阴交。



B1 型题

(共用备选答案题)

- A.手太阴肺经
- B.手阳明大肠经
- C.足阳明胃经
- D.手少阴心经
- E.手太阳小肠经

117.曲池穴归属于

答案:B

解析:曲池为手阳明大肠经合穴,当屈肘,成直角时,曲池当肘横纹外端与肱骨外上髁连线的中点。

118.通里穴归属于

答案:D

解析:通里穴为手少阴心经腧穴,在前臂前区,腕掌侧远端横纹上1寸,尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。

(共用备选答案题)

- A.足太阳膀胱经
- B.足阳明胃经
- C.足少阳胆经
- D.手少阳三焦经
- E.手太阳小肠经

119.从耳后,入耳中至目外眦之下的经脉是

答案:D

解析:足太阳膀胱经起于目内眦,至耳上角,入络脑。足阳明胃经起于鼻,入上齿,环口夹唇,循喉咙。足少阳胆经至目锐眦,下耳后,入耳中,出耳前。手少阳三焦经从耳后,出耳上角,入耳中,至目锐眦。

120.至目外眦,转入耳中的经脉是

答案:E

解析:手太阳小肠经循咽,至目内外眦,入耳中,抵鼻。

(共用备选答案题)

- A.灯草灸
- B.隔姜灸
- C.隔蒜灸
- D.隔盐灸
- E.隔泥灸

121.治疗瘰疬、肺癆及肿疡初起等病症,可于神阙穴施

答案:C

解析:隔蒜灸,具有清热解毒、杀虫等作用,多用于治疗瘰疬、肺癆及肿疡初起等病症。


122.治疗风寒痹痛常用

答案:B

解析:隔姜灸,用于呕吐、泄泻、脘腹隐痛、遗精、阳痿、痛经、面瘫等;隔蒜灸,具有清热解毒、消肿散结、杀虫、健胃等作用。

(共用备选答案题)

- A.普萘洛尔



- B.硝酸甘油
- C.维拉帕米
- D.地尔硫草
- E.奎尼丁

123.变异型心绞痛不宜选用

答案:A

解析:普萘洛尔是 $\beta$ 受体阻滞剂,用于稳定型心绞痛和不稳定型心绞痛,而对变异型心绞痛,因本类药物阻断 $\beta$ 受体后,使 $\alpha$ 受体作用占优势,易致冠脉痉挛,从而加重心肌缺血症状,故不宜应用。

124.伴有支气管哮喘的心绞痛患者不宜选用

答案:A

解析:普萘洛尔是 $\beta$ 受体阻滞药,其不良反应有:心功能不全、诱发或加重支气管哮喘。故不宜选用。

(共用备选答案题)

- A.可待因
- B.喷托维林
- C.氯哌斯汀
- D.右美沙芬
- E.苯丙哌林

125.有镇咳、局麻及轻度阿托品样作用,用于呼吸道炎症引起的干咳、阵咳,尤其是小儿百日咳的药物是

答案:B

解析:喷托维林有镇咳、局麻及轻度阿托品样作用,用于呼吸道炎症引起的干咳、阵咳,尤其是小儿百日咳。

126.各种原因引起的剧烈干咳,尤其是其他药物无效者、胸膜炎干咳伴胸痛者,应首选的药物是

答案:A

解析:可待因用于各种原因引起的剧烈干咳,尤其是其他药物无效者、胸膜炎干咳伴胸痛者。

(共用备选答案题)

- A.阿司匹林
- B.对乙酰氨基酚
- C.布洛芬
- D.塞来昔布
- E.吲哚美辛

127.可用于手术后疼痛的药物是

答案:D

解析:塞来昔布主要用于风湿性、类风湿性关节炎和骨关节炎,一般在用药2周后疼痛和关节功能状态明显改善,也用于手术后疼痛、牙痛、痛经等。

128.长期口服可引起凝血障碍的药物是

答案:A

解析:阿司匹林能抑制血小板聚集,延长出血时间,大剂量或长期使用还能抑制凝血酶原形成,延长凝血酶原时间。

(共用备选答案题)

A.作用于髓袢升支粗段的髓质和皮质部,抑制 $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 共同转运系统

- B.作用于髓袢升支粗段皮质部，抑制  $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$  共同转运系统
- C.作用于远曲小管和集合管，竞争醛固酮受体，对抗醛固酮的作用
- D.作用于远曲小管近端，阻滞  $\text{Na}^+$  通道，减少  $\text{Na}^+$  的重吸收
- E.作用于近曲小管，抑制碳酸酐酶，减少  $\text{H}^+-\text{Na}^+$  交换

129.呋塞米的利尿作用机制是

答案:A

解析:呋塞米抑制髓袢升支粗段上皮细胞上的  $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$  同向转运机制，产生强效利尿作用。

130.螺内酯的利尿作用机制是

答案:C

解析:螺内酯化学结构与醛固酮相似，可竞争性地与胞浆中的醛固酮受体结合，拮抗醛固酮的排钾保钠作用，产生与醛固酮相反的作用即保钾利尿。其利尿作用与醛固酮水平有关，作用弱而缓慢。

(共用备选答案题)

- A.胸膜炎
- B.肺炎链球菌肺炎
- C.空洞型肺结核
- D.支气管扩张
- E.喉头水肿

131.可表现为犬吠样咳嗽伴呼吸困难的疾病是

答案:E

解析:喉头水肿可见犬吠样咳嗽伴呼吸困难。

132.可表现为发热伴干性咳嗽的疾病是

答案:A

解析:胸膜炎可见发热伴干性咳嗽；肺炎链球菌肺炎、空洞型肺结核可见发热伴湿性咳嗽；支气管扩张可见咯血、脓痰。

(共用备选答案题)

- A.苦笑面容
- B.伤寒面容
- C.甲亢面容
- D.二尖瓣面容
- E.慢性病面容

133.消瘦，两眼球突出，兴奋不安，呈惊恐貌，多见于

答案:C

解析:消瘦，两眼球突出，兴奋不安，呈惊恐貌，多见于甲亢面容。

134.两颧紫红，口唇发绀，多见于

答案:D

解析:苦笑面容见于破伤风；伤寒面容表情淡漠，反应迟钝，呈无欲状态，见于肠伤寒、脑脊髓膜炎、脑炎等高热衰竭患者；慢性病面容憔悴，面色晦暗或苍白无华，目光暗淡，见于慢性消耗性疾病，如恶性肿瘤、肝硬化、严重结核病等。两颧紫红，口唇发绀，多见于二尖瓣面容。

(共用备选答案题)

- A.淀粉酶
- B.血清转氨酶
- C. $\gamma$ -谷氨酰基转肽酶

D.血清碱性磷酸酶

E.肌酸磷酸激酶

135.对诊断骨质疏松最有意义的是

答案:D

解析:淀粉酶是胰腺炎的实验室诊断依据;血清转氨酶、 $\gamma$ -谷氨酰基转肽酶用于肝功能的检测;血清碱性磷酸酶是骨质疏松的实验室诊断依据。

136.对诊断心肌梗死最有意义的是

答案:E

解析:肌酸磷酸激酶是心肌梗死的实验室诊断依据。

(共用备选答案题)

A.米泔样

B.黏液脓样

C.柏油样

D.灰白色

E.果酱色

137.霍乱的粪便形状是

答案:A

解析:米泔样见于霍乱;黏液脓样见于痢疾、溃疡性结肠炎、直肠癌等。

138.细菌性痢疾的粪便形状是

答案:B

解析:柏油样见于各种原因所致的上消化道出血;灰白色见于阻塞性黄疸;果酱色见于阿米巴痢疾。

(共用备选答案题)

A.补充营养,定期复查肾功能、血压和垂体功能

B.补充血容量、纠正酸中毒、改善微循环

C.抗病毒、减轻外渗、改善中毒症状和预防 DIC

D.稳定内环境、促进利尿、导泻和透析治疗

E.维持电解质稳定,防止继发感染

139.流行性出血热发热期的治疗原则是

答案:C

解析:肾综合征出血热发热期治疗原则:抗病毒、减轻外渗、改善中毒症状和预防 DIC;低血压休克期治疗原则:补充血容量、纠正酸中毒、改善微循环。

140.流行性出血热少尿期的治疗原则是

答案:D

解析:肾综合征出血热少尿期治疗原则:稳定内环境、促进利尿、导泻和透析治疗;多尿期治疗原则:维持电解质稳定,防止继发感染;恢复期治疗原则:补充营养,定期复查肾功能、血压和垂体功能。

(共用备选答案题)

A.变质性炎

B.化脓性炎

C.增生性炎

D.出血性炎

E.假膜性炎

141.流行性脑脊髓膜炎,病理变化为



答案:B

解析:化脓性炎为流行性脑脊髓膜炎的病理变化。

142.流行性乙型脑炎,其病理变化为

答案:A

解析:变质性炎为流行性乙型脑炎的病理改变。增生性炎是增生性炎的病变特点:①浸润的细胞主要是淋巴细胞、浆细胞和单核细胞;②局部组织破坏主要是由炎细胞引起;③常有较明显的结缔组织、血管和上皮细胞、腺体等实质细胞的增生,在黏膜可形成息肉,在肺常形成炎性假瘤,在管道性脏器可引起狭窄和梗阻。出血性炎是渗出性炎症的一个类型,因炎症灶的血管损伤严重,致使渗出物中含大量红细胞,常见于流行性出血热、钩端螺旋体病和鼠疫等。假膜性炎易发生于黏膜、浆膜和肺组织。发生于黏膜者渗出的纤维蛋白原形成的纤维素、坏死组织和嗜中性粒细胞共同形成假膜,又称假膜性炎,见于白喉。

(共用备选答案题)

- A.复方磺胺甲基异唑
- B.痢特灵
- C.四环素
- D.土霉素
- E.庆大霉素

143.治疗中毒型菌痢的首选药物是

答案:A

解析:中毒型菌痢的病原治疗,首选药物为喹诺酮类药物,包括环丙沙星和左氧氟沙星等,其次为复方磺胺甲基异唑,其他如阿奇霉素、多西环素、庆大霉素和三代头孢菌素等药物也可根据药敏结果选用。

144.治疗霍乱的首选药物是

答案:C

解析:霍乱的病原体是霍乱弧菌,革兰染色阴性。四环素族均为广谱抗生素,对多数革兰阳性与阴性菌有抑制作用,对革兰阴性杆菌作用较好。其作用机制主要是阻止氨酰基与核糖核蛋白体的结合,阻止肽链的增长和蛋白质的合成,从而抑制细菌的生长,高浓度时也有杀菌作用。

(共用备选答案题)

- A.血液传播
- B.性交传播
- C.粪-口传播
- D.日常生活接触
- E.母婴传播

145.戊肝的传播途径是

答案:C

解析:甲型肝炎主要由粪-口途径传播,戊肝传播途径与甲肝相似。

146.丙肝的传播途径是

答案:A

解析:乙型肝炎主要由血液、体液传播和母婴传播;丙型肝炎主要由血液传播;丁肝传播途径与乙肝相似。

(共用备选答案题)

- A.医学关系中的主体在道义上应享有的权利和利益
- B.医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命

- C.医学关系的主体对应尽义务的自我认识 and 自我评价的能力
- D.医学关系中的主体因履行道德职责受到褒奖而产生的自我赞赏
- E.医学关系中的主体在医疗活动中对自己和他人关系的内心体验和感受

147.作为医学伦理学基本范畴的良心是指

答案:C

解析:医学道德的基本范畴有权利与义务、情感与良心、审慎与保密、荣誉与幸福等。医学道德良心是指医务人员在履行对病人、集体和社会义务的过程中,对自己行为应负道德责任的自觉认识 and 自我评价能力。

148.作为医学伦理学基本范畴的情感是指

答案:E

解析:医学道德情感是建立在医务人员对病人的生命价值、人格和权利尊重的基础上,表现出对病人、对医学事业的真挚热爱,是一种高尚的情感。

(共用备选答案题)

- A.医患关系是一种民事法律关系
- B.医患关系是具有道德意义较强的社会关系
- C.医患关系是一种商家与消费者的关系
- D.医患关系是包括非技术性和技术性方面的关系
- E.医患关系是患者与治疗者在诊疗和保健中所建立的联系

149.反映医患关系本质的是

答案:B

解析:医患关系的本质是指在医疗活动中医务人员同患者的关系,是一种契约关系,又是一种信托关系。随着社会的发展,现在已经逐渐形成了一种复杂的社会关系。

150.概括医患关系内容的是

答案:E

解析:医患关系的内容是患者与治疗者在诊治过程中所建立的联系。

### 第三单元

#### A1 型题

1.关于支气管哮喘发作的临床表现,下列哪项不正确

- A.强迫端坐位
- B.出现严重呼气性呼吸困难
- C.呼吸动度增大,呈吸气位
- D.语音震颤减弱
- E.大汗淋漓伴发绀

答案:C

解析:支气管哮喘发作时患者可出现严重的呼气性呼吸困难,被迫采取坐位或端坐位,呼吸辅助肌参与呼吸,严重者大汗淋漓伴发绀呼吸动度变小,呈吸气位。由于多数并发肺气肿,所以语音震颤减弱。两肺可闻干啰音及哮鸣音。

2.肺炎球菌肺炎发病 1~2 天后,其痰液特征是

- A.白色黏液痰
- B.黏液泡沫痰
- C.黏液脓性痰
- D.铁锈色痰
- E.大量脓痰



答案:D

解析:肺炎球菌肺炎由于渗出到肺泡内的红细胞破坏后释放出含铁血黄素,混在痰中,故出现铁锈色痰为痰液的特征。白色黏液痰、黏液泡沫痰不具特异诊断价值,黏液脓性痰、大量脓痰一般提示肺脓肿。

3.慢性肺心病,咳喘无力,气短难续,咳痰不爽,面色晦暗,心慌,唇甲发紫,神疲乏力,舌淡暗,脉沉细涩无力。治疗应首选

- A.越婢加半夏汤
- B.生脉散合血府逐瘀汤
- C.真武汤
- D.苏子降气汤
- E.补肺汤

答案:B

解析:慢性肺心病,呼吸浅短,声低气怯,张口抬肩,倚息不能平卧,心慌,形寒,汗出,舌淡紫,脉沉细微无力,属于肺肾气虚,治疗首选补肺汤加减。咳喘无力,气短难续,咳痰不爽,面色晦暗,心慌,唇甲发紫,神疲乏力,舌淡暗,脉沉细涩无力,是气虚不能推动血行而导致的瘀血,治疗应选生脉散合血府逐瘀汤。

4.急性右心衰竭主要常见病因为

- A.肺淤血
- B.急性肺水肿
- C.心源性休克
- D.右心室梗死
- E.急性心肌缺血

答案:D

解析:急性右心衰竭主要常见病因为右心室梗死和急性大块肺栓塞。

5.下列各项中,不属于缓慢心律失常病因的是

- A.迷走神经张力降低
- B.器质性心脏病、甲状腺功能减退、血钾过高
- C.房室传导阻滞
- D.病态窦房结综合征
- E.应用洋地黄、 $\beta$ 受体阻滞剂等药物


答案:A

解析:(1)缓慢性窦性心律失常①生理状况:迷走神经张力增高(健康人、老年人、睡眠状态);②病理状况:器质性心脏病、甲状腺功能减退、血钾过高,应用洋地黄、 $\beta$ 受体阻滞剂等药物。(2)房室传导阻滞心肌炎、急性下壁及前壁心肌梗死、原因不明的希-浦系统纤维化、冠心病、高血钾、应用洋地黄以及缺氧等。(3)病态窦房结综合征冠心病、原发性心肌病、风湿性心脏病、高血压心脏病、心肌炎、先天性心脏病。

6.原发性高血压的最重要的致病原因是

- A.摄盐量过多
- B.吸烟
- C.交感神经兴奋性增强
- D.肾上腺嗜铬细胞瘤
- E.遗传素质

答案:E



解析:原发性高血压的最重要的致病原因是遗传素质,约70%以上的病人有遗传背景。在遗传因素的基础上,摄盐量过多、吸烟、交感神经兴奋性增强都在原发性高血压的发生中起作用。而肾上腺嗜铬细胞瘤患者发生的高血压属于继发性高血压。

7.减慢心率从而降低心肌耗氧量,缓解心绞痛的药物是

- A.硝酸异山梨醇酯(消心痛)
- B.硝苯地平(心痛定)
- C.胺碘酮
- D.美托洛尔
- E.硝酸甘油

答案:D

解析:美托洛尔为 $\beta$ 受体阻滞剂,可通过阻断 $\beta$ 受体,减慢心率,减弱心肌收缩力,降低血压,而减少心肌耗氧量,缓解心绞痛。

8.下列属于肝硬化门脉高压症的表现的是

- A.黄疸
- B.出血倾向
- C.恶心、呕吐
- D.静脉曲张
- E.疲乏无力

答案:D

解析:门静脉高压症的临床表现:①脾肿大②侧支循环的建立和开放:临床上三大重要的侧支开放为食管下段与胃底静脉曲张、腹壁静脉曲张、痔静脉曲张③腹水。

9.治疗溃疡性结肠炎阴血亏虚证首选

- A.四神丸
- B.驻车丸
- C.痛泻要方
- D.白头翁汤
- E.膈下逐瘀汤

答案:B

解析:溃疡性结肠炎阴血亏虚证治法为滋阴养血,清热化湿,方药首选驻车丸。

10.治疗上消化道出血脾不统血证,应首选

- A.泻心汤合十灰散加减
- B.龙胆泻肝汤加减
- C.归脾汤加减
- D.独参汤加减
- E.四味回阳饮加减

答案:C

解析:治疗上消化道出血脾不统血证需益气健脾,养血止血,方选归脾汤加减。A用于胃中积热证,B用于肝火犯胃证,D、E合用于气随血脱证。故本题选C。

11.慢性肾炎水湿证首选方剂是

- A.异功散加味
- B.玉屏风散合金匱肾气丸
- C.附子理中丸或济生肾气丸加减
- D.杞菊地黄丸加减
- E.五苓散合五皮饮加减

答案:E

解析:慢性肾炎水湿证。证候:颜面或肢体浮肿,舌苔白或白腻,脉缓或沉缓。治法:利水消肿。方药:五苓散合五皮饮加减。

12.知柏地黄丸治疗尿路感染的治法是

- A.疏肝理气,清热通淋
- B.益气健脾,利湿通淋
- C.滋阴益肾,清热通淋
- D.清热利湿,利尿通淋
- E.清心泻火,利湿通淋

答案:C

解析:治疗尿路感染肾阴不足、湿热留恋证的治法为滋阴益肾,清热通淋,代表方为知柏地黄丸加减。

13.下列各项中,不符合缺铁性贫血诊断的是

- A.男性血红蛋白 $<120\text{g/L}$ ,女性血红蛋白 $<100\text{g/L}$
- B.血清铁浓度常 $<8.9\mu\text{mol/L}$ ,总铁结合力 $>65.1\mu\text{mol/L}$
- C.血清铁蛋白 $<14\mu\text{g/L}$
- D.红细胞内游离原卟啉 $>0.9\mu\text{mol/L}$
- E.骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁增加

答案:E

解析:缺铁性贫血的诊断包括:①贫血为小细胞低色素性,男性 Hb $<120\text{g/L}$ ,女性 Hb $<100\text{g/L}$ ,孕妇 Hb $<100\text{g/L}$ 。②血清铁浓度低于正常。③血清铁蛋白 $<12\mu\text{g/L}$ 。④骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失,铁粒幼红细胞少于 15%,转铁蛋白饱和度 $<15\%$ 。⑤存在铁缺乏的病因,铁剂治疗有效。

14.外感温热证之白细胞减少症与粒细胞缺乏症的治疗方药是

- A.归脾汤加减
- B.黄芪建中汤合右归丸加减
- C.生脉散加减
- D.六味地黄丸加减
- E.犀角地黄汤合玉女煎加减

答案:E

解析:外感温热证之白细胞减少症与粒细胞缺乏症的治疗方法是清热解毒,滋阴凉血,方用犀角地黄汤合玉女煎加减。

15.糖尿病酮症酸中毒的临床特点是

- A.呼吸浅慢,不规则
- B.呼吸困难伴发绀
- C.呼吸深大,呼气中有烂苹果味
- D.呼吸浅快,呼气中有大蒜味
- E.潮式呼吸

答案:C

解析:糖尿病酮症酸中毒的临床特点有“三多一少”症状加重,病情迅速恶化,食欲减退,恶心呕吐,多尿,口干,头痛,嗜睡,呼吸深大,呼气中有烂苹果味。故本题选 C。

16.下列各项,不属于低钾血症表现的是

- A.肌无力
- B.频发室性早搏

- C.血气分析 pH 值低于正常
- D.代谢性碱中毒
- E.嗜睡

答案:C

解析:低钾血症的临床表现有患者感疲乏、软弱、乏力,全身性肌无力,肢体软瘫,腱反射减弱或消失,甚而膈肌、呼吸肌麻痹,呼吸困难,吞咽困难,严重者可窒息。消化系统表现为恶心、呕吐、厌食、腹胀、便秘、肠蠕动减弱或消失、肠麻痹等。中枢神经系统表现为萎靡不振、反应迟钝、定向力障碍、嗜睡或昏迷。循环系统表现为早期心肌应激性增强,心动过速,可有房性、室性期前收缩。酸碱平衡紊乱表现为代谢性碱中毒,故血气分析 pH 值高于正常。故本题选 C。

17.痛风慢性期典型者骨质的 X 线特征是

- A.骨质边缘反应
- B.多发性骨折和畸形
- C.痛风石沉积
- D.圆形或不整齐的穿凿样透亮缺损
- E.骨膜下皮质吸收和颅骨斑点状脱钙

答案:D

解析:慢性期可见关节间隙狭窄、关节面不规则、痛风石沉积,典型者骨质呈类圆形穿凿样或虫蚀样缺损、边缘呈尖锐的增生钙化,为尿酸盐侵蚀骨质所致。严重者出现脱位、骨折。

18.治疗甲状腺危象的首选药是

- A.丙基硫氧嘧啶
- B.甲硫氧嘧啶
- C.甲巯咪唑
- D.卡比马唑
- E.氢化可的松

答案:A

解析:甲状腺危象的治疗首先针对诱因治疗,如控制感染等;抑制甲状腺素的合成与释放,常首选丙基硫氧嘧啶 600mg 口服,以后每 6 小时给予 200mg,待症状缓解后逐步减至一般治疗量。

19.系统性红斑狼疮热瘀积饮证的治疗药为

- A.清瘟败毒饮加减
- B.葶苈大枣泻肺汤合泻白散加减
- C.犀角地黄汤加减
- D.八珍汤加减
- E.茵陈蒿汤合柴胡疏肝散加减

答案:B

解析:系统性红斑狼疮热郁积饮证的治疗方法为清热蠲饮,方用:葶苈大枣泻肺汤合泻白散加减。

20.短暂性脑缺血发作的主要病机是

- A.肝肾阴虚
- B.气虚血瘀
- C.痰瘀互结
- D.风邪入侵
- E.脉络阻滞

答案:B

解析:短暂性脑缺血发作主要病机是气虚血瘀,气虚为本,血瘀为标。

21.下列哪项不是急性中毒的临床表现有

- A.皮肤、黏膜症状
- B.眼症状
- C.神经系统症状
- D.泌尿系统症状
- E.内分泌系统症状

答案:E

解析:急性中毒的临床表现有:皮肤黏膜表现,眼部表现,神经系统表现,呼吸系统表现,循环系统表现,泌尿系统表现,血液系统表现。

22.血胆碱酯酶活力测定可疑时还可进行哪项检查

- A.痰液检查
- B.大便检查
- C.尿液检查
- D.脑脊液检查
- E.活组织检查

答案:C

解析:ChE活力是诊断有机磷杀虫药(OPI)中毒的特异性实验指标,对判断中毒程度、疗效和预后极为重要,但并不成完全平行关系。呕吐物、清洗液、尿液或血液中测到相应毒物或其代谢产物可以明确有机磷农药的具体名称甚至浓度,有助于诊断和治疗。

23.休克的监测除呼吸、血氧饱和度、神志和尿量外,还包括

- A.食量
- B.体重
- C.血压、心率
- D.水、电解质
- E.视力

答案:C

解析:休克需监测血压、心率、呼吸、血氧饱和度、神志和尿量等。

24.下列各项中,抢救热射病的方法不恰当的是


- A.积极降温
- B.保证气道通畅
- C.维持呼吸和循环稳定
- D.补充胶体液体
- E.补充晶体液体

答案:D

解析:热射病:预后严重,病死率高。现场可采取以下急救措施。去除衣物、保证气道通畅、给氧、静脉补充晶体液、维持呼吸和循环稳定。积极降温,从而减少器官损伤。

25.不寐的表现不包括

- A.睡眠时间不足
- B.睡眠深度不够
- C.入睡困难
- D.彻夜不寐
- E.经常不能获得正常睡眠



答案:E

解析:E 项为不寐的特征, 其余选项均为不寐的表现。不寐是以经常不能获得正常睡眠为特征的一类病证, 主要表现为睡眠时间、深度的不足, 轻者入睡困难, 或寐而不酣, 时寐时醒, 或醒后不能再寐, 重则彻夜不寐, 常影响人们的正常工作、生活、学习和健康。

26.脾胃虚弱, 痞满反复发作者, 治法宜首选

- A.疏肝解郁, 和胃消痞
- B.清热化湿, 和胃消痞
- C.理气宽胸, 补泻并用
- D.补气健脾, 升清降浊
- E.和胃降气, 消痞开结

答案:D

解析:腹痛脾胃虚弱证。证候:脘腹满闷, 时轻时重, 喜温喜按, 纳呆便溏, 神疲乏力, 少气懒言, 语声低微, 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱。治法:补气健脾, 升清降浊。方药:补中益气汤加减。

27.中满分消丸主要用于

- A.鼓胀之气滞湿阻证
- B.鼓胀之水热蕴结证
- C.鼓胀之水湿困脾证
- D.鼓胀之阳虚水盛证
- E.鼓胀之阴虚水停证

答案:B

解析:鼓胀水热蕴结证。证候:腹大坚满, 脘腹胀急, 烦热口苦, 渴不欲饮, 或有面、目、皮肤发黄, 小便赤涩, 大便秘结或溏垢, 舌边尖红, 苔黄腻或兼灰黑, 脉弦数。治法:清热利湿, 攻下逐水。方药:中满分消丸合茵陈蒿汤加减。

28.阳水辨证属湿热壅盛者, 其治疗最佳选方是

- A.己椒苈黄丸
- B.木防己汤
- C.舟车丸
- D.疏凿饮子
- E.八正散

答案:D

解析:阳水湿热壅盛证。证候:遍体浮肿, 皮肤绷急光亮, 胸脘痞闷, 烦热口渴, 小便短赤, 或大便干结, 舌红, 苔黄腻, 脉沉数或濡数。治法:分利湿热。方药:疏凿饮子加减。

29.自汗、盗汗肺卫不固证选用的治法是

- A.益气固表
- B.养血补心
- C.滋阴降火
- D.益气养血
- E.清肝泻火, 化湿和营

答案:A

解析:肺卫不固证。证候:汗出恶风, 稍劳汗出尤甚, 或表现半身、某一局部出汗, 易于感冒, 体倦乏力, 周身酸楚, 面色白少华, 苔薄白, 脉细弱。治法:益气固表。方药:桂枝加黄芪汤或玉屏风散加减。

30.痿证肺热津伤, 筋失濡润证代表方是



- A.三仁汤
- B.虎潜丸
- C.清燥救肺汤
- D.益胃汤
- E.加味二妙散

答案:C

解析:肺热津伤,筋失濡润证。证候:病起发热,或热病后突然出现肢体软弱无力,皮肤枯燥,心烦口渴,咳呛少痰,咽干不利,小便黄少,大便干燥,舌质红,苔黄,脉细数。治法:清热润燥,养肺生津。方药:清燥救肺汤加减。

#### A2 型题

31.患者,男,38岁。有溃疡病史,近2周来时常出现餐后上腹部疼痛,无节律性。昨日酒后症状加重,近日晨起呕吐,呕吐物为大量宿食。应首先考虑的是

- A.多发性胃溃疡
- B.十二指肠球部溃疡
- C.十二指肠球后部溃疡
- D.幽门部溃疡并发幽门梗阻
- E.胃溃疡恶变

答案:D

解析:患者有溃疡病史,因酒后出现呕吐,呕吐物为大量宿食,应首先考虑的是幽门部溃疡并发幽门梗阻。胃溃疡多表现为餐后1小时上腹痛;十二指肠球部溃疡表现为两餐间疼痛,餐后缓解;球后溃疡除具有十二指肠溃疡特点外,以夜间痛及背部放射痛多见。故本题选D。

32.患者男,67岁,久咳气逆,阵阵发作。痰少质粘,咳引胸胁疼痛,口干咽干,舌苔薄黄少津,脉象弦数,其治法宜用

- A.养阴清肝,化痰止咳
- B.清肺化痰,宣肃肺气
- C.清肺润燥,化痰止咳
- D.清肺泻肝,化痰止咳
- E.滋阴润肺,清肝止咳

答案:D

解析:综合患者症、舌、脉表现,辨病属咳嗽,辨证属肝火犯肺。肝气郁结化火,上逆侮肺,肺失肃降,则咳嗽气逆,阵阵发作;木火刑金,炼液成痰,故痰少质粘;火邪伤津,故口干咽干;肝脉布于两胁,上注于肺,肝肺络气不和,故咳引胸胁疼痛;舌苔薄黄少津,脉象弦数,为肝火肺热之证。治当清肺泻肝,化痰止咳。

33.男性,65岁,慢性喘息性支气管炎病史20余年,近5年来间断出现下肢浮肿,7天前受凉后咳、痰、喘加重,难以入睡,时有躁动,以下治疗错误的是

- A.抗感染
- B.化痰
- C.利尿
- D.营养支持
- E.安眠药镇静

答案:E

解析:患者老年男性,有慢性肺疾病,近5年来间断出现下肢浮肿,考虑慢性肺源性心脏病可能性大。现因感染诱发病情加重,应给予抗感染、化痰、解痉平喘、营养支持和改善右心



功能等治疗。但应避免给予镇静剂，以免出现呼吸中枢受抑制，加重通气功能障碍，甚至诱发肺性脑病。

34.男，50岁，一天来寒战高热（39.6℃），咳嗽伴左胸痛，咳痰呈砖红色胶冻状，量多，查体轻发绀，BP80 / 50mmHg，左肺叩浊，呼吸音低，X线胸片左肺呈多发性蜂窝状阴影，最可能的诊断为

- A.肺炎球菌肺炎，休克型
- B.葡萄球菌肺炎
- C.厌氧菌肺炎
- D.军团菌肺炎
- E.克雷白杆菌肺炎

答案:E

解析:克雷白杆菌肺炎，该病表现为急性发病，高热寒战，胸痛，咳嗽，痰量多，痰可呈黏稠脓性，量多，带血，灰绿色或砖红色，胶冻状；可有发绀，早期出现休克；X线胸片呈多发性蜂窝状阴影等，综合该患者临床表现支持克雷白杆菌肺炎诊断。

35.男性，60岁，心前区阵发性疼痛1个月，多在夜间发作。与活动无关。每次发作15分钟，发作时心电图II、III、aVF导联ST段抬高。首选治疗的药物是

- A.硝酸酯类
- B.β受体阻滞剂
- C.钙离子拮抗剂
- D.洋地黄类
- E.乙胺碘呋酮

答案:C

解析:该老年男性病人心前区疼痛的特点是在夜间发作，与活动无关，疼痛呈发作性，且发作时心电图相关导联ST段抬高，符合典型的变异型心绞痛，是由于冠状动脉痉挛所致。该类心绞痛的首选治疗药物是钙离子拮抗剂，可以扩张冠状动脉，解除冠状动脉痉挛，改善心肌血液供应。

36.女，36岁，患风心病10年，近来心悸、胸闷痛、气短、下肢浮肿、尿少。数分钟前突然晕倒，意识丧失，皮肤苍白，唇绀，大动脉搏动扪不到，呼吸停止，其原因是

- A.脑栓塞
- B.急性左心衰竭
- C.癫痫大发作
- D.心脏性猝死
- E.急性右心衰竭

答案:D

解析:风湿性心脏病患者，突然意识丧失，大动脉搏动扪不到，呼吸停止，其表现符合心脏性猝死的诊断标准。根据病史介绍，病人确有全心衰竭，但心脏呼吸突然停止并非急性左心衰竭或右心衰竭引起，心功能不全导致死亡表现为循环衰竭，不包括心跳、呼吸突然停止。大的肺动脉栓塞可致死，但病历未提肺栓塞证据。

37.患者，女，32岁，胃热隐痛，口舌干燥，五心烦热，渴欲含漱，嘈杂干呕，大便干燥，舌红无苔，舌裂纹少津，脉细数，可以判断患者宜用

- A.黄芪建中汤
- B.失笑散合丹参饮加减
- C.柴胡疏肝散加减
- D.一贯煎合芍药甘草汤加减



E.保和丸加减

答案:D

解析:根据患者的症状可以判断属于急性胃炎的胃阴不足证。证候:胃热隐痛,口舌干燥,五心烦热,渴欲含漱,嘈杂干呕,大便干燥,舌红无苔,舌裂纹少津,脉细数。治法:养阴益胃,和中止痛。方药:一贯煎合芍药甘草汤加减。所以本题选择D项。

38.患者,男,50岁。反复浮肿,尿血3年。症见:面色无华,少气乏力,易感冒,午后低热,口干咽燥,舌偏红少苔,脉细。检查:血压140/95mmHg(18.6/12.6kPa),尿蛋白(++),定量3g/d,尿红细胞20个/高倍视野,内生肌酐清除率48%。其诊断是

- A.慢性肾炎普通型气阴两虚证
- B.慢性肾炎高血压型气阴两虚证
- C.慢性肾炎肾病型肝肾阴虚证
- D.慢性肾炎普通型肝肾阴虚证
- E.慢性肾盂肾炎肾阴亏虚证

答案:A

解析:慢性肾炎一般分普通型和肾病型。从面色无华,少气乏力,易感冒可判断气虚;从午后低热,口干咽燥,舌偏红少苔,脉细可判断阴虚。综合分析为慢性肾炎普通型气阴两虚证。

39.患者,男性,12岁,患缺铁性贫血。症见面色萎黄少华,腹胀,善食易饥,恶心呕吐,便溏,嗜食生米、泥土、茶叶等,神疲肢软,气短头晕,舌质淡,脉象虚弱。治宜选用

- A.归脾汤加减
- B.香砂六君子汤合当归补血汤加减
- C.八珍汤合无比山药丸加减
- D.化虫丸合八珍汤加减
- E.当归芍药散加减

答案:D

解析:综观脉证,患者为缺铁性贫血的虫积证,治当杀虫消积,补益气血,应选用的方剂是化虫丸合八珍汤加减。

40.某患者,男性,43岁,患甲状腺功能亢进症,颈前肿胀,烦躁易怒,胸闷,两胁胀满,善太息,失眠,腹胀便溏,舌苔白腻,脉弦滑。治疗宜用

- A.逍遥散合二陈汤加减
- B.龙胆泻肝汤加减
- C.天王补心丹加减
- D.生脉散加减
- E.六味地黄丸加减


答案:A

解析:综观脉证,患者为甲状腺功能亢进症的气滞痰凝证,治疗方法为疏肝理气,化痰散结,方用逍遥散合二陈汤加减。

41.患者女,39岁。现患者自觉颈前肿胀并伴有疼痛,发热多汗、急躁、心悸半月。左侧甲状腺轻度肿大。心率100次/分,律齐。应首先考虑的诊断是

- A.Graves病
- B.桥本病
- C.单纯性甲状腺肿
- D.甲状腺腺瘤
- E.亚急性甲状腺炎

答案:E



解析:结合患者的性别、年龄以及患者的症状可以初步考虑为亚急性甲状腺炎。亚急性甲状腺炎临床表现:(1)临床特点多发于20~50岁的成人,男女之比为1:(3~4)。起病急骤,初起常有发热、畏寒、全身不适等症状。(2)症状特征性的甲状腺部位疼痛,常向下颌、耳部及枕骨放射,少数可无疼痛;一过性甲状腺毒症表现。(3)体征甲状腺轻度结节性肿大,质地中等,压痛明显,常位于一侧,或一侧消失后又在另一侧出现。

42.男性,58岁,糖尿病史5年,服格列本脲血糖控制在8.6~9.6mmol/L。近3天尿频、尿痛、尿急,昨天出现昏迷,查空腹血糖24.0mmol/L,血钠148mmol/L,血尿素氮7.08mmol/L,尿糖(+++),尿酮(++)。应首先考虑的诊断是

- A.糖尿病酮症酸中毒
- B.脑血管意外
- C.乳酸中毒昏迷
- D.低血糖昏迷
- E.高渗性非酮症糖尿病昏迷

答案:A

解析:糖尿病酮症酸中毒:是糖尿病的一种急性并发症。是血糖急剧升高引起的胰岛素的严重不足激发的酸中毒。患者有糖尿病史,空腹血糖较高,尿糖(+++),尿酮(++),基本可以确诊为糖尿病酮症酸中毒,故选择A。

43.患者,女,46岁。神志恍惚,梦魂颠倒,心悸易惊、善悲欲哭,肢体困乏,饮食减少,舌质淡,脉细玉力。其治法是

- A.健脾养心,益气安神
- B.健脾养心,益气活血
- C.健脾养心,化痰解郁
- D.益气养血,化痰祛瘀
- E.益气和胃,养心安神

答案:A

解析:梦魂颠倒,心悸易惊,是心气虚弱而致的心神不安的表现;肢体困乏,饮食减少是脾气不足,运化无权的表现,因此治疗上应当心脾双补兼以安神。故本题选A。

44.患者,女,28岁。跳舞时突感剧烈头痛,呕吐。查体:脑膜刺激征(+),无肢瘫。临床诊断蛛网膜下腔出血。为确诊,应首选的辅助检查是

- A.脑电图
- B.脑超声血流
- C.脑动脉造影
- D.头颅CT
- E.腰穿

答案:E

解析:临床疑诊蛛网膜下腔出血首选头颅CT检查,安全、敏感,并可早期诊断。若头颅CT不能确定应行腰穿取脑脊液,脑脊液呈均匀一致血性、压力增高,可确诊。需注意的是:本题考查内容为确诊,只有脑脊液呈均匀血性、压力增高可确诊,故选腰穿。

45.患者,女,24岁。进餐时突然倒地,意识丧失,四肢抽搐,双目上翻,牙关紧闭,口吐白沫,小便失禁。约20分钟后抽搐停止,神识清醒,自觉肢体酸痛。头颅CT、血液生化检查均正常。自幼有类似发病,其诊断是

- A.癇症性抽搐
- B.低血钙性抽搐
- C.脑寄生虫病

D.癫痫大发作

E.昏厥性抽搐

答案:D

解析:临床上癫痫大发作的突出症状有突然倒地,意识丧失,四肢抽搐,双目上翻,牙关紧闭,口吐白沫,小便失禁等,癫痫过后,自觉肢体酸痛。有时头颅CT、血液生化检查均正常。故本题选D。

46.患者,女,58岁。脑动脉硬化6年。突然发生口眼喎斜,半身不遂,半小时后,自行恢复。平日头晕头痛,耳鸣,腰膝酸软,舌红,苔薄黄,脉弦细。应首先考虑的方剂是

A.镇肝熄风汤

B.参附汤合生脉散

C.涤痰汤

D.补阳还五汤

E.血府逐瘀汤

答案:A

解析:患者有脑动脉硬化病史,突然发生口眼喎斜,半身不遂,兼有头晕头痛,耳鸣,腰膝酸软,舌红,苔薄黄,脉弦细,属于短暂性脑缺血发作之肝肾阴虚,风阳上扰证。治疗应选择镇肝息风,滋阴潜阳的镇肝熄风汤。

47.患者,男,65岁。头晕、步行不稳、饮水呛咳1周。既往有高血压病史。头颅MRI示延髓背外侧梗死。闭塞的血管是

A.大脑中动脉

B.大脑前动脉

C.小脑后下动脉

D.小脑上动脉

E.大脑后动脉

答案:C

解析:小脑后下动脉、小脑前下动脉及小脑上动脉供应脑干的背外侧和小脑,其中小脑后下动脉闭塞常引起延髓外侧梗死。

48.患者,女,23岁。被人发现时呈昏迷状态,查体:神志不清,两侧瞳孔呈针尖样大小。呼吸有大蒜臭味,应首先考虑的是

A.急性安眠药物中毒

B.急性毒蕈中毒

C.急性有机磷农药中毒

D.亚硝酸盐中毒

E.一氧化碳中毒

答案:C

解析:临床上有机磷农药中毒可表现为瞳孔缩小,胸闷、气短、呼吸困难,恶心、呕吐、腹痛、腹泻;括约肌松弛表现为大小便失禁;腺体分泌增加表现为大汗、流泪和流涎;肌纤维颤动,甚至全身肌肉强直性痉挛;谵妄、抽搐和昏迷、神志不清等。所以患者瞳孔呈针尖样大小,呼吸有大蒜臭味,应首先考虑的是急性有机磷农药中毒。故本题选C。

49.患者,男,30岁。高温职业工人。神情淡漠,身热汗出,口干喜饮,四肢厥冷,唇甲发绀,体疲乏力,小便短赤,大便秘结,舌红,苔黄少津,脉细数。查体:血压75/50mmHg。治疗应首选

A.参附注射液加枳实注射液

B.丹参注射液加参附注射液

- C.醒脑静注射液加丹参注射液
- D.生脉注射液加清开灵注射液
- E.枳实注射液加丹参注射液

答案:D

解析:根据症状,患者是阳气衰竭,虚阳外越,治疗应首选益气生脉,回阳固脱的生脉注射液加清开灵注射液进行治疗。故本题选D。

50.患者,女,28岁。心烦不寐,胸闷脘痞,泛恶暖气,伴口苦,头重,目眩,舌偏红,苔黄腻,脉滑数,选用的治法是

- A.疏肝泻火,镇心安神
- B.清化痰热,和中安神
- C.补益心脾,养血安神
- D.滋阴降火,交通心肾
- E.益气镇惊,安神定志

答案:B

解析:该患者为不寐之痰热扰心证。证候:心烦不寐,胸闷脘痞,泛恶暖气,伴口苦,头重,目眩,舌偏红,苔黄腻,脉滑数。治法:清化痰热,和中安神。方药:黄连温胆汤加减。

51.患者,男,60岁。黎明之前泄泻,腹痛肠鸣即泻,泻后则安,形寒怕冷,舌淡苔白,脉沉。其病机是

- A.食滞肠胃
- B.肾阳虚衰
- C.寒湿困脾
- D.湿热伤脾
- E.肝气乘脾

答案:B

解析:泄泻日久,肾阳虚衰,不能温养脾胃,运化失常,黎明之前阳气未振,阴寒较盛,故腹部作痛,肠鸣即泄。泄后则腑气通利,故泄后则安。形寒肢冷,腰膝酸软,舌淡苔白,脉沉细,为脾肾阳气不足之证。

52.患者,男,52岁。近来胁肋隐痛,悠悠不休,遇劳加重,口干咽燥,心中烦热,头晕目眩,舌红少苔,脉细弦而数。治法宜选用

- A.疏肝理气
- B.祛瘀通络
- C.清热利湿
- D.养阴柔肝
- E.健脾利湿

答案:D

解析:胁痛之肝络失养证。证候:胁肋隐痛,悠悠不休,遇劳加重,口干咽燥,心中烦热,头晕目眩,舌红少苔,脉细弦而数。治法:养阴柔肝。方药:一贯煎加减。

53.夏某,男,38岁。症见腹中积块,胀满疼痛,按之软而不坚,固定不移,舌苔薄白,脉弦。治宜选用

- A.六磨汤
- B.逍遥散
- C.膈下逐瘀汤
- D.少腹逐瘀汤
- E.大七气汤加减

答案:E

解析:积证之气滞血阻证。证候:腹部积块质软不坚,固定不移,胀痛不适,舌苔薄,脉弦。治法:理气消积,活血散瘀。方药:大七气汤加减。

54.左某,男,42岁。患慢性肝炎十余年。近一周来出现腹胀大,按之不坚,肋下胀满疼痛,纳食减少,食后作胀,暖气不爽,小便短少,苔白腻,脉弦。治宜选用

- A.柴胡疏肝散
- B.五苓散
- C.实脾饮
- D.调营饮
- E.中满分消丸

答案:A

解析:鼓胀-气滞湿阻证。证候:腹胀按之不坚,肋下胀满或疼痛,饮食减少,食后胀甚,得暖气、矢气稍减,小便短少,舌苔薄白腻,脉弦。治法:疏肝理气,运脾利湿。方药:柴胡疏肝散合胃苓汤加减。

55.患者,男,31岁。全身水肿,按之没指,身体困重,胸闷纳呆。舌苔厚腻,脉沉缓。实验室检查:尿常规示蛋白质(++)。诊断为“肾炎”。其证型是

- A.风水泛滥证
- B.水湿浸渍证
- C.湿热壅盛证
- D.湿毒浸淫证
- E.脾肾亏虚证

答案:B

解析:风水泛滥证水肿来势迅速,多伴有外感表现,不符合。湿热壅盛证除水肿外,兼有发热,热势不高,舌苔黄厚腻,脉濡数,不符合。湿毒浸淫型除水肿外,伴有身发疮痍,甚至溃烂,不符合。脾肾亏虚证除水肿外,伴有神疲乏力,腰膝酸软等症,不符合。从身体困重,胸闷纳呆,舌苔厚腻,脉沉缓可判断水湿内停,尚未化热,故选B。

56.精神抑郁,情绪不宁,胸胁胀满疼痛,脘腹胀满,咽中如物梗塞,苔腻。多属

- A.肝气郁结证
- B.气郁化火证
- C.痰气郁结证
- D.心神失养证
- E.心脾两虚证

答案:C

解析:痰气郁结证。证候:精神抑郁,胸部闷塞,胁肋胀满,咽中如有物梗塞,吞之不下,咯之不出,苔白腻,脉弦滑。治法:行气开郁,化痰散结。方药:半夏厚朴汤加减。

57.患者吐血色红或紫暗,脘腹胀闷,嘈杂不适,口臭,便秘,舌质红,苔黄腻,脉滑数,治疗应首选

- A.白虎汤合四生丸
- B.失笑散合四生丸
- C.泻心汤合十灰散
- D.玉女煎合十灰散
- E.丹参饮合十灰散

答案:C

解析:胃热壅盛证。证候:脘腹胀闷,嘈杂不适,甚则作痛,吐血色红或紫暗,常夹有食物残渣,口臭,便秘,大便色黑,舌质红,苔黄腻,脉滑数。治法:清胃泻火,化瘀止血。方药:泻心汤合十灰散加减。

58.胸胁疼痛,如灼如刺,胸闷不舒,呼吸不畅,甚则迁延,经久不已,阴雨更甚,可见病侧胸廓变形,舌苔薄,质暗,脉弦,所属的证型为

- A.痰饮之脾阳虚弱证
- B.痰饮之饮留胃肠证
- C.悬饮之邪犯胸肺证
- D.悬饮之络气不和证
- E.悬饮之阴虚内热证

答案:D

解析:悬饮之络气不和证。证候:胸胁疼痛,如灼如刺,胸闷不舒,呼吸不畅,或有闷咳,甚则迁延,经久不已,阴雨更甚,可见病侧胸廓变形,舌苔薄,质暗,脉弦。治法:理气和络。方药:香附旋覆花汤加减。

59.患者,男,38岁。腰酸,遗精,两足软弱,眩晕,耳鸣,口干,咽痛,颧红,舌红少津,脉沉细。其中医证型是

- A.肝阴虚证
- B.肾阳虚证
- C.心阴虚证
- D.心脾两虚证
- E.肾阴虚证

答案:E

解析:肾阴虚证。证候:腰酸,遗精,两足软弱,眩晕,耳鸣,甚则耳聋,口干,咽痛,颧红,舌红少津,脉沉细。治法:滋补肾阴。方药:左归丸加减。

60.患者汗出恶风,遇劳则发,易于感冒,体倦乏力,面色少华,舌苔薄白,脉细弱。治疗应首选

- A.桂枝汤
- B.四妙丸
- C.玉屏风散
- D.当归六黄汤
- E.龙胆泻肝汤

答案:C


解析:汗出恶风,易于感冒-表虚失固,体倦乏力,面色少华,舌苔薄白,脉弱-气虚,治以益气固表为法,方用玉屏风散。

61.张某,男,59岁,下肢痿软无力一年余,加重两个月。现发热,胸痞脘闷,小便短赤涩痛,苔黄腻,脉细数。选用方药是

- A.清瘟败毒饮
- B.清燥救肺汤
- C.加味二妙散
- D.参苓白术散
- E.大补阴煎

答案:C

解析:患者为痿证之湿热浸淫,气血不运证,治宜清热利湿,通利筋脉,选用加味二妙散加减。



62.患者，男，23岁。恶寒，发热，鼻塞声重，流清涕，咳嗽，口不渴，舌苔薄白，脉浮紧。其治法是

- A.清暑解表
- B.益气解表
- C.滋阴解表
- D.辛温解表
- E.辛凉解表

答案:D

解析:以上皆为典型的风寒感冒证候，治以辛温解表为法。

63.患者，男，50岁。反复咳嗽、咳痰10年，喉间痰鸣气促3年，伴咳黄稠痰，呼吸气粗，烦躁不安，面赤口苦。舌质红，苔黄腻，脉滑数。查体：双肺散在湿啰音，双肺满布哮鸣音。

应首先考虑的诊断是

- A.慢性支气管炎喘息型热哮
- B.慢性支气管炎喘息型寒哮
- C.慢性支气管炎单纯型痰热郁肺证
- D.慢性支气管炎喘息型风热犯肺证
- E.慢性支气管炎喘息型肝火犯肺证

答案:A

解析:从反复咳嗽、咳痰10年可判断为慢性支气管炎；从呼吸气粗，烦躁不安，双肺满布哮鸣音可判断为喘息型；从咳黄稠痰，苔黄腻，脉滑数可判断为热哮。故选A。

64.患者，女性，65岁，身体较胖，胸闷胸痛，气短痰多，肢体沉重，纳呆恶心，舌苔浊腻，脉滑。治疗方法应选

- A.活血化瘀，通脉止痛
- B.通阳泄浊，豁痰开痹
- C.辛温通阳，开痹散寒
- D.益气活血，通脉止痛
- E.益气养阴，活血通络

答案:B

解析:综观脉证，患者为痰浊内阻型心绞痛，治疗方法应为通阳泄浊，豁痰开痹。

65.患者，女，62岁。既往有糖尿病和冠心病。平时劳累后有胸痛发作，近日安静时亦有胸痛发作，胸痛较剧，痛有定处，入夜加重，舌质紫暗，有瘀斑，脉涩。心电图II、III、aVF导联T波倒置，心肌酶谱正常。应首先考虑的方剂是

- A.补阳还五汤
- B.瓜蒌薤白桂枝汤合涤痰汤
- C.枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- D.血府逐瘀汤
- E.参附汤合右归丸

答案:D

解析:患者胸痛较剧，痛有定处，入夜加重，舌质紫暗，有瘀斑，脉涩，属于胸阳痹阻血行瘀滞，应首先考虑用血府逐瘀汤进行治疗。A 主治中风之气虚血虚证；B 可涤痰开窍，温阳通脉；C 主治胸阳不振痰气互结之胸痹；E 主治阳气暴脱，脉微欲绝证。故本题选D。

66.患者，男，45岁，胃脘痞闷，胃部胀痛，痛窜胁背，气怒痛重，嗳气呕吐，嘈杂吐酸，舌苔薄白，脉弦。患者宜用

- A.黄芪建中汤

- B.失笑散合丹参饮加减
- C.柴胡疏肝散加减
- D.一贯煎合芍药甘草汤加减
- E.保和丸加减

答案:C

解析:根据患者的症状可以判断属于急性胃炎的肝气犯胃证。证候:胃脘痞闷,胃部胀痛,痛窜肋背,气怒痛重,暖气呕吐,嘈杂吐酸,舌苔薄白,脉弦。治法:疏肝和胃,理气止痛。方药:柴胡疏肝散加减。所以本题选择C项。

67.患者,男,35岁。昨晚因暴食而胁腹剧痛,胸胁胀满,矢气后可缓,舌苔薄黄,脉弦小数。实验室检查:血清淀粉酶600索氏单位。应首先考虑的是

- A.胃穿孔
- B.胆石症
- C.急性胰腺炎
- D.肠梗阻
- E.急性胆囊炎

答案:C

解析:血清淀粉酶超过正常值5倍即可确诊为急性胰腺炎,故本题选C。

68.患者,女,50岁。胃脘胀痛,痛窜两肋,每因情志不舒而加重,暖气嘈杂,舌淡,脉弦缓。经胃镜检查诊断慢性浅表性胃炎。治疗应首先考虑的方剂是

- A.四君子汤加减
- B.益胃汤加减
- C.失笑散合丹参饮加减
- D.柴胡舒肝散加减
- E.三仁汤加减

答案:D

解析:患者胃脘胀痛,痛窜两肋,因情志不舒而加重,暖气嘈杂,舌淡,脉弦缓,属于肝气郁滞证。治疗应疏肝行气,活血止痛,首先考虑的方剂是柴胡舒肝散加减。四君子汤主治脾胃气虚;益胃汤主治胃阴损伤;失笑散合丹参饮主治气血瘀滞之心胃诸痛;三仁汤主治湿温初起,湿重于热者。故本题选D。

69.患者男性,28岁。经常出现规律性上腹痛3年,空腹发作,夜间更重,进食可缓解,服抗酸药可止痛。最可能的诊断为

- A.胃溃疡
- B.十二指肠球部溃疡
- C.复合性溃疡
- D.十二指肠壅积症
- E.胃黏膜脱垂症

答案:B

解析:DU空腹痛和(或)午夜痛,腹痛多于进食或服用抗酸药后缓解,DU多发生于十二指肠球部。

70.男性,30岁,上腹突发刀割样疼痛,很快波及全腹,体温39℃,腹部呈板状,有明显压痛、反跳痛和肌紧张,肝浊音界消失,肠鸣音消失。最可能诊断是

- A.急性化脓性胆囊炎
- B.胃十二指肠溃疡穿孔
- C.急性阑尾炎穿孔



- D.急性出血性胰腺炎
- E.急性梗阻性化脓性胆管炎

答案:B

解析:患者突发上腹剧痛、迅速发生全腹急性腹膜炎、肝浊音界消失,最可能的诊断应是胃十二指肠溃疡穿孔。

71.患者,男,50岁。反复浮肿,尿血3年,经常感冒。症见面色无华,少气乏力,午后低热,口干咽燥,舌红少苔,脉细。检查:血压140/95mmHg,尿蛋白(++),24小时尿蛋白定量3g,内生肌酐清除率48%,血尿素氮10mmol/L。除对症治疗外,还应加用

- A.参芪地黄汤
- B.六味地黄汤
- C.右归丸
- D.左归饮
- E.大补元煎

答案:A

解析:蛋白尿、血尿、高血压、水肿为慢性肾小球肾炎的基本临床表现。早期患者可有乏力、疲倦;水肿可有可无;实验室检查见尿蛋白1~3g/d;血压可正常或轻度升高;内生肌酐清除率下降或轻度氮质血症。由症状可见属于气阴亏虚,故用参芪地黄汤益气养阴。B补阴,C补肾阳,D滋阴补肾,E益气补血,滋补肝肾,均不符合证治。故本题选A。

72.患者,男,54岁。萎缩性胃炎多年,伴巨幼红细胞性贫血(恶性贫血)。其贫血发生机制是因为缺乏

- A.铁
- B.蛋白质
- C.叶酸
- D.维生素B<sub>12</sub>
- E.内因子

答案:E

解析:叶酸和维生素B<sub>12</sub>都是DNA合成过程中的重要辅酶。萎缩性胃炎可使内因子缺乏,对食物中的维生素B<sub>12</sub>及胆汁中的维生素B<sub>12</sub>的重吸收均有障碍,从而出现巨幼红细胞性贫血。

73.患者,男,40岁。患再生障碍性贫血,面色苍白,唇甲色淡,头晕,心悸,乏力,动则加剧,舌淡,脉细弱。治疗应首先考虑的方剂是

- A.右归丸合当归补血汤
- B.左归丸、右归丸合当归补血汤
- C.八珍汤
- D.六味地黄丸合桃红四物汤
- E.左归丸合当归补血汤

答案:C

解析:根据症状辨为气血亏虚证,治法为大补气血,应首先考虑的方剂是具有气血双补作用的八珍汤。A用于肾阴虚证;B用于肾阴阳两虚证;D用于肾虚血瘀证;E用于肾阳亏虚证。故本题选C。

74.某患者,48岁,女性,患白细胞减少症,临床表现为腰膝酸软,头晕耳鸣,五心烦热,失眠多梦,低热,口干咽燥,舌红少苔,脉细数。治疗宜用

- A.归脾汤加减
- B.黄芪建中汤合右归丸加减
- C.生脉散加减

D.六味地黄丸加减

E.犀角地黄汤合玉女煎加减

答案:D

解析:综观脉证,患者为白细胞减少症之肝肾阴虚证,治疗方法为滋补肝肾,方用六味地黄丸加减。

75.患者,女,32岁。有甲状腺功能亢进症病史。颈前肿胀,烦躁易怒,易饥多食,恶热多汗,心悸头晕,大便秘结,失眠,舌红,苔黄,脉弦数。其中医治法是

A.疏肝理气,化痰散结

B.清肝泻火,消瘿散结

C.滋阴降火,消瘿散结

D.益气养阴,消瘿散结

E.清肝泻火,益气养阴

答案:B

解析:患者颈前肿胀,烦躁易怒,易饥多食,恶热多汗,心悸头晕,大便秘结,失眠,舌红,苔黄,脉弦数。证属痰气交阻,气郁化火,壅结颈前,治疗应清肝泻火,消瘿散结。A用于气滞痰凝证,C用于阴虚火旺证,D用于气阴两虚证。故本题选B。

#### A3/A4 型题

共用题干:患者,男性,58岁,糖尿病史5年,服格列本脲血糖控制在8.6~9.6mmol/L之间。近3天尿频、尿痛、尿急,昨天出现昏迷,查空腹血糖24.0mmol/L,血钠148mmol/L,血尿素7.08mmol/L,尿糖+++ ,尿酮++。

76.应诊断为

A.糖尿病酮症酸中毒

B.脑血管意外

C.乳酸中毒昏迷

D.低血糖昏迷

E.高渗高血糖综合征

答案:A

解析:结合患者症状以及实验室检查尿糖尿酮可以诊断为糖尿病酮症酸中毒。

77.糖尿病基本病理生理改变是

A.胰升血糖素分泌减少

B.胰升血糖素分泌增多

C.胰岛素分泌绝对或相对不足

D.肾上腺皮质激素分泌过多

E.生长激素分泌过多

答案:C

解析:糖尿病的基本病理生理改变是胰岛素分泌绝对或相对不足。

78.近期病情监测的指标是

A.空腹血糖

B.尿糖

C.糖化血红蛋白

D.葡萄糖耐量试验

E.胰岛素释放试验

答案:C

解析:糖化血红蛋白为糖尿病患者近期病情监测的指标。

共用题干:患者,男,21岁,胸闷、咳嗽,咳痰,伴腹胀,食少纳呆,少气懒言,面色萎黄,舌淡苔白,脉缓弱。检查:支气管舒张试验阳性,FEV<sub>1</sub>增加 $\geq 12\%$ ,且FEV<sub>1</sub>增加绝对值 $\geq 200\text{mL}$ 。

79.考虑该患者为

- A.慢性支气管炎
- B.呼吸衰竭
- C.支气管哮喘
- D.慢性阻塞性肺疾病
- E.原发性支气管肺癌

答案:C

解析:该患者的支气管哮喘的症状不明显,但是可以根据支气管舒张试验阳性,FEV<sub>1</sub>增加 $\geq 12\%$ ,且FEV<sub>1</sub>增加绝对值 $\geq 200\text{mL}$ 诊断该患者为支气管哮喘。

80.发病的夙根是

- A.宿痰伏肺
- B.先天不足
- C.饮食不当
- D.气候变化
- E.外邪侵袭

答案:A

解析:病理因素以痰为主。痰主要由于肺不布津,脾失转输,肝不散精,肾失蒸腾气化,以致津液凝聚成痰,伏藏于肺,成为发病的“夙根”,遇各种诱因而引发。

81.治疗宜首选

- A.射干麻黄汤
- B.定喘汤
- C.六君子汤
- D.玉屏风散
- E.金匱肾气丸

答案:C

解析:结合患者的症状可辨证为脾虚证。证候:腹胀,食少纳呆,便溏,少气懒言,面色萎黄,舌淡苔白,脉缓弱。治法:健脾化痰。方药:六君子汤加减。

共用题干:患者,男,45岁,突发严重的呼吸困难,端坐呼吸,烦躁不安,频繁咳嗽,咳大量粉红色泡沫样血痰。检查:心脏听诊心尖区第一心音减弱,心尖部可闻及舒张早期奔马律,肺部听诊两肺满布湿性啰音和哮鸣音。

82.首先考虑的诊断为

- A.呼吸衰竭
- B.急性心肌梗死
- C.慢性心衰加重
- D.心源性休克
- E.急性肺水肿

答案:E

解析:结合患者的症状(严重的呼吸困难,端坐呼吸,咳大量粉红色泡沫样血痰)及检查(心尖区第一心音减弱,心尖部可闻及舒张早期奔马律)可初步诊断为急性肺水肿。

83.西医治疗原则不包括



- A.增加左心室心搏量
- B.增加左心室充盈压
- C.减少循环血量
- D.减少肺泡内液体渗入
- E.保证气体交换

答案:B

解析:急性心力衰竭的治疗原则包括降低左心房和(或)左心室充盈压;增加左心室心搏量;减少循环血量;减少肺泡内液体渗入;保证气体交换。

84.若有液体潴留,首选

- A.襻利尿剂
- B.血管扩张药物
- C.血管收缩药
- D.洋地黄类药物
- E.抗凝治疗

答案:A

解析:利尿剂适用于有液体潴留证据的急性心衰患者。首选襻利尿剂(呋塞米、托拉塞米、布美他尼)。

共用题干:患者,男性,35岁。近来出现心动过速,心烦少寐,头晕目眩,手足心热,盗汗,耳鸣,舌红,少苔,脉细数。查体:心率为160次/分,律规则,按压颈动脉窦后,心率突然减慢至90次/分,但运动后又增快至160次/分。

85.首先考虑为

- A.阵发性室上性心动过速
- B.阵发性室性心动过速
- C.窦性心动过速
- D.阵发性房性心动过速伴2:1房室传导
- E.心房扑动,2:1
- F.房室传导

答案:A

解析:阵发性室上性心动过速:颈动脉按摩能使心率突然减慢。结合阵发性室上性心动过速心率160次/分以上,本题考虑为阵发性室上性心动过速。

86.治疗宜选用

- A.安神定志丸
- B.生脉散
- C.天王补心丹
- D.归脾汤
- E.黄连阿胶汤

答案:C

解析:结合患者的症状辨证为阴虚火旺证。证候:心悸不宁,心烦少寐,头晕目眩,手足心热,盗汗,耳鸣,舌质红,少苔,脉细数。治法:滋阴清火,养心安神。方药:天王补心丹加减。

87.若患者合并低血压,可选用

- A.西地兰
- B.普罗帕酮
- C.维拉帕米

D.去甲肾上腺素

E.β受体阻滞剂

答案:D

解析:阵发性室上性心动过速:终止发作的药物有维拉帕米、普罗帕酮、腺苷、β受体阻滞剂(普萘洛尔)、洋地黄制剂(西地兰),合并低血压者可用去甲肾上腺素、甲氧明、间羟胺等,但老年患者、高血压、AMI等禁用。

共用题干:某女,35岁,两手指间和掌指关节强直不舒2年,近2周病情加重,关节疼痛,肿大变形,活动受限,伴发热,口苦,饮食无味,纳呆,全身困乏无力,舌苔黄腻,脉滑数。查血沉45mm/h,类风湿因子(++).

88.诊断为

A.痛风

B.风湿性关节炎

C.类风湿关节炎

D.系统性红斑狼疮

E.骨性关节炎

答案:C

解析:结合患者的关节症状以及实验室检查血沉升高,类风湿因子阳性,考虑该患者为类风湿关节炎。

89.治法是

A.清热利湿,祛风通络

B.养阴清热,祛风通络

C.祛风散寒,清热化湿

D.益肝肾,补气血,祛风湿,通经络

E.活血化瘀,祛痰通络

答案:A

解析:结合患者的症状辨证为类风湿关节炎活动期之湿热痹阻证。证候:发热,口苦,饮食无味,纳呆或有恶心,泛泛欲吐,关节肿痛以下肢为重,全身困乏无力,下肢沉重酸胀,浮肿或有关节积液,舌苔黄腻,脉滑数。治法:清热利湿,祛风通络。方药:四妙丸加减。

90.该病的基本病理改变是

A.皮肤炎

B.滑膜炎

C.心包炎

D.血管炎

E.心脏炎

答案:B

解析:类风湿关节炎的基本病理改变为滑膜炎。

共用题干:患者男性,56岁。胃溃疡病10年。现胃痛隐隐,喜温喜按,畏寒肢冷,泛吐清水,腹胀便溏,舌淡胖,边有齿痕,苔白,脉迟缓。

91.治疗方剂是

A.黄芪建中汤

B.活络效灵丹合丹参饮

C.化肝煎合左金丸

D.一贯煎合芍药甘草汤

E.柴胡疏肝散合五磨饮子

答案:A

解析:结合患者的症状可辨证为消化性溃疡之脾胃虚寒证。证候:胃痛隐隐,喜温喜按;畏寒肢冷,泛吐清水,腹胀便溏,舌淡胖边有齿痕,苔白,脉迟缓。治法:温中散寒,健脾和胃。方药:黄芪建中汤加减。

92.X线钡餐检查中直接征象是

- A.龛影
- B.胃黏膜僵直
- C.钡剂潴留
- D.痉挛性切迹
- E.上腹疼痛

答案:A

解析:X线发现龛影是消化性溃疡的直接征象,有确诊价值。

93.西医治疗的三联疗法是

- A.质子泵抑制剂+羟氨苄青霉素+铋剂
- B.铋剂+克拉霉素+甲硝唑
- C.质子泵抑制剂+铋剂+克拉霉素+甲硝唑
- D.质子泵抑制剂+铋剂+克拉霉素
- E.铋剂+克拉霉素+甲硝唑+羟氨苄青霉素

答案:B

解析:根除幽门螺杆菌的常用三联疗法,三联疗法为PPI(奥美拉唑、兰索拉唑)或胶体铋剂(枸橼酸铋钾),再加上任两种抗生素(克拉霉素、阿莫西林、甲硝唑)。

共用题干:一男性患者,55岁,进行性厌食和上腹部胀痛,面色苍白,日益消瘦,下肢水肿,肝功能正常,大便隐血试验持续阳性,尿常规未发现异常。

94.其可能诊断为

- A.慢性胃炎
- B.胃癌
- C.慢性肝炎
- D.胃溃疡
- E.砒瘫

答案:B

解析:胃癌是指发生于胃黏膜上皮的恶性肿瘤。早期无特异性症状,进展期胃癌最早出现的症状是上腹痛,可伴有早饱、胃纳差和体重减轻。

95.胃癌最常见的转移途径是

- A.直接蔓延
- B.腹腔内种植
- C.血行转移
- D.胃肠道播散
- E.淋巴转移

答案:E

解析:淋巴结转移:占胃癌转移的70%,是最常见的转移途径,胃下部癌肿常转移至幽门下、胃下及腹腔动脉旁等淋巴结,而上部癌肿常转移至胰旁、贲门旁、胃上等淋巴结。晚期癌可能转移至主动脉周围及膈上淋巴结。由于腹腔淋巴结与胸导管直接交通,故可转移至左锁骨上淋巴结。

96.属于并发症的是



- A.出血
- B.黄疸
- C.腹水
- D.皮肤炎
- E.上腹压痛

答案:A

解析:胃癌的并发症:出血,梗阻,穿孔。

共用题干:患者,男,40岁,诊断为肝硬化。症见:腹大胀满,按之如囊裹水,颜面微浮,下肢浮肿,怯寒懒动,精神困倦,脘腹痞胀,得热则舒,食少便溏,小便短少,舌苔白滑,脉缓。

97.治疗应选

- A.柴胡疏肝散合胃苓汤加减
- B.实脾饮加减
- C.中满分消丸合茵陈蒿汤加减
- D.调营饮加减
- E.附子理中汤合五苓散加减

答案:B

解析:寒湿困脾证证候:腹大胀满,按之如囊裹水,甚则颜面微浮,下肢浮肿,怯寒懒动,精神困倦,脘腹痞胀,得热则舒,食少便溏,小便短少,舌苔白滑或白腻,脉缓或沉迟。治法:温中散寒,行气利水。方药:实脾饮加减。

98.中医病因不包括

- A.酒食不节
- B.情志失调
- C.感染血吸虫
- D.黄疸、积聚日久
- E.感受外邪

答案:E

解析:中医学认为,本病的形成多由酒食不节、情志失调、感染血吸虫、黄疸积聚等病迁延日久,引起肝、脾、肾亏损,气滞、血瘀、湿阻腹中所致。

99.最严重的并发症是

- A.上消化道出血
- B.原发性肝癌
- C.感染
- D.肝肾综合征
- E.肝性脑病

答案:E

解析:肝性脑病是肝硬化最严重的并发症,亦是最常见的死亡原因。主要临床表现为性格行为失常、意识障碍、昏迷。

共用题干:患者,男,32岁,西医诊断为溃疡性结肠炎。症见:大便时溏时泻,迁延反复,粪便可见黏液,神疲懒言,肢体倦怠,食少腹胀,舌质淡胖,苔薄白,脉细弱。

100.治疗首选

- A.四君子汤
- B.白头翁汤
- C.痛泻要方

D.参苓白术散

E.补阳还五汤

答案:D

解析:结合患者的症状可辨证为溃疡性结肠炎之脾胃虚弱证。证候:大便时溏时泻,迁延反复,粪便带有黏液或脓血,食少,腹胀,肢体倦怠,神疲懒言,舌质淡胖或边有齿痕,苔薄白,脉细弱或濡缓。治法:健脾渗湿。方药:参苓白术散加减。

101.实验室检查中最有价值的检查手段是

A.血液检查

B.粪便检查

C.纤维结肠镜检查

D.钡剂灌肠检查

E.黏膜组织学检查

答案:C

解析:纤维结肠镜检查是溃疡性结肠炎最有价值的诊断方法。钡剂灌肠检查为溃疡性结肠炎重要的诊断方法。

102.腹痛特点是

A.疼痛-饮食-便后缓解

B.饮食-疼痛-便后缓解

C.疼痛-休息-便后缓解

D.疼痛-便意-便后缓解

E.疼痛-缓解-便后便意

答案:D

解析:溃疡性结肠炎有“疼痛-便意-便后缓解”的规律。

共用题干:患者,男,26岁,4小时前吐血,血色鲜红,混有食物残渣,大便黑如漆,口干喜冷饮,胃脘胀闷灼痛,舌红苔黄,脉滑数。

103.中医辨证为

A.湿热内蕴证

B.胃中积热证

C.肝火犯胃证

D.脾不统血证

E.气随血脱证

答案:B

解析:结合患者的症状可辨证为上消化道出血之胃中积热证。证候:吐血紫暗或咖啡色,甚则鲜红,常混有食物残渣,大便黑如漆,口干喜冷饮,胃脘胀闷灼痛,舌红苔黄,脉滑数。

104.治疗首选的方剂为

A.独参汤

B.归脾汤

C.龙胆泻肝汤

D.泻心汤合十灰散

E.四味回阳饮

答案:D

解析:上消化道出血之胃中积热证的治法为清胃泻火,化瘀止血。方药:泻心汤合十灰散。

105.若患者出现乏力、心慌,出血量为

A.>5mL



- B.50~100mL
- C.250~300mL
- D.>400~500mL
- E.>1000mL

答案:D

解析:成人每日消化道出血>5mL即可出现粪便隐血试验阳性,每日出血量50~100mL可出现黑便,胃内蓄积血量在250~300mL可引起呕血。一次出血量<400mL时,一般不出现全身症状;出血量超过400~500mL,可出现乏力、心慌等全身症状;短时间内出血量超过1000mL,可出现周围循环衰竭表现。

共用题干:患者,男性,34岁。因身体不适就诊,全身浮肿,面色苍白,畏寒肢冷,腰脊冷痛,神疲,纳少,便溏,舌嫩淡胖,有齿痕,脉沉。尿常规检查见蛋白尿,血压160/90mmHg。

106.中医辨证为

- A.肺肾气虚证
- B.脾肾阳虚证
- C.脾肾气虚证
- D.肝肾阴虚证
- E.气阴两虚证

答案:B

解析:结合患者的症状可诊断为慢性肾小球肾炎之脾肾阳虚证。证候:全身浮肿,面色苍白,畏寒肢冷,腰脊冷痛,神疲,纳少,便溏,遗精,阳痿,早泄,或月经失调,舌质嫩淡胖,边有齿痕,脉沉细或沉迟无力。

107.治疗首选方剂是

- A.异功散加味
- B.玉屏风散合金匱肾气丸
- C.附子理中丸或济生肾气丸加减
- D.杞菊地黄丸加减
- E.五苓散合五皮饮加减

答案:C

解析:慢性肾小球肾炎之脾肾阳虚证治法:温补脾肾。方药:附子理中丸或济生肾气丸加减。

108.若患者蛋白尿>1g/d,血压应控制在

- A.115mmHg 以下
- B.120mmHg 以下
- C.125mmHg 以下
- D.130mmHg 以下
- E.130/80mmHg 以下

答案:C

解析:积极控制高血压和减少尿蛋白:力争把血压控制在理想水平,即蛋白尿 $\geq 1\text{g/d}$ ,血压应控制在125mmHg以下;蛋白质 $< 1\text{g/d}$ ,血压控制可放宽到130/80mmHg以下。

共用题干:王某,男,6岁。1月前出现眼睑浮肿,继则出现四肢水肿,按之凹陷,伴发热,咽痛,小便不利。舌苔薄白,脉浮。尿常规检查为蛋白尿,24小时定量为4.5g,血浆总蛋白为25g/L,B超提示腹水。

109.最可能诊断为

- A.急性肾炎
- B.慢性肾炎

- C.肾病综合征
- D.肝硬化腹水
- E.肾衰竭

答案:C

解析:肾病综合征临床特征为:①大量蛋白尿( $\geq 3.5g/24h$ );②低白蛋白血症( $\leq 30g/L$ );③水肿;④高脂血症。

110.治疗首选的方剂是

- A.越婢加术汤
- B.疏凿饮子
- C.实脾饮
- D.麻黄连翘赤小豆汤
- E.五皮饮合胃苓汤

答案:A

解析:结合患者的症状可辨证为风水相搏证。证候:起始眼睑浮肿,继则四肢、全身亦肿,皮肤光泽,按之凹陷易回复,伴发热、咽痛、咳嗽、小便不利等症,舌苔薄白,脉浮。治法:疏风解表,宣肺利水。方药:越婢加术汤加减。

111.若患者出现激素抵抗,宜选用

- A.呋塞米
- B.泼尼松
- C.环磷酰胺
- D.麦考酚吗乙酯
- E.双嘧达莫

答案:C

解析:肾病综合征细胞毒药物的治疗:这类药物可用于“激素依赖型”或“激素抵抗型”的患者,协同激素治疗。若无激素禁忌,一般不作为首选或单独治疗用药。环磷酰胺是国内外最常用的细胞毒药物。

共用题干:6岁女童,喜食泥块,面色萎黄,神疲乏力,口唇色淡,食少便溏,舌淡,苔薄腻,脉细弱。血红蛋白 $92g/L$ 。

112.初步诊断为

- A.巨幼红细胞性贫血
- B.再生障碍性贫血
- C.缺铁性贫血
- D.溶血性贫血
- E.肾性贫血

答案:C

解析:结合患者异食癖,面色萎黄、乏力及实验室检查可以考虑患者为缺铁性贫血。

113.治宜选用

- A.香砂六君子汤合当归补血汤
- B.归脾汤
- C.八珍汤合无比山药丸
- D.化虫丸合八珍汤
- E.桃红四物汤

答案:A

解析:结合患儿的症状可辨证为脾胃虚弱证。证候:面色萎黄,食欲不振,恶心呕吐,胃脘

部不适，脘腹胀满，食后腹胀，大便稀溏。舌质淡，舌苔薄腻，脉象细弱。治法：健脾和胃，益气养血。方药：香砂六君子汤合当归补血汤加减。

114.若 Hb 降至 60g/L 以下，宜选用

- A.注射铁剂
- B.输血或输入红细胞
- C.口服铁剂
- D.驱虫剂
- E.氨基酸

答案:B

解析:输血或输入红细胞：仅适用于严重病例，血红蛋白在 60g/L 以下，症状明显者。

共用题干:患者，男，32 岁，因腹胀就诊，症见：面色萎黄，头晕眼花，心悸，心慌，疲乏无力，气短懒言，自汗，食欲减退，舌质淡，苔薄白，脉细弱。查体脾脏增大至脐下，质地坚实，表面光滑，切迹明显，无压痛，血象检查白细胞为  $80 \times 10^9/L$ ，杆状核粒细胞和晚幼粒细胞增多，骨髓象见各系细胞极度增生，以粒系为主，粒：红比例增至 30：1。

115.最可能的诊断

- A.急性淋巴细胞性白血病
- B.慢性淋巴细胞性白血病
- C.急性髓细胞性白血病
- D.慢性髓细胞性白血病
- E.类白血病反应

答案:D

解析:慢性髓细胞性白血病常表现为脾大，白细胞数明显增高，骨髓增生明显至极度活跃，以粒细胞为主，粒：红比例明显增高。

116.治疗首选方剂是

- A.黄连解毒汤
- B.八珍汤
- C.归脾汤
- D.当归补血汤
- E.青蒿鳖甲汤

答案:B

解析:结合患者的症状可辨证为气血两虚证。证候：面色萎黄或苍白，头晕眼花，心慌心悸，疲乏无力，气短懒言，自汗，食欲减退，舌质淡，苔薄白，脉细弱。治法：补益气血。方药：八珍汤加减。

117.治疗首选化疗药是

- A.马利兰
- B.长春新碱
- C.干扰素
- D.小剂量 Ara-C
- E.羟基脲

答案:E

解析:羟基脲为细胞周期特异性抑制 DNA 合成的药物，起效快，但持续时间短。为当前首选化疗药物。

共用题干:王某，女，47 岁。西医诊断甲状腺功能亢进症。症见：颈前肿胀，眼球突出，烦躁易怒，手指颤抖，多汗，面红目赤，头晕目眩，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。

118.治法为

- A.活血化瘀，软坚散结
- B.疏肝理气，化痰散结
- C.清肝泻火，消瘿散结
- D.滋阴降火，消瘿散结
- E.益气养阴，消瘿散结

答案:C

解析:结合患者的症状可诊断为甲状腺功能亢进症之肝火旺盛证。证候:颈前肿胀,眼突,烦躁易怒,手指颤抖,多汗,面红目赤,头晕目眩,口苦咽干,大便秘结,舌红苔黄,脉弦数。治法:清肝泻火,消瘿散结。方药:龙胆泻肝汤加减。

119.反应甲状腺功能最有价值的指标是

- A.血清 TSH
- B.血清 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>
- C.摄 <sup>131</sup>I 率
- D.血清 FT<sub>3</sub>、FT<sub>4</sub>
- E.血清 TT<sub>3</sub>、TT<sub>4</sub>

答案:A

解析:血清 TSH 测定较 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub> 灵敏度高,是反应甲状腺功能最有价值的指标。

120.不属甲亢主要临床表现的是

- A.眼征
- B.甲状腺危象
- C.高代谢症候群
- D.弥漫性甲状腺肿
- E.胫前黏液性水肿

答案:B

解析:甲亢主要临床表现有:高代谢症候群、弥漫性甲状腺肿、眼征和胫前黏液性水肿。甲状腺危象为甲亢的特殊临床表现。

B1 型题

(共用备选答案题)

- A.清营汤
- B.化斑汤
- C.白虎汤
- D.苇茎汤
- E.青蒿鳖甲汤

121.治疗肺炎咳吐黄稠脓痰者,应首选

答案:D

解析:肺炎咳吐黄稠脓痰者,属于内痈,治疗应首选苇茎汤,化痰排脓。

122.治疗肺炎热陷心包证,应首选

答案:A

解析:治疗肺炎热陷心包证,应首选清营汤清心安神。

(共用备选答案题)

- A.心悸气短,动则加剧,胸闷心痛,咳唾
- B.喘促气逆,不能平卧,痰稀量多,形寒肢冷

- C.下肢水肿，喘促气短，形寒肢冷，小便短少
- D.喘促日久，呼多吸少，面赤躁扰，汗出如注
- E.咳痰黄稠，烦躁不安，心烦失眠，口干咽燥

123.充血性心力衰竭心肾阳虚，痰饮上逆证的主要临床表现是

答案:B

解析:充血性心力衰竭心肾阳虚，痰饮上逆证的主要临床表现是喘促气逆，不能平卧，痰稀量多，形寒肢冷。

124.充血性心力衰竭心肾阳虚，虚阳外越证的主要临床表现是

答案:D

解析:充血性心力衰竭心肾阳虚，虚阳外越证的主要临床表现是喘促日久，呼多吸少，面赤躁扰，汗出如注。

(共用备选答案题)

- A.天麻钩藤饮
- B.半夏白术天麻汤
- C.血府逐瘀汤
- D.杞菊地黄丸
- E.济生肾气丸

125.痰湿内盛型原发性高血压的治疗方药为

答案:B

解析:痰湿内盛型原发性高血压的治疗方法是祛痰降浊，方药为半夏白术天麻汤。

126.瘀血内停型原发性高血压的治疗方药为

答案:C

解析:瘀血内停型原发性高血压的治疗方法是活血化瘀，方药为血府逐瘀汤。

(共用备选答案题)

- A.疏肝理气，活血化瘀
- B.清利湿热，化瘀解毒
- C.养阴清热，解毒祛瘀
- D.理气化痰，消食散结
- E.温中散寒，健脾调胃

127.治疗肝癌湿热瘀毒证，应首选

答案:B

解析:治疗肝癌湿热瘀毒证的治法为清利湿热，化瘀解毒，代表方为茵陈蒿汤合鳖甲煎丸加减。

128.治疗肝癌气滞血瘀证，应首选


答案:A

解析:治疗肝癌气滞血瘀证的治法为疏肝理气，活血化瘀，代表方为逍遥散合桃红四物汤加减。

(共用备选答案题)

- A.24小时尿蛋白定量
- B.尿培养及菌落计数
- C.肾功能检查
- D.摄腹部平片
- E.静脉肾盂造影

129.对确诊泌尿系感染最有意义的检查是



答案:B

解析:泌尿系感染的诊断是除膀胱刺激征外, 应有尿细菌培养及菌落计数, 其标准为尿含菌数 $>105/\text{mL}$  为阳性。

130.对肾病综合征最有诊断意义的检查是

答案:A

解析:肾病综合征的诊断标准是大量蛋白尿、低蛋白血症、高胆固醇血症、明显水肿。故 24 小时尿蛋白定量对肾病综合征的检查最有诊断意义。

(共用备选答案题)

- A.再生障碍性贫血之肾阳虚证
- B.再生障碍性贫血之肾虚血瘀证
- C.再生障碍性贫血之气血两虚证
- D.再生障碍性贫血之热毒壅盛证
- E.再生障碍性贫血之阴阳两虚证

131.六味地黄丸合桃红四物汤加减可用于何证的治疗

答案:B

解析:再生障碍性贫血之肾虚血瘀证的治疗方法是补肾活血, 可用六味地黄丸合桃红四物汤加减。

132.左归丸、右归丸合当归补血汤加减可用于何证的治疗

答案:E

解析:再生障碍性贫血之阴阳两虚证的治疗方法是滋阴助阳, 益气活血, 可用左归丸、右归丸合当归补血汤加减。

(共用备选答案题)

- A. $\text{FT}_3$ 、 $\text{FT}_4$
- B. $\text{TT}_3$ 、 $\text{TT}_4$
- C. $\text{TRAb}$
- D. $\text{rT}_3$
- E.甲状腺摄  $^{131}\text{I}$  率

133.诊断甲亢的首选实验室检查

答案:B

解析: $\text{TT}_3$ 、 $\text{TT}_4$  是反映甲状腺功能最基本的指标, 尤其在甲亢和甲亢复发的早期,  $\text{TT}_3$  上升很快, 为诊断甲亢较为敏感的指标。

134.甲亢内科治疗停药首选实验室检查

答案:C


解析: $\text{TRAb}$  在甲亢病人中的阳性率在 80% 以上, 对甲亢的诊断、病情活动和复发等均有重要意义, 同时是治疗停药的重要指标。 $\text{FT}_3$ 、 $\text{FT}_4$  不受血清甲状腺结合球蛋白的影响, 对妊娠期甲亢等的诊断意义较大。甲状腺摄  $^{131}\text{I}$  率主要用于鉴别不同原因引起的甲亢。

(共用备选答案题)

- A.颊部蝶形皮疹及蛋白尿
- B.腕、掌指、近指关节受累
- C.膝关节受累
- D.第一趾较剧烈疼痛
- E.大量龋齿提示

135.类风湿关节炎 (RA) 的临床表现特点是

答案:B



解析:类风湿关节炎以小关节受累为主要表现。

136.系统性红斑狼疮(SLE)的临床表现特点是

答案:A

解析:系统性红斑狼疮除面部皮肤损害外,伴有肾脏损害。临床表现为颊部蝶形皮疹及蛋白尿。

(共用备选答案题)

A.炙甘草汤

B.独参汤

C.四逆加味

D.白虎加人参汤合犀角地黄汤

E.三甲复脉汤

137.治疗休克阳气暴脱证,应首选的方剂是

答案:C

解析:临床上治疗休克阳气暴脱证代表方是四逆加味。

138.治疗休克真阴衰竭证,应首选的方剂是

答案:E

解析:临床上治疗休克阳气暴脱证的代表方是三甲复脉汤。

(共用备选答案题)

A.枳实导滞丸

B.保和丸

C.越鞠丸合枳术丸

D.二陈平胃散

E.香砂六君子汤

139.治疗胃痞肝胃不和证,应首选

答案:C

解析:饮食内停用保和丸消食和胃,和胃消痞,肝胃不和用越鞠丸疏肝解郁,枳术丸健脾消痞。

140.治疗胃痞饮食内停证,应首选

答案:B

解析:饮食内停用保和丸消食和胃,和胃消痞,肝胃不和用越鞠丸疏肝解郁,枳术丸健脾消痞。

(共用备选答案题)

A.痰饮

B.伏饮

C.悬饮

D.溢饮

E.支饮

141.水饮流溢于四肢,称为

答案:D

解析:痰饮-饮停肠胃,悬饮-饮流胁下,溢饮-饮溢肢体,支饮-支撑胸肺。

142.饮流于胃肠,称为

答案:A

解析:痰饮-饮停肠胃,悬饮-饮流胁下,溢饮-饮溢肢体,支饮-支撑胸肺。

(共用备选答案题)

- A.下肢疼痛或间歇性跛行
- B.视物模糊，眼底可见微血管瘤
- C.直立性低血压，少汗或多汗，心动过速
- D.双下肢麻木，灼热或如踏棉垫感
- E.外阴瘙痒

143.糖尿病周围神经病变可见

答案:D

解析:糖尿病微血管病变是肾病、视网膜病变等，其中视网膜病变可致视物模糊，眼底可见微血管瘤。糖尿病神经病变以周围神经为最常见，通常为麻木、刺痛、灼热或踏棉垫感。

144.糖尿病微血管病变可见

答案:B

解析:糖尿病微血管病变是肾病、视网膜病变等，其中视网膜病变可致视物模糊，眼底可见微血管瘤。糖尿病神经病变以周围神经为最常见，通常为麻木、刺痛、灼热或踏棉垫感。

(共用备选答案题)

- A.急性白血病之湿热内蕴证
- B.急性白血病之阴虚火旺证
- C.急性白血病之热毒炽盛证
- D.急性白血病之气阴两虚证#
- E.急性白血病之痰热瘀阻证

145.温胆汤合桃红四物汤加减可用于

答案:E

解析:急性白血病之痰热瘀阻证的治疗方法是清热化痰，活血散结，方用温胆汤合桃红四物汤加减。

146.葛根芩连汤加味可用于

答案:A

解析:急性白血病之湿热内蕴证的治疗方法是清热解毒，利湿化浊，方用葛根芩连汤加味。

(共用备选答案题)

- A.养心汤合补肺汤加减
- B.生脉散加减
- C.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合肾气丸加减
- D.人参养荣汤合桃红四物汤加减
- E.真武汤加减

147.急性心力衰竭心肾阳虚证的治疗方剂为

答案:C

解析:急性心力衰竭心肾阳虚证的治疗方法为温补心肾，选方应为桂枝甘草龙骨牡蛎汤合肾气丸加减。

148.急性心力衰竭阳虚水泛证的治疗方剂为

答案:E

解析:急性心力衰竭阳虚水泛证的治疗方法为温阳利水，选方应为真武汤加减。

(共用备选答案题)

- A.三仁汤
- B.四君子汤
- C.柴胡疏肝散
- D.益胃汤



E.失笑散合丹参饮

149.慢性胃炎之胃络瘀血证的治疗方药为

答案:E

解析:慢性胃炎之胃络瘀血证的治疗方法为化瘀通络,和胃止痛,方宜失笑散合丹参饮加减。

150.慢性胃炎之脾胃湿热证的治疗方药为

答案:A

解析:慢性胃炎之脾胃湿热证的治疗方法为清利湿热,醒脾化浊,方宜三仁汤加减。

#### 第四单元

A1 型题

1.疮疡中期,毒盛而正气不虚者,应选用的治法为

A.清热解毒

B.补托法

C.透托法

D.活血化瘀

E.软坚散结

答案:C

解析:透托法用于毒气虽盛而正气未衰者。

2.关于煮沸灭菌法,下列哪项说法不当

A.持续煮沸 15~20 分钟可杀灭一般细菌

B.持续煮沸 1~2 小时以上,可杀灭带芽孢细菌

C.适用于金属器械、玻璃、橡胶类等物品的消毒

D.持续 30 分钟,即可杀死包括细菌芽孢在内的一切细菌

E.铝锅洗净去脂污后,可作煮沸灭菌用

答案:D

解析:在正常压力下,在水中煮沸至 100°C,持续 15~20 分钟能杀灭一般细菌,持续煮沸 1~2 小时以上,可杀灭带芽孢细菌。

3.治疗低血容量性休克阴厥型的首选方药为

A.清营汤加减

B.四味回阳饮加减

C.人参养营汤加减

D.保元汤合固阳汤加减

E.独参汤合四逆汤加减

答案:C

解析:低血容量性休克属阴厥者,症见烦躁不安,汗出,唇舌干燥,口渴欲饮,无力,舌红少津,脉细无力等,治宜益气固脱,养血育阴。方用人参养营汤加减。

4.治疗阴虚火盛之痢,当用

A.仙方活命饮

B.竹叶黄芪汤

C.四君子汤

D.金匱肾气丸

E.十全大补汤

答案:B

解析:阴虚火盛之痢,治当滋阴生津,清热托毒,方用竹叶黄芪汤加减。



5.尿道骑跨伤多引起

- A.前尿道损伤
- B.后尿道损伤
- C.尿潴留
- D.尿道完全断裂
- E.尿道狭窄

答案:A

解析:尿道骑跨伤常发生会阴部、阴囊处瘀斑、肿胀。前尿道损伤有会阴部疼痛,并可放射至尿道外口。所以说尿道骑跨伤多引起前尿道损伤。

6.关于局部冻伤临床分度的表述错误的是

- A.I°冻伤,伤及表皮层
- B.II°冻伤,损伤达皮肤全层
- C.III°冻伤,损伤皮肤全层
- D.III°冻伤,损伤深至皮下组织
- E.IV°冻伤,损伤深达肌肉、骨骼等组织

答案:B

解析:I°冻伤,伤及表皮层。II°冻伤,损伤达真皮层。III°冻伤,损伤皮肤全层或深至皮下组织。IV°冻伤,损伤深达肌肉、骨骼等组织。

7.乳房发生乳腺癌最常见的部位为

- A.乳头部位
- B.内上象限
- C.外上象限
- D.内下象限
- E.外下象限

答案:C

解析:外上象限是乳腺癌的好发部位,约1/3的乳腺癌发生于此,是临床重点检查部位。

8.治疗胃癌之瘀毒内阻证选用的方剂是

- A.十全大补汤
- B.逍遥散合旋覆代赭汤
- C.竹叶石膏汤合玉女煎
- D.参苓白术散合二陈汤
- E.失笑散合膈下逐瘀汤


答案:E

解析:瘀毒内阻证的证候:多见于进展期胃癌。胃脘刺痛拒按,呕血腥秽,或心下痞块坚硬,呕吐食少,大便黑干;舌紫或有瘀斑,苔浊腻,脉沉涩。治法:活血祛瘀,解毒养阴。方药:失笑散合膈下逐瘀汤加减。

9.尿路结石气滞血瘀证的治法是

- A.清热利湿,通淋排石
- B.利湿化浊,通淋排石
- C.行气活血,通淋排石
- D.祛瘀止痛,通淋排石
- E.补肾益气,通淋排石

答案:C



解析:尿路结石的中医证型有:(1) 湿热蕴结证宜清热利湿, 通淋排石;(2) 气滞血瘀证宜行气活血, 通淋排石;(3) 肾气不足证宜补肾益气, 通淋排石。故选择 C。

10. 尖锐湿疣表皮赘生物的颜色为

- A. 无色透亮
- B. 暗红褐色
- C. 皮色青紫
- D. 皮色带绿
- E. 皮色鲜红

答案:B

解析:尖锐湿疣基本损害为淡红色或暗红褐色、柔软的表皮赘生物。

11. 中医认为月经的产生是以下哪项协调作用于胞宫的结果

- A. 肾气、天癸、冲任、气血
- B. 冲、任、督、带诸脉
- C. 心、肝、脾、肾诸脏
- D. 营卫、气血、天癸
- E. 天癸、胞宫、胞脉

答案:A

解析:月经是肾气、天癸、冲任、气血协调作用于胞宫, 并在其他脏腑、经络的协同作用下, 使胞宫定期藏泻而产生的生理现象。

12. 下列不属于先兆流产症状的是

- A. 阴道流血
- B. 腹痛
- C. 腰背痛
- D. 小腹坠胀
- E. 阴道胎块

答案:E

解析:先兆流产指妊娠 28 周前出现少量阴道流血, 下腹痛或腰背痛。妇科检查: 子宫颈口未开, 胎膜未破, 子宫大小与停经周数相符。经治疗及休息后症状消失, 可继续妊娠。中医称“胎漏”、“胎动不安”。如果出现阴道胎块指胚胎组织或者羊膜囊, 是难免流产的表现。

13. 临产的主要标志是

- A. 见红, 规律宫缩, 胎头下降
- B. 规律宫缩, 破膜, 胎头下降
- C. 见红, 破膜, 宫口扩张
- D. 规律宫缩, 胎头下降, 宫口扩张
- E. 见红, 破膜, 规律宫缩

答案:D

解析:临产开始的主要标志是有规律而逐渐增强的子宫收缩, 持续 30 秒及以上, 间歇 5~6 分钟, 并伴有进行性宫颈管消失, 宫口扩张和胎先露部下降。

14. 正常枕先露分娩机制, 下述哪项正确

- A. 下降, 衔接, 内旋转, 俯屈, 仰伸复位, 外旋转
- B. 衔接, 俯屈, 内旋转, 下降, 仰伸复位, 外旋转
- C. 衔接, 下降, 俯屈, 内旋转, 仰伸复位, 外旋转
- D. 下降, 俯屈, 衔接, 内旋转, 仰伸复位, 外旋转
- E. 衔接, 下降, 内旋转, 俯屈, 仰伸复位, 外旋转



答案:C

解析:正常分娩机制为:衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转。

15.煎汤频服可用于退奶的是

- A.炒山楂
- B.炒神曲
- C.炒麦芽
- D.炒莱菔子
- E.炒鸡内金

答案:C

解析:需退奶者,可用炒麦芽 60g,煎汤频服。

16.妇科疾病的发生机理,可概括为

- A.脏腑功能失常,气血失调,冲任督带损伤以及胞宫、胞脉、胞络受损
- B.先天肾气不足,后天房劳多产损伤肾精,肾为冲任之本,肾虚,冲任不固
- C.情志内伤,肝气郁结,血为气滞,冲任失调
- D.忧思劳倦,饮食不节,损伤脾气,脾失统摄,气随血陷,冲任不固
- E.忧愁思虑,心阴暗耗,营血不足,冲任虚损

答案:A

解析:妇科疾病的发生机理是:脏腑功能失常、气血失调、冲任督带损伤以及胞宫、胞脉、胞络受损。

17.产后三审中以验津液之盛衰的是

- A.小腹的痛与不痛
- B.乳汁的多少
- C.饮食的多少
- D.大便的通与不通
- E.小便的利与不利

答案:D

解析:产后病的辨证应注重“产后三审”,即一审小腹痛与不痛,以辨恶露有无停滞;二审大便通与不通,以验津液之盛衰;三审乳汁与饮食多少,以察胃气的强弱。

18.脾虚失运致经行泄泻,治宜

- A.益气养阴
- B.温阳行水
- C.祛痰化湿
- D.健脾益气,升阳除湿
- E.温肾健脾,温阳行水


答案:D

解析:若脾虚失运,水湿停滞,阻遏阳气,可致经行泄泻、经行浮肿、妊娠肿胀、带下病、胎水肿满等,治宜健脾益气,升阳除湿。

19.治疗子痫脾肾两虚证首选

- A.天仙藤散
- B.杞菊地黄丸
- C.羚角钩藤汤
- D.半夏白术天麻汤
- E.白术散合五苓散

答案:E



解析:子痫脾肾两虚证。证候:妊娠中晚期,面目及下肢浮肿,甚或遍及全身,肤色淡黄或白,皮薄而光亮,按之凹陷,即时难起,倦怠无力,气短懒言,食欲不振,下肢逆冷,腰酸膝软,小便短少,或大便溏薄;舌淡胖边有齿痕,苔白滑或薄腻,脉沉滑无力。治法:健脾温肾,行水消肿。方药:白术散合五苓散。

20.尿路感染所属的中医学范畴是

- A.热淋
- B.劳淋
- C.子淋
- D.腰痛
- E.虚劳

答案:C

解析:尿路感染属中医“子淋”范畴。

21.可造成新生儿黄疸重度贫血的是

- A.先天胆道闭塞
- B.肝炎
- C.败血症
- D.ABO 溶血
- E.Rh 溶血

答案:E

解析:ABO 溶血除引起黄疸外其他改变不明显。Rh 溶血可造成新生儿重度贫血,甚至心力衰竭。

22.急性上呼吸道感染风寒感冒证的治疗方剂为

- A.荆防败毒散加减
- B.银翘散加减
- C.新加香薷饮
- D.人参败毒散
- E.玉屏风散

答案:A

解析:急性上呼吸道感染风寒感冒证的治疗方法为辛温解表,方用荆防败毒散加减。

23.下列属于病毒性心肌炎风热犯心证临床表现的是

- A.心悸不宁,心前区痛如针刺,脘闷呕恶
- B.心悸怔忡,畏寒肢冷,面色苍白
- C.发热,咽红肿痛,心悸气短
- D.寒热起伏,全身肌肉酸痛
- E.心悸不宁,头晕目眩,烦热口渴

答案:C

解析:病毒性心肌炎风热犯心证,临床表现为发热,低热绵延,或不发热,鼻塞流涕,咽红肿痛,咳嗽有痰,肌痛肢楚,头晕乏力,心悸气短,胸闷胸痛,舌质红,舌苔薄,脉数或结代。A 项为痰瘀阻络证的表现,B 项为心阳虚弱证的表现,D 项为是湿热侵心的表现,E 项为气阴亏虚证的表现。

24.鹅口疮的主要临床特征是

- A.口腔内满布红色溃疡
- B.咽喉部白色假膜
- C.齿龈满布白色疱疹

- D.口腔周围满布白色小红点
- E.口腔舌面满布灰白色乳凝块样白膜

答案:E

解析:鹅口疮临床特征主要为口腔黏膜上出现白色或灰白色乳凝块样白膜。

25.治疗小儿伤食泻的首选方剂是

- A.保和丸
- B.健脾丸
- C.消乳丸
- D.资生健脾丸
- E.参苓白术散

答案:A

解析:伤食泻证候:大便稀溏,夹有乳凝块或食物残渣,气味酸臭,或如败卵,脘腹胀满,便前腹痛,泻后痛减,腹痛拒按,暖气酸馊,或有呕吐,不思乳食,夜卧不安,舌苔厚腻,或微黄,脉滑实,指纹滞。治法:运脾和胃,消食化滞。方药:保和丸加减。

26.小儿急性肾小球肾炎风水相搏证的首选方剂是

- A.麻黄连翘赤小豆汤
- B.银翘散
- C.五味消毒饮
- D.葱豉桔梗汤
- E.藿香正气散

答案:A

解析:急性肾小球肾炎风水相搏证的治法是疏风利水,代表方为麻黄连翘赤小豆汤。银翘散疏散风热。五味消毒饮清热解毒,消散疔疮。葱豉桔梗汤辛凉解肌,疏风清热,均无利水的功效。藿香正气散解表化湿,理气和中,主治外感风寒,内伤湿滞证。

27.小儿肾病综合征高胆固醇血症的标准是

- A.大于 3mmol/L
- B.大于 3.5mmol/L
- C.大于 4mmol/L
- D.大于 4.5mmol/L
- E.大于 5.7mmol/L

答案:E


解析:肾病综合征诊断要点:大量蛋白尿(尿蛋白+++~++++,1周内3次测定24小时尿蛋白定量, $>50\text{mg/kg}$ );血浆白蛋白低于 $30\text{g/L}$ ;血浆胆固醇高于 $5.7\text{mmol/L}$ ;不同程度的水肿。以上四项中以大量蛋白尿和低白蛋白血症为必要条件。

28.小儿癫痫与晕厥共有的表现是

- A.体位性低血压
- B.惊惕不安
- C.呼吸暂停
- D.意识障碍
- E.二便失禁

答案:D

解析:癫痫临床表现为意识、运动、感觉、精神或自主神经功能障碍。晕厥是各种原因引起的一过性脑供血不足导致突然发生的意识丧失状态,发作时先有出汗,面色苍白,视物模糊,继之意识障碍,全身肌张力丧失,严重者可见惊厥发作,一般无二便失禁。



29.注意力缺陷多动障碍的主要发病机制是

- A.心常有余
- B.肝常有余
- C.脾常不足
- D.肾常虚
- E.阳动有余，阴静不足

答案:E

解析:注意力缺陷多动障碍的主要发病机制是阴阳平衡失调，即阳动有余，阴静不足。

30.口服铁剂治疗小儿缺铁性贫血，为促进铁的吸收，应同时服用的药物是

- A.维生素 E
- B.维生素 B<sub>1</sub>
- C.维生素 C
- D.维生素 B<sub>6</sub>
- E.维生素 A

答案:C

解析:口服铁剂最好于两餐之间服药，既减少对胃黏膜的刺激，又利于吸收。同时口服维生素 C 促进铁的吸收。牛奶、茶、咖啡及抗酸药等与铁同服均可影响铁的吸收。

A2 型题

31.女性，20 岁，因十二指肠溃疡所致幽门梗阻引起反复呕吐 15 天入院，测得血钾值为 3mmol/L，动脉血 pH7.5，首选补液种类应为

- A.乳酸、氯化钾溶液
- B.氯化钾溶液
- C.等渗盐水
- D.葡萄糖盐水
- E.葡萄糖盐水、氯化钾溶液

答案:E

解析:该患者幽门梗阻引起反复呕吐使酸性胃液大量丢失，可致代谢性碱中毒，目前血钾低，pH 值增高，多数经补生理盐水和氯化钾后情况可改善，因此选 E。

32.患者输血 5 分钟后即出现寒战，高热，头痛，腰背部剧痛，心前区压迫感。检查：血压 78/60mmHg（10.4/8KPa），血浆呈粉红色。应首先考虑的是

- A.发热反应
- B.过敏反应
- C.溶血反应
- D.细菌污染反应
- E.循环超负荷

答案:C

解析:溶血反应的一般表现为头痛，胸痛，心前区压迫感，全身不适，腰背酸痛，寒战，高热，恶心，呕吐，面色苍白，烦躁不安，呼吸急促，脉搏细速，甚至休克。患者输血 5 分钟后即出现寒战，高热，头痛，腰背部剧痛，心前区压迫感，血压 78/60mmHg（10.4/8KPa），血浆呈粉红色。所以，应首先考虑的是溶血反应。故本题选 C。

33.男性，40 岁，腹痛、发热 48 小时，血压 80/60mmHg，神志清楚，面色苍白，四肢湿冷，全腹肌紧张，肠鸣音消失，诊断为

- A.低血容量性休克

- B.感染性休克
- C.神经源性休克
- D.心源性休克
- E.过敏性休克

答案:B

解析:患者血压低,面色苍白,四肢湿冷,考虑为休克,另根据全腹肌紧张为腹膜炎的体征,考虑为感染性休克。

34.女性,62岁,诊断胃癌,血压150/95mmHg,中度贫血,消瘦,术前准备不是必要的项目是

- A.纠正贫血
- B.改善营养状态
- C.检测肝功能
- D.血压降至正常
- E.血生化检查

答案:D

解析:病人血压160/100mmHg以下可不作特殊准备。血压过高者,术前应用合适的降压药物,使血压稳定在一定水平,但不要求降至正常水平。余选项均为术前必要的准备项目。

35.患者,女,38岁。甲状腺肿块坚硬如石,推之不移,局部僵硬,形体消瘦,皮肤枯槁,声音嘶哑,腰酸无力,舌质红,少苔,脉沉细数,诊断为甲状腺肿瘤,治疗首选方剂是

- A.海藻玉壶汤合逍遥散
- B.桃红四物汤合海藻玉壶汤
- C.通窍活血汤合养阴清肺汤
- D.海藻玉壶汤合神效瓜蒌散
- E.知柏地黄丸合海藻玉壶汤

答案:C

解析:瘀热伤阴证的证候:肿块坚硬如石,推之不移,局部僵硬;形体消瘦,皮肤枯槁,声音嘶哑,腰酸无力;舌质红,少苔,脉细沉数。治法:养阴和营,化痰散结。方药:通窍活血汤合养阴清肺汤加减。

36.患者,男,32岁。左下肢丹毒,皮肤红肿,痛如火燎,口渴少饮,尿黄,舌红苔黄腻,脉滑数。其证型是

- A.热毒蕴结
- B.热毒入营
- C.湿热毒蕴
- D.风热毒蕴
- E.脾虚湿困

答案:C

解析:丹毒好发部位为下肢和头面部,常见的中医证型有:①风热毒蕴证,先发于鼻额部。②肝脾湿火证,发于腰胯肋下,大片鲜红,红肿蔓延,摸之灼手,肿胀触痛;舌红,苔黄腻,脉弦滑数。③湿热毒蕴,下肢小腿处肿胀,痛如火燎,口渴少饮,尿黄,舌红苔黄腻,脉滑数。④胎火蕴毒证,多发生于初生儿。根据患者皮肤红肿,舌红苔黄腻,脉滑数可诊断为湿热毒蕴。故应选C。

37.患者烧伤后8天,高热不退,入夜尤甚,神昏谵语,舌红绛,光剥无苔,脉细数。应辨证为

- A.火热伤津



- B.气阴两伤
- C.阴伤阳脱
- D.火毒内陷
- E.气营两燔

答案:D

解析:根据烧伤后的具体临床表现,中医将烧伤分为5型。①火毒伤津证,以壮热烦躁、口干喜饮、便秘、尿赤为主。②阴伤阳脱证,症见身疲倦怠、面色苍白、呼吸气微、表情淡漠、自汗肢冷等。③火毒内陷证,主要表现为壮热不退、口干唇燥、躁动不安等。④气血两虚证,多见于疾病后期,表现为气短懒言、身体消瘦、面色无华、食欲不振等气血不足之象。⑤脾虚阴伤证,多见于疾病后期,脾胃虚弱、津液耗损。现患者见高热不退,并见精神症状,即神昏谵语,舌红绛,光剥无苔,可诊断为火毒内陷证。故本题选D。

38.患者,女,28岁。右前臂圆形肿物如指头大小,质硬,表面光滑,边缘清楚,无粘连,活动度大。应首先考虑的是

- A.粉瘤
- B.脂肪瘤
- C.神经纤维瘤
- D.纤维瘤
- E.血管瘤

答案:D

解析:纤维瘤可分为软、硬两种。软者又称皮赘,有蒂,大小不等,柔软无弹性,多见于面、颈及胸背部。硬者具有包膜,切除后不易复发,不发生转移。其生长缓慢,大小不定,实性,圆形,质硬,光滑,界清,无粘连,活动度大,无压痛,很少引起压迫和功能障碍。

39.患者男性,40岁。20年前曾患肺结核,平素健康,近3个月来有刺激性咳嗽,痰中偶有血丝,有时发热。X线:右肺上叶前段有2cm×2.5cm的块状阴影,边缘不整,呈分叶状,查痰脱落细胞3次均阴性,诊断首先考虑

- A.肺结核
- B.肺脓肿
- C.肺囊肿
- D.原发性支气管肺癌
- E.肺炎

答案:D

解析:患者为中年男性,3个月来有刺激性咳嗽,痰中偶带血丝,应考虑到肺癌可能。X线片显示右肺上叶前段有2cm×2.5cm块状阴影,边缘不整,呈分叶状,为周围型肺癌的表现。痰细胞学检查3次阴性不能否定诊断。

40.患者,女,35岁,乳房胀痛半年,经前加重,经后痛减;伴情绪抑郁,心烦易怒,失眠多梦,胸胁胀满;舌质淡红,苔薄白,脉细涩。其证型是

- A.痰瘀凝结证
- B.肝郁气滞证
- C.气滞血瘀证
- D.冲任失调证
- E.毒热蕴结证

答案:B



解析:乳腺增生病之肝郁气滞证的证候:乳房胀痛或有肿块,一般月经来潮前乳痛加重和肿块稍肿大,行经后好转;常伴有情绪抑郁,心烦易怒,失眠多梦,胸胁胀满等;舌质淡红,苔薄白,脉细涩。治法:疏肝理气,散结止痛。方药:逍遥散加减。

41.患者,男,45岁。脘腹胀痛,呕吐,停止排便排气6小时。腹部痞满拒按,发热,口渴,小便黄赤,舌质红,苔黄燥,脉洪数。应首先考虑的是

- A.肠梗阻气滞血瘀证
- B.肠梗阻肠腑热结证
- C.肠梗阻水结湿阻证
- D.阑尾炎瘀滞证
- E.阑尾炎湿热证

答案:B

解析:肠梗阻肠腑热结证的证候:腹痛腹胀,痞满拒按,恶心呕吐,无排气排便;发热,口渴,小便黄赤,甚者神昏谵语;舌质红,苔黄燥,脉洪数。治法为活血清热,通里攻下。方选复方大承气汤加减。

42.患者男性,60岁,上腹部隐痛不适3月余,伴纳差,乏力。体检:腹平坦,无压痛,未及肿块,移动性浊音(-),B超检查:肝左叶见一直径1.5cm光团,胃镜示胃窦部溃疡病变,组织学检查高分化腺癌,最适宜的治疗方案是

- A.化疗
- B.肝动脉插管化疗
- C.胃大部切除加肝左叶切除
- D.免疫治疗
- E.放疗

答案:C

解析:本例病人根据临床表现和B超检查可诊断为原发性肝癌,手术切除是目前首选的、最有效的治疗方法。胃镜显示,胃窦部受侵犯,在切除原发病变的同时,应连同受侵脏器一并切除。

43.患者,男,46岁,诊断为门静脉高压症,突然发生大量呕血,之后出现面色苍白,四肢厥冷,汗出;舌淡,苔白,脉微,选用的治法为

- A.益气固脱
- B.温中健脾,行气利水
- C.祛瘀软坚,兼调脾胃
- D.益气生津,降逆止呕
- E.涤痰化浊,和胃降逆


答案:A

解析:气随血脱证的证候:患者突然大量吐血及便血后出现面色苍白,四肢厥冷,汗出;舌淡,苔白,脉微。治法:益气固脱。方药:独参汤。

44.患者,男,50岁,诊断为结肠癌,症见腹胀,腹泻,腰膝酸软,不思饮食,四肢无力,失眠倦怠,尿少;舌淡,脉细无力。治疗应首选

- A.桃红四物汤
- B.八珍汤合麻仁滋脾丸
- C.益气固本解毒汤
- D.槐角地榆汤
- E.失笑散合膈下逐瘀汤

答案:C



解析:根据患者的表现辨证为脾肾两虚证。证候:腹胀,腹泻,腰膝酸软,不思饮食,四肢无力,失眠倦怠,尿少;舌淡,脉细无力。治法:健脾益肾,扶正固本。方药:益气固本解毒汤加减。

45.患者,女,23岁。小便不畅、短涩,淋漓不尽,带下多,酒后或疲劳易复发;腰酸腿软,五心烦热,食少纳差;舌红,苔少,脉细数,可初步诊断为

- A.梅毒-肝经湿热证
- B.梅毒-血热蕴毒证
- C.梅毒-毒结筋骨证
- D.淋病-湿热毒蕴证
- E.淋病-阴虚毒恋证

答案:E

解析:该患者可考虑为淋病-阴虚毒恋证(慢性淋病)。证候:小便不畅、短涩,淋漓不尽,女性带下多,或尿道口见少许黏液,酒后或疲劳易复发;腰酸腿软,五心烦热,食少纳差;舌红,苔少,脉细数。治法:滋阴降火,利湿祛浊。方药:知柏地黄丸酌加土茯苓、萆薢等。

46.25岁妇女,月经规则6/35天一次,末次月经8月20日,推算其排卵期应在

- A.9月11日左右
- B.9月4日左右
- C.9月7日左右
- D.9月5日左右
- E.8月30日左右

答案:A

解析:排卵多发生在下次月经来潮前14日左右。若未怀孕,下次月经正常时间为:(20+35=55,55-31=24)(注:8月为大月,故为31天)9月24日,故选项A为最佳答案。

47.杜某,孕36周,产前检查中发现胎儿近3周宫高增长缓慢。以下检查不能反映胎盘功能的是

- A.胎动计数
- B.雌三醇(E<sub>3</sub>)测定
- C.尿雌激素/肌酐比值(E/C)
- D.血清胎盘生乳素
- E.hCG测定


答案:E

解析:人绒毛膜促性腺激素(hCG)是一种糖蛋白,由胎盘产生。在孕妇血与尿中都大量存在,尤其在早期妊娠阶段,故能用生物法或免疫法作测定以诊断早孕。在非妊娠期,hCG出现于血或尿中时,是为病理现象,指示可能有分泌这种激素的肿瘤组织存在。hCG的生物活性同人黄体生成激素有类似处,但不完全相同。在妊娠期,hCG的生理作用尚不完全明了。胎盘功能检查包括:胎动、孕妇尿雌三醇值、孕妇血清人胎盘生乳素值、缩宫素激惹试验、阴道脱落细胞检查、胎儿生物物理监测。

48.患者,女,27岁,产后2小时内出现子宫收缩乏力,应首先采取的措施是

- A.让产妇进食清淡半流食
- B.让产妇排尿与排便
- C.应给予抗生素
- D.按摩子宫并肌注子宫收缩剂
- E.适当补充维生素和铁剂

答案:D



解析:产后 2 小时内极易发生产后出血、子痫、产后心力衰竭等严重并发症,若发现子宫收缩乏力,应按摩子宫并肌注子宫收缩剂。

49.患者,女,31岁,妊娠中晚期出现肢体面目肿胀,考虑诊断为

- A.子肿
- B.子晕
- C.子痫
- D.子冒
- E.晕厥

答案:A

解析:子肿:妊娠中晚期,孕妇出现肢体面目肿胀。

50.患者,女,36岁,带下量增多一个月,色黄,呈脓样,阴痒,口干口苦,小便黄赤,大便干结,舌苔薄黄腻,脉弦数。西医诊断为阴道炎,治疗应首选的方剂是

- A.内补丸
- B.完带汤
- C.龙胆泻肝汤
- D.萆薢渗湿汤
- E.仙方活命饮

答案:C

解析:此患者表现为阴道炎之肝经湿热证。证候:带下多,色白或黄,呈泡沫状或黄绿如脓,甚或杂有赤带,有臭味,外阴瘙痒,头晕目胀,心烦口苦,胸胁、少腹胀痛,尿黄便结;舌质红,苔黄,脉弦涩。治则:清热利湿,杀虫止痒。方药:龙胆泻肝汤加苦参、百部、蛇床子。故此题的最佳选项是 C。

51.患者,女,24岁,孕后阴道下血,色暗红,腰酸腹痛下坠;舌边有瘀点,脉弦滑。选用的治法是

- A.补肾益气,固冲安胎
- B.补气养血,固肾安胎
- C.清热凉血,固冲安胎
- D.活血消癥,补肾安胎
- E.补肾益气,调固冲任

答案:D

解析:该患者为胎动不安之血瘀证。证候:宿有癥疾,或孕后阴道下血,色暗红或红,甚则腰酸腹痛下坠;舌暗或边有瘀点,脉弦滑或沉弦。治法:活血消癥,补肾安胎。方药:桂枝茯苓丸加菟丝子、桑寄生、续断。

52.患者,女,31岁。妊娠早期少量阴道流血,色淡暗,腰酸、腹坠,孕 5 产 0,舌淡,苔白,脉沉细滑尺弱。B 超提示宫内单活胎。应首选的治疗措施是

- A.肌注缩宫素,口服生化汤
- B.肌注黄体酮,口服六味地黄丸
- C.肌注黄体酮,口服寿胎丸
- D.宫颈环扎术,口服泰山磐石散
- E.宫颈口环扎术,口服寿胎丸

答案:C

解析:患者妊娠早期少量阴道流血,腰酸、腹坠,B 超提示宫内单活胎,可诊断为先兆流产,中医称为胎动不安。由患者临床表现辨证为肾虚证。治法为补肾益气,固冲安胎。代表方为



寿胎丸加党参、白术。西医治疗：卧床休息，禁止性生活，黄体功能不足者可肌注黄体酮和维生素 E。

53.患者，女，孕 29 周，心悸怔忡，气短胸闷，胸胁作痛，口唇发绀，舌紫暗，脉弦涩，治疗应首选的方剂是

- A.真武汤
- B.补阳还五汤
- C.血府逐瘀汤
- D.阳和汤
- E.养心汤

答案:B

解析:此患者为妊娠合并心脏病的患者，根据所给出的信息，为气虚血瘀证。证候：妊娠期间，心悸怔忡，气短胸闷，胸胁作痛，咳嗽气喘，口唇发绀；舌质紫暗，脉弦涩或结代。治法：益气化瘀，通阳安胎。方药：补阳还五汤合瓜蒌薤白半夏汤去红花、桃仁、半夏、地龙，加桑寄生、杜仲。此题的正确答案是 B。

54.初孕妇，28 岁，妊娠 34 周，睡眠中突然出现大量阴道流液，起床后又有持续流液，因胎膜早破收入院。入院后诊断胎膜早破的检查方法不包括

- A.阴道酸碱度检查
- B.阴道液涂片检查
- C.羊膜镜检查
- D.超声检查
- E.阴道 B 超

答案:E

解析:胎膜早破的诊断：（1）临床表现：孕妇突感阴道大量排液。肛诊将胎先露部上推时阴道流液量增多。窥阴器检查有羊水自宫口流出，或后穹隆有羊水积聚。（2）阴道酸碱度检查：pH $\geq$ 6.5，提示胎膜早破。（3）阴道液涂片检查：阴道液置于载玻片上，干燥后镜检可见羊齿植物叶状结晶，用 0.5% 硫酸尼罗蓝染色，镜下见橘黄色胎儿上皮细胞，用苏丹Ⅲ染色见黄色脂肪小粒，均可确定为羊水。（4）羊膜镜检查：看不到前羊膜囊，可直视胎儿先露部。（5）超声检查：羊水量减少可协助诊断。

55.患者，女，26 岁，新产后，突然阴道大量出血，血色鲜红，头晕目眩，心悸怔忡，气短懒言，肢冷汗出，面色苍白；舌淡，脉虚数。选用的治法为

- A.活血化瘀，调冲止血
- B.活血化瘀，理血归经
- C.补气固冲，摄血止崩
- D.补脾益气，固冲摄血
- E.养阴清热，安冲止血

答案:C

解析:血瘀证的证候：新产后，突然阴道大量下血，色暗红，夹有血块，小腹疼痛拒按，血块下后腹痛减轻；舌紫暗，或有瘀点瘀斑，脉沉涩。治法：活血化瘀，理血归经。方药：化瘀止崩汤。

56.患者，女，25 岁，产后身热多汗，口渴心烦，体倦少气，小便短赤；舌红，少津，脉虚数。选用的治法是

- A.清暑泄热，透邪外达
- B.清热解暑，益气生津
- C.清营泻热，清心开窍

D.补益心脾，养血安神

E.活血化瘀，镇逆安神

答案:B

解析:暑伤津气证的证候:产后身热多汗,口渴心烦,体倦少气,小便短赤;舌红,少津,脉虚数。治法:清热解暑,益气生津。方药:清暑益气汤。

57.女,28岁,月经干净后开始出现外阴奇痒,灼热疼痛,带下量多,色黄气秽,局部皮肤黏膜粗糙肥厚或破损溃疡,渗流黄水,胸闷烦躁,口苦口干,溲赤便秘;舌红,苔黄腻,脉弦数。主方选用

A.龙胆泻肝汤

B.五味消毒饮

C.易黄汤

D.萆薢胜湿汤

E.二妙散

答案:A

解析:外阴鳞状上皮增生之湿热下注证。证候:外阴奇痒,灼热疼痛,带下量多,色黄气秽,局部皮肤黏膜粗糙肥厚,渗流黄水,胸闷烦躁,口苦口干,溲赤便秘;舌红,苔黄腻,脉弦数。治法:清热利湿,通络止痒。方药:龙胆泻肝汤去木通。

58.患者,女,35岁,已婚。阴道分泌物多,色黄质稠有臭味,性交后出血,少腹胀痛,口干不欲,舌红,苔黄腻,脉滑数。妇科检查:宫颈肥大,表面鲜红色呈颗粒状突起。应首先考虑的病证结合诊断是

A.滴虫性阴道炎湿热下注证

B.宫颈肥大热毒蕴结证

C.宫颈黏膜炎脾虚湿盛证

D.宫颈糜烂湿热下注证

E.宫颈黏膜炎热毒蕴结证

答案:D

解析:患者阴道分泌物多,色黄质稠有臭味,性交后出血,少腹胀痛,妇科检查实宫颈肥大,表面鲜红色呈颗粒状突起,可诊断为宫颈炎,宫颈糜烂。湿热下注则阴道分泌物多,色黄质稠有臭味。湿热影响气机,则出现少腹胀痛。湿属阴邪,易影响气机及脾胃的运化功能,阴液输布障碍不得上乘,则口干不欲饮。舌红,苔黄腻,脉滑数皆属于湿热之象。辨证为湿热下注证。

59.患者,女,28岁,经期或经后小腹绵绵作痛,经色淡,量少,腰膝酸软,头晕耳鸣;舌质淡,脉沉细弱。最佳诊断为

A.痛经,气滞血瘀证

B.痛经,寒湿凝滞证

C.痛经,湿热瘀阻证

D.痛经,气血虚弱证

E.痛经,肝肾亏虚证

答案:E

解析:痛经之肝肾亏损证。证候:经期或经后小腹绵绵作痛,经色淡,量少,腰膝酸软,头晕耳鸣;舌质淡,脉沉细弱。治法:滋肾养肝,调经止痛。方药:调肝汤加桑寄生、肉苁蓉。

60.月经周期延后、量少、色淡、质黏稠,渐至停闭,形体肥胖,胸闷呕恶,所属中医证型为

A.肝肾不足证

- B.气虚血瘀证
- C.阴虚血燥证
- D.痰湿阻滞证
- E.气滞血瘀证

答案:D

解析:闭经之痰湿阻滞证。证候:月经周期延后、量少、色淡、质黏稠,渐至停闭,形体肥胖,胸闷呕恶,倦怠嗜睡,面浮肢肿,带下量多,色白质稠;舌苔白腻,脉沉缓或滑。治法:燥湿化痰,活血通经。方药:苍附导痰丸加当归、川芎。

61.患儿,女,7岁。症见:乳房发育,月经提前来潮,伴有潮热、盗汗、五心烦热。舌红少苔,脉细数。其治疗首选方剂是

- A.知柏地黄丸
- B.丹栀逍遥散
- C.黄连解毒汤
- D.黄连温胆汤
- E.柴胡疏肝散

答案:A

解析:此患儿表现为性早熟之阴虚火旺证。阴虚火旺证证候:女孩乳房发育或伴其他性征及内外生殖器发育,甚者月经提前来潮;男孩睾丸容积增大( $\geq 4\text{mL}$ ),或伴喉结突出,变声,或有遗精。或伴有潮热、盗汗、五心烦热、便秘、舌红或舌尖红,少苔,脉细数。治法:滋补肾阴,清泻相火。方药:知柏地黄丸加减。

62.患儿,6岁。下肢伸侧及臀部皮疹3天,皮疹表现为瘀点、瘀斑高出皮肤,色泽鲜红,大小不一,压之不退色,呈对称性,伴有阵发性腹痛。实验室检查:血小板,出血、凝血时间,均正常。便常规、尿常规无异常。应首先考虑的诊断是

- A.猩红热
- B.手足口病
- C.过敏性紫癜
- D.特发性血小板减少性紫癜
- E.皮肤黏膜淋巴结综合征

答案:C

解析:过敏性紫癜临床表现为皮肤紫癜,多见于四肢及臀部,部分累及上肢及躯干,典型皮疹初为小型荨麻疹或紫红色斑丘疹,高出皮肤,压之不退色,皮疹无压痛,分批出现,新旧并存,呈对称性分布。消化道症状以脐周或下腹部绞痛伴呕吐为主。

63.患儿,2岁。持续发热1周,体温 $39^{\circ}\text{C}$ 左右,查体:发热面容,双眼结膜充血,右侧颈部可触及多个蚕豆大小淋巴结,质硬,活动度尚可,口腔黏膜弥漫充血,躯干部见粟粒状均匀皮疹,疹间皮肤潮红,手足指端皮肤发红,肿胀。心肺听诊未闻异常。舌质红赤,杨梅舌,指纹紫。实验室检查。血沉明显增快,C反应蛋白阳性,抗“O”滴度正常,应首先考虑的诊断为

- A.传染性单核细胞增多症
- B.猩红热
- C.皮肤黏膜淋巴结综合征
- D.风湿热
- E.幼年型类风湿关节炎

答案:C

解析:皮肤黏膜淋巴结综合征诊断要点:不明原因发热,持续5天或更久。双侧球结膜弥漫性充血。口腔及咽部黏膜弥漫性充血,唇发红及干裂,并呈杨梅舌。发病初期手足硬肿和掌跖发红,恢复期指趾端出现膜状脱皮或肛周脱屑。躯干部多形充血性红斑。颈淋巴结非化脓性肿大,实验室检查示血沉明显增快,C反应蛋白增高。

64.患儿,男,3岁。形体略见消瘦,面色少华,毛发稀疏,食欲不振,精神欠佳,性急易怒,大便干稀不调,舌质略淡,苔薄微腻,脉细。治疗首选方为

- A.肥儿丸
- B.八珍汤
- C.资生健脾丸
- D.参苓白术散
- E.石斛夜光丸

答案:C

解析:此患儿表现为蛋白质-能量营养不良之疳气证。证候:形体略见消瘦,面色少华,毛发稀疏,食欲不振,精神欠佳,性急易怒,大便干稀不调,舌质略淡,苔薄微腻,脉细。治法:和脾健运。方药:资生健脾丸加减。

65.患儿,女,6个月。多汗夜惊,烦躁不安,面色不华,纳呆便溏,枕秃,舌淡苔白,指纹淡,查:血钙磷乘积稍低,碱性磷酸酶增高。其病证诊断应为

- A.佝偻病初期,肺脾气虚型
- B.佝偻病激期,肺脾气虚型
- C.佝偻病激期,脾虚肝旺型
- D.佝偻病激期,肾精亏损型
- E.佝偻病初期,脾虚肝旺型

答案:A

解析:佝偻病初期多见于6个月以内,尤其3个月以内的小婴儿。主要表现为神经兴奋性增高,如激惹、烦躁、睡眠不安、易惊、夜啼、多汗等症,并可致枕部脱发而见枕秃。血生化改变轻微,血清25-(OH)D<sub>3</sub>下降,血钙正常或略下降,血磷降低,碱性磷酸酶正常或稍高,骨骼X线摄片可无异常,或见临时钙化带稍模糊。佝偻病肺脾气虚证的证候:多出现在初期,可见多汗,乏力,烦躁,睡眠不安,夜惊,发稀枕秃,囟门迟闭,或形体虚胖,肌肉松软,纳呆,大便不实,或反复感冒,舌质淡红,苔薄白,指纹偏淡。

66.患儿,男,3岁6个月。麻疹已6日,现高热不退,咳嗽气急,鼻翼扇动,口渴烦躁,疹点密集色暗,舌红苔黄,脉数。其证型是

- A.麻疹顺证,初热期
- B.麻疹顺证,见形期
- C.麻疹逆证,邪毒闭肺证
- D.麻疹逆证,热毒攻喉证
- E.麻疹逆证,邪陷心肝证

答案:C

解析:麻疹邪毒闭肺证。证候:高热不退,疹点不多,或疹点早回,或疹点密集,疹色紫暗,咳嗽气促,鼻翼煽动,唇周发绀,喉间痰鸣,烦躁不宁,舌红,苔黄,脉数。

67.患儿,18个月。壮热不退8天,目赤唇红,斑疹鲜红,颈部核肿大,坚硬触痛,表面不红、不化脓,指肢端肿硬、潮红,舌质红绛,状如草莓,指纹紫。治疗应首选的方剂是

- A.清营汤
- B.普济消毒饮
- C.柴胡葛根汤



D.凉营清气汤

E.解肌透痧汤

答案:D

解析:根据患儿临床表现可诊断为猩红热之毒在气营证,治法为清气凉营,泻火解毒,代表方为凉营清气汤加减。

68.患儿,男,6岁。症见:脐周腹痛,时作时止,饮食不振,面色萎黄,睡眠不安,寐中磨牙,粪便镜检有蛔虫卵。中医治疗首选方剂是

A.保和丸

B.消乳丸

C.乌梅丸

D.使君子散

E.人参乌梅汤

答案:D

解析:此患儿的表现有蛔虫病之蛔虫证。蛔虫证证候:脐周腹痛,时作时止,饮食不振,日渐消瘦,大便不调,面色萎黄,或恶心、呕吐,或吐蛔虫,或大便下虫。睡眠不安,寐中磨牙,甚则爱挖鼻孔,咬衣角,嗜食泥土等;有的患儿面部出现淡色白斑,巩膜出现蓝色斑点,或下唇出现颗粒样大小白点。粪便镜检有蛔虫卵。治法:驱蛔杀虫,调理脾胃。方药:使君子散加减。

69.患儿,3岁,体重13kg,近1个月来食欲不振,面色少华,倦怠乏力,大便偏稀,夹有不消化食物,舌质淡,苔薄白。应首先考虑的诊断是

A.厌食,脾胃气虚证

B.积滞,脾虚夹积证

C.蛋白质-能量营养不良,疳气证

D.营养性缺铁性贫血,脾胃虚弱证

E.小儿腹泻,伤食泻

答案:A

解析:患儿食欲不振1个月,诊断为厌食。食欲不振为脾虚运化乏力,胃纳不开所致。面色少华,倦怠乏力为精微转输不足,气虚失养所致。大便偏稀,夹有不消化食物为脾弱清气不升,清浊相混所致。舌质淡,苔薄白为气虚之象。辨证为脾胃气虚证。

70.患儿,28天。足月顺产。面目皮肤发黄,颜色鲜明,哭闹不安,呕吐腹胀,不思乳食,尿黄便结,舌红苔黄腻,指纹紫滞。应首先考虑的病证结合诊断是

A.新生儿黄疸胎黄虚脱证

B.新生儿黄疸湿热郁蒸证

C.新生儿黄疸寒湿阻滞证

D.新生儿黄疸瘀积发黄证

E.新生儿黄疸胎黄动风证

答案:B

解析:患儿出生后出现面目皮肤发黄,颜色鲜明,尿黄,诊断为新生儿黄疸。湿热邪毒蕴结脾胃,熏蒸肝胆,则面目皮肤发黄,颜色鲜明,呕吐腹胀,不思乳食,尿黄便结。舌红苔黄腻,指纹紫滞为湿热内蕴之象。辨证为湿热郁蒸证。

71.患儿,女,2岁。高热咳喘9天后,现见潮热盗汗,面色潮红,口唇樱赤,干咳无痰,质红而干,舌苔光剥。其治法是

A.清肺止咳

B.止咳化痰

- C.养阴益胃
- D.益气健脾
- E.养阴清肺

答案:E

解析:患儿高热9天,灼伤营阴。潮热盗汗,面色潮红,唇红干咳无痰,舌苔光剥都是阴虚肺热的表现,治法为养阴清肺,润肺止咳。

72.患儿,2岁。患疱疹性口炎,舌上、舌边溃烂,色赤疼痛,烦躁多啼,小便短黄,舌尖红,苔薄黄,指纹紫。治疗应首选的方剂是

- A.凉膈散
- B.泻心导赤散
- C.清热泻脾散
- D.清胃散
- E.泻黄散

答案:B

解析:考查小儿疱疹性口炎的心火上炎证的症状、治法、方剂。疱疹性口炎分三个证型:风热乘脾证、心火上炎证和虚火上炎证。分热乘脾证的特点:以口颊、上颚、齿龈、口角溃烂为主,甚则满口糜烂,疼痛明显,舌红、苔薄黄,脉浮数,指纹紫。风热乘脾证主方为凉膈散。心火上炎证的特点:舌上、舌边溃烂,色赤疼痛,烦躁多啼,舌尖红,苔薄黄,脉数,指纹紫。心火上炎证主方为泻心导赤散。虚火上炎证:口腔溃疡较少,呈灰白色,周围色不红或微红,舌红,苔少或花剥,脉细数,指纹淡紫。虚火上炎证主方为六味地黄丸。

73.患儿,18个月。腹泻时轻时重,已经3个月,大便清稀无臭,夹不消化食物,有时便后脱肛,形寒肢冷,面色白,精神萎靡,睡时露睛,舌淡苔白,指纹色淡。治疗应首选

- A.异功散合平胃散
- B.附子理中汤合四神丸
- C.保和丸合二陈汤
- D.金匱肾气丸合人参乌梅汤
- E.参苓白术散合理中丸

答案:B

解析:患儿腹泻时轻时重3个月,诊断为小儿腹泻。大便清稀无臭,夹不消化食物,是脾肾阳虚,命门火衰,不能温煦脾土。有时便后脱肛,是脾虚气陷的表现。形寒肢冷,面色白,精神萎靡,睡时露睛是肾阳不足,阴寒内生的表现。舌淡苔白,指纹色淡为阳虚的表现。辨证为脾肾阳虚证,治法为温补脾肾,固涩止泻。代表方为附子理中汤合四神丸加减。

74.患儿,男,7岁。4周前曾发热、咽痛,诊断为急性化脓性扁桃体炎。1天前双眼睑水肿,继而下肢水肿,按之凹陷即起,尿少色赤,恶风,咳嗽,舌质淡,苔薄黄,脉浮。治疗应首选的方剂是

- A.五味消毒饮合小蓟饮子
- B.麻黄连翘赤小豆汤合五苓散
- C.实脾饮合五味消毒饮
- D.越婢加术汤合桑白皮汤
- E.麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮

答案:B

解析:患儿急性起病,4周前有上呼吸道感染史,1天前双眼睑水肿,继而下肢水肿,按之凹陷即起,尿少色赤,恶风舌质淡,苔薄黄,脉浮,诊断为急性肾小球肾炎风水相搏证。的治法为疏风宣肺,利水消肿,代表方为麻黄连翘赤小豆汤合五苓散加减。

75.患儿，男，11岁。西医确诊为急性肾小球肾炎，中医辨证为湿热内侵证。中医治疗宜选方剂是

- A.真武汤
- B.五味消毒饮合小蓟饮子
- C.温胆汤合附子泻心汤
- D.麻黄连翘赤小豆汤
- E.银翘散合苓桂术甘汤

答案:B

解析:急性肾小球肾炎湿热内侵证。证候:浮肿或轻或重,小便黄赤而少,甚者尿血,烦热口渴头身困重,常有近期疮毒史,舌质红,苔黄腻,脉滑数。治法:清热利湿,凉血止血。方药:五味消毒饮合小蓟饮子加减。

#### A3/A4 型题

共用题干:患者,男,50岁。夜间右足被蛇咬伤8小时,蛇种类不清,局部伤口无红肿,疼痛轻微,感觉麻木,头昏、眼花、嗜睡、气急,四肢麻痹,张口困难,双目直视,眼睑下垂,神志模糊,舌质红,苔薄白,脉弦数。

76.最可能的诊断为

- A.火毒
- B.风毒
- C.风火毒
- D.热毒
- E.湿毒

答案:B

解析:根据患者的临床表现可诊断为风毒(神经毒)证。其证候为:局部伤口无红肿,疼痛轻微,感觉麻木;全身症状有头昏、眼花、嗜睡、气急,严重者呼吸困难,四肢麻痹,张口困难,口角流涎,双目直视,眼睑下垂,复视,表情肌麻痹,神志模糊甚至昏迷;舌质红,苔薄白,脉弦数或迟弱。

77.治疗首选

- A.活血驱风解毒汤
- B.清营汤
- C.龙胆泻肝汤合五味消毒饮
- D.黄连解毒汤
- E.五虎追风散

答案:A

解析:活血驱风解毒汤加减为治疗风毒(神经毒)的首选方;清营汤加减为治疗蛇毒内陷证的首选方;龙胆泻肝汤合五味消毒饮加减为治疗火毒(血液毒)的首选方;黄连解毒汤合五虎追风散加减为治疗风火毒的首选方。

78.若患者出现急性肾衰竭,可选用

- A.甘露醇
- B.肾上腺皮质激素
- C.速尿
- D.血液透析
- E.血管扩张剂

答案:D



解析:急性肾衰竭的处理:早期肾衰竭可选用甘露醇或速尿,严重时应用利尿合剂和肾上腺皮质激素;人工透析疗法是治疗急性肾衰竭的有效措施之一,一般常用血液透析法。  
共用题干:患者,男,29岁,骑摩托车时不慎被扶手撞到右侧胸部,自觉疼痛逐渐加重,胸闷,呼吸短促,胸肋刺痛,固定不移,面色发青,舌紫暗,脉沉涩。右侧胸部叩诊呈鼓音,呼吸音降低。胸部X线示肺萎陷,胸腔积气。

79.其诊断为

- A.血胸
- B.开放性气胸
- C.张力性气胸
- D.急性肺栓塞
- E.闭合性气胸

答案:E

解析:根据患者的受伤史及症状可诊断为闭合性气胸。胸部损伤后引起胸膜腔积血者为血胸;胸壁穿透性损伤导致胸膜腔与外界大气交通称为开放性气胸。张力性气胸为较严重的闭合性胸部损伤,患者主要表现为严重的呼吸困难,烦躁,意识障碍,发绀,脉细速,血压降低等;急性肺栓塞X线无气胸征象,故可排除。

80.若需进行胸腔穿刺排气,其穿刺点应该在

- A.锁骨中线第2肋间
- B.锁骨中线第3肋间
- C.腋中线第7肋间
- D.腋后线第7肋间
- E.腋后线第8肋间

答案:A

解析:闭式胸膜腔引流的穿刺部位:液体一般选在腋中线和腋后线之间的第6~8肋间隙插管引流。气体常选锁骨中线第2肋间隙。

81.治疗首选的方剂为

- A.参附汤
- B.理气止痛汤
- C.四君子汤
- D.复元活血汤
- E.生脉散

答案:D

解析:患者胸肋刺痛,固定不移,面色发青均为血瘀之象,呼吸短促提示存在气滞,因此可辨证为血瘀气滞证,治法为理气活血,逐瘀通经。方剂首选复元活血汤。


共用题干:患者,男,32岁。诊断为原发性支气管肺癌。现症见:咳嗽咳痰,痰中带血,胸部隐痛,乏力,五心烦热,自汗盗汗;舌质红,苔少,脉沉细数。

82.肺癌确诊的重要手段是

- A.CT
- B.MRI
- C.X线
- D.纤维支气管镜
- E.痰液细胞学检查

答案:E

解析:痰液细胞学检查是肺癌确诊的重要手段。



83.肺癌转移引起的体征最常见的为

- A.锁骨上淋巴结肿大
- B.锁骨下淋巴结肿大
- C.滑车上淋巴结肿大
- D.腹股沟淋巴结肿大
- E.腋窝淋巴结肿大

答案:A

解析:肺癌转移引起的体征最常见的为锁骨上淋巴结肿大,也可见腋下淋巴结肿大。

84.治疗首选

- A.血府逐瘀汤
- B.六君子汤合海藻玉壶丸
- C.百合固金汤
- D.白虎承气汤
- E.生脉散合沙参麦冬汤

答案:E

解析:根据患者的临床表现可辨证为气阴两虚证。证候:胸背部隐隐作痛,咳声低弱,神疲乏力,五心烦热,自汗盗汗;舌质红,苔少,脉沉细数。治法:益气养阴,化痰散结。方药:生脉散合沙参麦冬汤加减。

共用题干:男性,24岁,不慎跌入80°C热水池内,池水淹没下半身超过臀部,皮肤表皮剥脱,散在水疱,疱皮下创面微湿,红白相间,痛觉迟钝。

85.初步估计烫伤面积为

- A.30%~34%
- B.35%~39%
- C.40%~44%
- D.45%~50%
- E.>60%

答案:D

解析:按体表面积划分为11个9%的等份,另加1%,构成100%的体表面积,即头颈部:1×9%;躯干:3×9%;两上肢:2×9%;双下肢:5×9%+1%,共为11×9%+1%。

86.其烧伤深度为

- A.I°
- B.浅II°
- C.深II°
- D.III°
- E.IV°

答案:C

解析:深II°烧伤:伤及皮肤的真皮层,介于浅II°和III°之间,也可有水疱,但去疱皮后创面微湿,红白相间,痛觉较迟钝。

87.若患者头、面、颈部全部烧伤,其面积约为全身面积的

- A.3%
- B.6%
- C.9%
- D.18%
- E.20%

答案:C

解析:中国新九分法按体表面积划分为 11 个 9% 的等份, 另加 1%, 构成 100% 的体表面积, 即头、面、颈部:  $1 \times 9\%$ ; 躯干:  $3 \times 9\%$ ; 两上肢:  $2 \times 9\%$ ; 双下肢:  $5 \times 9\% + 1\%$ , 共为  $11 \times 9\% + 1\%$ 。

共用题干:患者, 女, 39 岁, 诊断为乳腺癌, 现症: 乳房结块溃烂, 色紫暗, 时流污水, 臭气难闻; 头晕耳鸣, 肢体消瘦, 五心烦热, 面色苍白, 夜寐不安; 舌淡苔白, 脉沉细。

88. 中医辨证为

- A. 血瘀痰凝证
- B. 肝郁气滞证
- C. 冲任失调证
- D. 毒热蕴结证
- E. 气血两虚证

答案:E

解析:根据患者的临床表现可辨证为气血两虚证。证候: 乳房结块溃烂, 色紫暗, 时流污水, 臭气难闻; 头晕耳鸣, 肢体消瘦, 五心烦热, 面色苍白, 夜寐不安; 舌绛无苔, 或苔黄白, 脉滑数。治法: 调理肝脾, 益气养血。

89. 治疗首选的方剂为

- A. 逍遥散
- B. 二仙汤
- C. 桃红四物汤
- D. 人参养荣汤
- E. 清瘟败毒饮合桃红四物汤

答案:D

解析:人参养荣汤加减为气血两虚证的首选方; 逍遥散加减为肝郁气滞证的首选方; 二仙汤加味为冲任失调证的首选方; 清瘟败毒饮合桃红四物汤加减为毒热蕴结证的首选方。

90. 若 ER 阳性, 且有腋下淋巴结转移应选用的疗法为

- A. 食疗
- B. 手术治疗
- C. 放射治疗
- D. 内分泌疗法
- E. 化学药物治疗

答案:D

解析:内分泌疗法是一种辅助治疗措施。近年来根据雌激素受体的检查结果, 选择内分泌治疗方案。ER 阳性又有腋下淋巴结转移, 应选用内分泌疗法。


共用题干:患者, 女, 33 岁, 自然流产 3 次, 月经量少, 面色萎黄, 心悸, 神疲乏力, 舌淡, 苔薄, 脉细弱。

91. 首先考虑的诊断为

- A. 先兆流产
- B. 复发性流产
- C. 完全流产
- D. 稽留流产
- E. 不全流产

答案:B

解析:与同一性伴侣自然流产连续发生 3 次或 3 次以上者为复发性流产。



92.中医辨证为

- A.脾气虚弱证
- B.脾肾阳虚证
- C.气血虚弱证
- D.肾气亏损证
- E.肝胃不和证

答案:C

解析:根据患者的症状可辨证为气血虚弱证。证候:屡孕屡堕,月经量少,或月经周期延后,或闭经,面色白或萎黄,头晕心悸,神疲乏力;舌质淡,苔薄,脉细弱。治法:益气养血,固冲安胎。

93.治疗首选的方药为

- A.寿胎丸
- B.胎元饮
- C.保阴煎
- D.补肾固冲丸
- E.泰山磐石散

答案:E

解析:泰山磐石散为治疗气血虚弱证的首选方;补肾固冲丸为治疗肾气亏损证的首选方。

共用题干:患者,女,34岁,妊娠期间,心悸怔忡,面色少华,唇甲色淡,头晕目眩,失眠,舌质淡,脉细弱。检查:颈静脉怒张,心脏听诊粗糙的3级以上全收缩期杂音。

94.治法宜选用

- A.养血益气,宁心安胎
- B.温阳化气,宁心安胎
- C.益气养血,宁心安胎
- D.温阳化气,养血安胎
- E.益气化瘀,通阳安胎

答案:A

解析:根据患者的临床表现可诊断为妊娠合并心脏病之心血虚证。证候:妊娠期间,心悸怔忡,面色少华,唇甲色淡,头晕目眩,眠差多梦,舌质淡,脉细弱。治法:养血益气,宁心安胎。

95.治疗首选方为


- A.五苓散
- B.归脾汤
- C.瓜蒌薤白半夏汤
- D.养心汤
- E.补阳还五汤

答案:B

解析:归脾汤为治疗心血虚证的首选方;真武汤合五苓散去猪苓,加桑寄生、菟丝子为治疗阳虚水泛证的首选方;养心汤去肉桂、半夏,加麦冬为治疗心气虚证的首选方;补阳还五汤合瓜蒌薤白半夏汤去红花、桃仁、半夏、地龙,加桑寄生、杜仲为治疗气虚血瘀证的首选方。

96.常见并发症不包括

- A.心力衰竭
- B.缺氧和发绀
- C.静脉栓塞



D.肺栓塞

E.慢性感染性心内膜炎

答案:E

解析:常见并发症包括心力衰竭(易发生在妊娠32~34周、分娩期及产褥早期);亚急性感染性心内膜炎;缺氧和发绀;静脉栓塞及肺栓塞(是孕产妇重要死因之一)。

共用题干:患者,女,29岁,妊娠期间身目俱黄,色鲜明如橘子色,右胁胀痛,恶心厌食,口苦咽干,胸胁痞满,倦怠乏力,尿黄便坚;舌质红,苔黄腻,脉弦滑。

97.治法为

A.清热利湿,佐以安胎

B.健脾化湿,养血安胎

C.疏肝理气,健脾安胎

D.清热解毒,凉血救阴

E.益气养血,宁心安胎

答案:A

解析:根据患者的临床表现可诊断为妊娠合并病毒性肝炎之湿热蕴结证。证候:妊娠期间身目俱黄,色鲜明如橘子色,右胁胀痛,恶心厌食,口苦咽干,胸胁痞满,倦怠乏力,尿黄便坚;舌质红,苔黄腻,脉弦滑或濡数。治法:清热利湿,佐以安胎。

98.治疗首选

A.胃苓汤

B.逍遥散

C.茵陈蒿汤

D.犀角地黄汤

E.黄连解毒汤

答案:C

解析:茵陈蒿汤加金钱草、虎杖、桑寄生、续断为治疗湿热蕴结证的首选方;胃苓汤去桂枝、泽泻,加桑寄生、菟丝子为治疗湿邪困脾证的首选方;逍遥散加桑寄生、菟丝子为治疗肝郁脾虚证的首选方;犀角地黄汤合黄连解毒汤加茵陈、大青叶为治疗热毒内陷证的首选方。

99.除哪项外,均为西医治疗原则

A.预防治疗肝性脑病

B.治疗肝硬化

C.预防及治疗DIC

D.保护肝脏

E.治疗肾衰竭

答案:B

解析:妊娠合并病毒性肝炎的西医治疗原则:保护肝脏,预防治疗肝性脑病,预防及治疗DIC,治疗肾衰竭。

共用题干:患者,女,26岁,初产妇,宫口开大4cm后,因子宫收缩乏力,10小时后宫口尚未开全。

100.首先考虑的诊断

A.潜伏期延长

B.活跃期延长

C.活跃期停滞

D.第二产程延长

E.第二产程停滞



答案:B

解析:活跃期延长:正常初产妇约需4小时,超过8小时,宫口尚未开全时,则为活跃期延长。

101.该期正常初产妇约需

- A.1小时
- B.2小时
- C.4小时
- D.8小时
- E.16小时

答案:C

解析:活跃期正常初产妇约需4小时。最大时限8小时。超过8小时,而宫口扩张速度初产妇 $<1.2\text{cm/h}$ ,经产妇 $<1.5\text{cm/h}$ ,称活跃期延长。

102.子宫收缩乏力对产妇的影响不包括

- A.泌尿生殖道瘘
- B.产后出血
- C.软产道撕裂
- D.产褥感染
- E.水、电解质紊乱及酸中毒

答案:C

解析:子宫收缩乏力对产妇的影响包括水、电解质紊乱及酸中毒、泌尿生殖道瘘、产后出血和产褥感染。

共用题干:患者,女,33岁,诉阴道脱出一物3年,查体:宫颈已脱出至阴道口外,宫体在阴道内,双附件无异常,诊断为子宫脱垂。

103.其程度应属于

- A.I度轻型
- B.I度重型
- C.II度轻型
- D.II度重型
- E.III度

答案:C

解析:子宫脱垂分度:检查时嘱患者平卧并用力向下屏气。I度:轻型:子宫颈外口距处女膜缘 $<4\text{cm}$ ,但未达处女膜缘;重型:子宫颈外口已达处女膜缘,在阴道口可见到宫颈。II度:轻型:子宫颈已脱出阴道口,但宫体仍在阴道内;重型:宫颈及部分宫体已脱出于阴道口。III度:子宫颈及宫体全部脱出至阴道口外。

104.最主要的病因是

- A.慢性咳嗽
- B.大量腹水
- C.分娩损伤
- D.经常超重负荷
- E.盆地组织发育不良

答案:C

解析:子宫脱垂的西医病因中,分娩损伤为最主要的病因。

105.主要病机是

- A.中气下陷

- B.肾气亏虚
- C.湿热下注
- D.瘀血阻滞冲任胞宫
- E.冲任不固，带脉失约

答案:E

解析:子宫脱垂主要病机是冲任不固，带脉失约，提摄无力。

共用题干:足月男婴，出生后 8 小时即出现身黄、目黄、哭闹不安、呕吐、乳食不思，尿黄，舌质红，苔黄稍腻。

106.治疗首选方为

- A.茵陈理中汤加减
- B.茵陈蒿汤加减
- C.膈下逐瘀汤加减
- D.羚角钩藤汤合茵陈蒿汤加减
- E.黄连解毒汤加减

答案:B

解析:此患儿为新生儿黄疸中湿热熏蒸证的表现。湿热熏蒸证证候：面目皮肤发黄，颜色鲜明，精神疲倦或烦躁啼哭，不欲吮乳，小便短黄，舌质红，舌苔黄腻。重者腹胀，呕吐，甚或神昏、抽搐。治法：清热利湿退黄。方药：茵陈蒿汤加味。

107.下列各项中，与发病无关的脏腑是

- A.脾
- B.胃
- C.肝
- D.胆
- E.肾

答案:E

解析:胎黄的发病与先天禀赋因素及后天感受湿邪或湿热毒邪密切相关。病机为湿邪或湿热之邪阻滞脾胃，肝失疏泄，胆汁外溢，而发为胎黄，病位主要在脾、胃、肝、胆。故根据题干要求，此题的正确选项是 E。

108.病理性黄疸出现的时间一般为

- A.婴儿出生后 1~2 天
- B.婴儿出生后 2~3 天
- C.婴儿出生后 4~5 天
- D.婴儿出生后 1 天之内至生后 2~3 周
- E.出生后 3~4 周

答案:D

解析:生理性黄疸大多在出生后 2~3 天出现，4~6 天达高峰，10~14 天消退，早产儿持续时间较长，除有轻微食欲不振外，一般无其他临床症状。若出生后 24 小时内即出现黄疸，3 周后仍不消退，甚或持续加深，或消退后复现，均为病理性黄疸。

共用题干:患儿，男，3 岁，症见：发热咳嗽流涕 1 天，伴有脘腹胀满，口气秽浊。大便酸臭，小便短黄，舌苔厚腻，脉滑。

109.其中医辨证为

- A.风热感冒
- B.风寒感冒
- C.时邪感冒

D.暑邪感冒

E.感冒夹滞

答案:E

解析:根据题干给出的信息,此患儿表现为感冒之夹滞证。感冒夹滞证候:感冒兼见脘腹胀满,不思饮食,呕吐酸腐,口气秽浊,大便酸臭,或腹痛泄泻,或大便秘结,小便短黄,舌苔厚腻,脉滑。

110.其治法是

A.解表时佐以宣肺止咳

B.解表时佐以消食导滞

C.解表时佐以止咳化痰

D.解表时佐以清热镇惊

E.解表时佐以清肺化痰

答案:B

解析:感冒夹滞的治法为解表兼以消食导滞。

111.治疗首选方剂是

A.桑菊饮

B.三拗汤

C.新加香薷饮

D.保和丸

E.小儿金丹片

答案:D

解析:治疗在疏风解表的基础上,加用保和丸加减。

共用题干:患儿,6岁。西医诊断为病毒性脑炎。症见:表情淡漠,目光呆滞,喃喃自语,神识不清,口角流涎,纳差乏力,舌质胖嫩,苔白,脉弦滑。

112.中医辨证为

A.痰热壅盛证

B.痰火扰神证

C.痰蒙清窍证

D.痰阻经络证

E.痰痫

答案:C

解析:此患儿为痰蒙清窍证的表现。痰蒙清窍证的证候:起病稍缓,表情淡漠,目光呆滞,喃喃自语,神识模糊,或见痴呆,语言不利,或见失语,口角流涎,喉间痰鸣,纳差乏力,舌质胖嫩,舌苔白,脉弦滑。

113.治疗首选方剂是

A.温胆汤

B.涤痰汤

C.凉膈散

D.导痰汤

E.指迷茯苓丸

答案:B

解析:病毒性脑炎之痰蒙清窍证的治法为涤痰开窍。方药:涤痰汤加减。

114.治疗中对于单纯性疱疹病毒,可给予

A.阿昔洛韦

- B.更昔洛韦
- C.干扰素
- D.利巴韦林
- E.免疫球蛋白

答案:A

解析:病毒性脑炎病因治疗:对于单纯性疱疹病毒可给予阿昔洛韦治疗,每次10mg/kg于1小时内静脉滴注,每8小时用1次,疗程1~2周。

共用题干:8个月患儿,母乳喂养,未加辅食,近2个月来腹泻,食欲不振,有异食癖,皮肤黏膜渐苍白,伴面色萎黄,唇淡,指甲苍白,精神倦怠,形体消瘦,大便不调,舌淡苔白,脉细无力,指纹淡红。检查:肝肋下3cm,脾肋下1.5cm,血红蛋白70g/L,红细胞 $3.5\sim 10^{12}/L$ 。

115.最可能的诊断是

- A.营养性大细胞性贫血
- B.生理性贫血
- C.营养性感染性贫血
- D.营养性缺铁性贫血
- E.先天性再生低下性贫血

答案:D

解析:营养性缺铁性贫血的临床表现:皮肤黏膜苍白,以口唇、甲床和睑结膜最为明显,疲乏无力,食欲减退,或异食癖。年长儿有头晕、眼花、耳鸣等症状。部分患儿可有肝脾肿大。实验室检查:小细胞低色素性贫血;网织红细胞数正常或轻度减少;白细胞、血小板一般无特殊改变;血清铁、总铁结合力、运铁蛋白饱和度、红细胞原卟啉、血清铁蛋白等异常。

116.治疗应首选方剂为

- A.左归丸
- B.归脾汤
- C.右归丸
- D.大补阴丸
- E.参苓白术散

答案:E

解析:结合患儿的症状可辨证为脾胃虚弱证。证候:面色萎黄无华,唇淡不泽,指甲苍白,长期食欲不振,神疲乏力,形体消瘦,大便不调,舌淡苔白,脉细无力,指纹淡红。治法:健运脾胃,益气养血。方药:参苓白术散加减或异功散加味。

117.使用铁剂治疗后停药指征为

- A.网织红细胞升高后再用1~2个月
- B.血红蛋白及红细胞恢复正常
- C.面色转红,精神及食欲好转
- D.血清铁恢复正常
- E.血红蛋白及红细胞恢复正常后再用6~8周左右

答案:E

解析:铁剂治疗有效者于2~3天后网织红细胞即见升高,5~7天达高峰,2~3周后下降至正常;治疗约2周后,血红蛋白相应增加,临床症状亦随之好转。血红蛋白达正常水平后应继续服用铁剂6~8周左右再停药,以补足铁的贮存量。如3周内血红蛋白上升不足20g/L,应注意寻找原因。

共用题干:患儿,女,6岁。症见:乳核增大、触之疼痛、阴道分泌物增多;伴胸闷不舒、心烦易怒、痤疮、便秘、舌红,苔黄,脉弦数。

118.治法宜选用

- A.滋补肾阴，清泻相火
- B.疏肝解郁，清利湿热
- C.滋阴清热，凉血宁络
- D.清热解毒，凉血止血
- E.疏肝解郁，清泻相火

答案:B

解析:结合患儿的症状可诊断为性早熟之肝经郁热证。证候:女孩乳核增大、触之疼痛、阴道分泌物增多;男孩阴茎勃起,变声。伴胸闷不舒、心烦易怒、痤疮、便秘、舌红,苔黄或黄腻,脉弦数或弦细数。治法:疏肝解郁,清利湿热。

119.治疗首选方剂是

- A.人参大补丸
- B.丹栀逍遥散
- C.黄连解毒汤
- D.知柏地黄丸
- E.六味地黄丸

答案:B

解析:知柏地黄丸加减为治疗性早熟之阴虚火旺证的首选方;丹栀逍遥散加减为治疗性早熟之肝经郁热证的首选方。

120.鉴别该病的真假性质最有意义的标准是

- A.乳房发育
- B.月经来潮
- C.骨龄提前
- D.骨骼生长加速
- E.GnRH 兴奋试验

答案:E

解析:诊断真性性早熟和假性性早熟可以通过 GnRH 兴奋试验鉴别。GnRH 兴奋试验亦称黄体生成素释放激素(LHRH)兴奋试验。其原理是通过 GnRH 刺激垂体分泌黄体生成素(LH)和卵泡刺激素(FSH),从而评价垂体促性腺激素细胞储备功能,对鉴别真性和假性性早熟非常有价值。故此题的正确选项是 E。

B1 型题

(共用备选答案题)

- A.代谢性酸中毒
- B.代谢性碱中毒
- C.呼吸性酸中毒
- D.呼吸性碱中毒
- E.复合型酸碱平衡失调

121.外科病人最常见的酸碱平衡失调是

答案:A

解析:许多外科疾病如消化道痿、肠梗阻、休克、急性肾衰等均易引起机体产酸增多、碱性物质丢失过多、酸性物质排出障碍或摄入过多,致使血浆 pH 降低,碳酸氢根减少,出现代谢性酸中毒。

122.幽门梗阻剧烈呕吐的病人,呼吸浅、慢,手足搐搦,血清 pH7.5,诊断为



答案:B

解析:幽门梗阻病人剧烈呕吐使胃酸大量丢失,血 pH 升高,呼吸中枢兴奋性减弱,呼吸变浅、变慢,在碱性环境中钙的离子化程度减低,出现血钙降低而发生手足搐搦,故该病人是出现了代谢性碱中毒的症状。

(共用备选答案题)

A.4~5 天

B.6~7 天

C.7~9 天

D.10~12 天

E.14 天

123.臀部手术在术后的拆线时间是

答案:C

解析:一般头、面、颈部 4~5 天拆线,下腹部、会阴部 6~7 日拆线,胸部、背部、上腹部、臀部 7~9 日拆线,四肢 10~12 日拆线,减张缝线 14 日。

124.阑尾炎手术在术后的拆线时间是

答案:B

解析:一般头、面、颈部 4~5 天拆线,下腹部、会阴部 6~7 日拆线,胸部、背部、上腹部、臀部 7~9 日拆线,四肢 10~12 日拆线,减张缝线 14 日。

(共用备选答案题)

A.赤游丹

B.抱头火丹

C.流火

D.内发丹毒

E.腿游风

125.新生儿发于臀部的丹毒称

答案:A

解析:丹毒发无定处,发病部位不同病名不同,如发于躯干部者,称内发丹毒;发于头面部者,称抱头火丹;发于小腿足部者,称流火;新生儿多生于臀部,称赤游丹。

126.生于小腿足部的丹毒称

答案:C

解析:丹毒发无定处,发病部位不同病名不同,如发于躯干部者,称内发丹毒;发于头面部者,称抱头火丹;发于小腿足部者,称流火;新生儿多生于臀部,称赤游丹。

(共用备选答案题)

A.急性胆囊炎

B.急性阑尾炎

C.胃十二指肠溃疡穿孔

D.急性胰腺炎

E.右输尿管结石

127.转移性右下腹痛

答案:B

解析:转移性右下腹痛是急性阑尾炎的典型临床表现。

128.右腰部阵发性绞痛向会阴部扩散

答案:E

解析:输尿管结石可引起肾绞痛,典型表现为疼痛剧烈难忍,位于腰部或上腹部,并向会阴部扩散。

(共用备选答案题)

- A.阳和汤
- B.桃红四物汤
- C.四妙勇安汤
- D.十全大补汤
- E.六味地黄丸

129.治疗血栓闭塞性脉管炎寒湿证,应首选的方剂是

答案:A

解析:血栓闭塞性脉管炎寒湿证的治法为温阳通脉,祛寒化湿,代表方为阳和汤加减。

130.治疗血栓闭塞性脉管炎热毒证,应首选的方剂是

答案:C

解析:血栓闭塞性脉管炎热毒证的治法为清热解毒,化瘀止痛,代表方为四妙勇安汤加减。

(共用备选答案题)

- A.量、色、质
- B.量、色、质、味
- C.期、量、色、质
- D.期、量、色、味
- E.期、量、色、质、味

131.月经病的诊断主要是查月经的

答案:E

解析:月经病的诊断主要是查月经的期、量、色、质、气味。

132.带下病的诊断主要是看带下的

答案:B

解析:带下病的诊断主要是看带下的量、色、质、气味。

(共用备选答案题)

- A.寿胎丸
- B.左归丸
- C.右归丸
- D.内补丸
- E.真武汤

133.中医内治法中补益肾气的代表方为

答案:A

解析:中医内治法中补益肾气的代表方如寿胎丸、补肾固冲丸。

134.中医内治法中,滋肾填精的代表方为

答案:B

解析:中医内治法中,滋肾益阴的代表方剂如六味地黄丸、左归丸、养精种玉汤等。

(共用备选答案题)

- A.犀角地黄汤
- B.柴胡疏肝散
- C.导赤散
- D.橘皮竹茹汤
- E.玉女煎

135.治疗妊娠合并尿路感染心火偏亢证，首选

答案:C

解析:尿路感染心火偏亢证的治法为清心泻火通淋，代表方为导赤散去木通，加黄连、玄参、车前草。

136.治疗妊娠剧吐肝胃不和证，首选

答案:D

解析:妊娠剧吐肝胃不和证的治法为清肝和胃，降逆止呕，代表方为橘皮竹茹汤加黄连。

(共用备选答案题)

A.清热固经汤

B.清经散

C.保阴煎

D.右归丸

E.丹栀逍遥散

137.治疗无排卵性子宫出血肾阳虚证，应首选的方剂是

答案:D

解析:无排卵性子宫出血肾阳虚证的治法为温肾固冲，止血调经，代表方为右归丸去肉桂，加艾叶炭、补骨脂、黄芪。

138.治疗晚期产后出血血热证，应首选的方剂是

答案:C

解析:晚期产后出血血热证的治法为养阴清热，安冲止血，代表方为保阴煎加七叶一枝花、贯众、炒地榆、煅牡蛎。

(共用备选答案题)

A.血府逐瘀汤

B.桃红四物汤

C.逐瘀止血汤

D.两地汤

E.少腹逐瘀汤

139.治疗子宫内膜不规则脱落血瘀证，应首选的方剂是

答案:B

解析:子宫内膜不规则脱落血瘀证的治法为活血化瘀，固冲调经，代表方为桃红四物汤合失笑散。

140.治疗排卵期出血血瘀证，应首选的方剂是

答案:C

解析:排卵期出血血瘀证的治法为活血化瘀，理血归经，代表方为逐瘀止血汤。

(共用备选答案题)

A.六君子汤加减

B.归脾汤加减

C.左归丸加减

D.右归丸加减

E.四物汤加减

141.营养性贫血脾胃虚弱证的治疗方剂为

答案:A

解析:营养性贫血脾胃虚弱证的治疗方法为健运脾胃，益气养血，方用六君子汤加减。

142.营养性贫血脾肾阳虚证的治疗方剂为





答案:D

解析:营养性贫血脾肾阳虚证的治疗方法为温补脾肾, 益精养血, 方用右归丸加减。

(共用备选答案题)

A.犀角地黄汤

B.归脾汤

C.四妙散

D.黄芪桂枝五物汤

E.大补阴丸合茜根散

143.治疗小儿特发性血小板减少性紫癜阴虚火旺证, 应首选的方剂是

答案:E

解析:特发性血小板减少性紫癜阴虚火旺证。证候:皮肤黏膜散在瘀点瘀斑, 下肢尤甚, 时发时止, 颜色鲜红, 伴齿衄、鼻衄或尿血, 低热盗汗, 手足心热, 心烦颧红, 口干咽燥, 舌红少苔, 脉细数。治法:滋阴清热, 凉血宁络。方药:大补阴丸合茜根散加减。

144.治疗小儿过敏性紫癜湿热痹阻证, 应首选的方剂是

答案:C

解析:过敏性紫癜湿热痹阻证的治法为清热利湿, 通络止痛, 代表方为四妙散加味。

(共用备选答案题)

A.肺炎

B.脑膜脑炎

C.心肌炎

D.急性肾炎

E.关节炎

145.麻疹最常见的并发症是

答案:A

解析:麻疹最常见的并发症是肺炎(最常见)、喉炎、气管炎、支气管炎。

146.流行性腮腺炎儿童期最常见的并发症是

答案:B

解析:流行性腮腺炎儿童期最常见的并发症是脑膜脑炎。

(共用备选答案题)

A.苔白厚腻

B.苔薄白

C.苔黄燥

D.苔少或花剥

E.苔薄腻

147.积滞乳食内积证的舌象特点是

答案:A

解析:积滞乳食内积证, 临床表现为不思乳食, 嗳腐酸馊或呕吐食物、乳片, 脘腹胀满, 疼痛拒按, 大便酸臭, 苔白厚腻, 脉象弦滑, 或指纹紫滞。

148.厌食脾胃阴虚证的舌象特点是

答案:D

解析:厌食脾胃阴虚证, 临床表现为不思进食, 食少饮多, 皮肤失润, 大便偏干, 小便短黄, 手足心热, 舌红少津, 苔少或花剥, 脉细数。

(共用备选答案题)

A.活动过多, 冲动任性

B.智力低下，学习困难

C.躯体多部位肌群抽动

D.睡时症状加重

E.肌力及肌张力减低

149.属于小儿多发性抽动症临床特征的是

答案:C

解析:小儿多发性抽动症临床特征有躯体多部位肌群抽动，发声抽动，秽语症，模仿他人语言、习惯等。

150.属于小儿注意力缺陷多动障碍临床特征的是

答案:A

解析:小儿注意力缺陷多动障碍临床特征为动作过多，易冲动和注意力不集中，学习困难等。

